

EX BIBLIOTHECA  
NOSOCOMII  
S. M. NOVAE.

' 4 333





D E

AURE HUMANA

TRACTATUS.



D E  
AURE HUMANA  
TRACTATUS,

In quo integra ejusdem AURIS FABRICA,  
MULTIS NOVIS INVENTIS, & ICONISMIS  
illustrata, describitur; omniumque ejus Partium  
Ufus indagantur.

QUIBUS INTERPOSITA EST  
MUSCULORUM UVULÆ, ATQUE PHARYNGIS  
NOVA DESCRIPTIO, ET DELINEATIO.

AUCTORE  
ANTONIO MARIA  
VALSALVA  
IMOLENSI



Philosophiæ, & Medicinæ Doctore, in Bononiensi Universitate  
ad Incisionem, & Ostensionem Anatomicam Professore  
Conducto, necnon Nosocomii Incurabilium  
Chirurgo.

BONONIÆ MDCCIV.

---

Typis Constantini Pisarii ad S. Michaelē prope Archigymnasium.  
*Superiorum permissu.*





ILLUSTRISSIMIS, ATQVE AMPLISSIMIS  
BONONIENSIS SENATUS  
QUINQUAGINTA VIRIS

Optimis Patriæ Parentibus,  
Celeberrimi hujus Archigymnasii Moderatoribus  
Sapientissimis

*Antonius Maria Valsalva Felicitatem, & Gloriam.*



Um Omnes, quot-  
quot in Alma hac  
Bononiensi Acade-  
mia Vestris Juslibus, atque Auspiciis Facul-  
tates profitentur, si quid circa injunctam  
sibi Materiam in publicum edunt; id Cla-  
rissimo Vestro Nomini inscribere commu-  
ni

ni quodam officio obstringantur; tum ego  
peculiari de causa id debeo, **ILLVSTRIS-**  
**SIMI**, atque **AMPLISSIMI PATRES**.  
Me siquidem, exterum hominem, honori-  
fico Senatusconsulto ad Novum Incisionis,  
& Ostensionis Anatomicæ Munus, me, in-  
quam, primum, conduxistis; tum Muneri  
meo aptissimis Ædibus in Publico Archi-  
gymnasio constructis, atque assignatis; ver-  
borum humanitate; favore vultuum; illa  
potissimum, æternum mihi memoranda,  
Patientia Vestra, qua ostendentem me au-  
dire, atque spectare consuevistis, tot velu-  
ti illustribus Ornamentis, peculiariter con-  
decorastis. Accedit, quòd cùm aliquandò  
morte Præstantissimi Viri, Medicum quod-  
dam in hac Civitate conspicuum Munus va-  
caret; ad quod quidem ne quis nisi Civis,  
aut Vir Fama, & Virtute Celebris admitta-  
tur, lege cautum est; me tamen ille, qui  
præerat, Virorum Gravissimorum Coetus ad-  
mitti posse, censuit; cunctis enim Suffragiis  
me, qui prima conditione carerem; secun-  
da ornari, declaravit. Quod honestissimum  
de

de me iudicium sicuti meo ingenio , aut merito ; quæ sentio quàm sint exigua ; nullo modo referre possum ; ità Urbis Vestræ ; imò Vestrummet ipsorum ( nam Coetum illum multi ex Vobis ornabant ) erga me profusæ Benignitati & retuli , & unicè refero . Quæ cùm ità sint ; hunc meum de Aure Humana Tractatum , quem inter Beneficia Vestra nascentem jam tunc Vobis destinaveram , singulari de causa Nobilissimo Vestro Nomini inscribere obstringor , atque adeò inscribere audeo . Illud interim , **ILLVSTRISSIMI** , atque **AMPLISSIMI PATRES** , ab Humanitate Vestra expecto , ut Libellum hunc , quem humillimè Vobis nuncupo , qua majori potestis animi , vultusque hilaritate dignemini . Qua sanè ego expectatione non excidam ; si qua fronte , quove animo tot Beneficia contulistis , eodem signum hoc , quale id cunque est , grati animi excipiat . Ad Publicam Felicitatem , ad meum Decus , ad Amplissimi Vestri Ordinis Gloriam Valete .

*V. D. Paulus Carminatus Cler. Reg. S. Pauli in Metropoli-  
tana Bononiæ Pœnitentiæ. pro Eminentissimo, & Reve-  
rendissimo D. D. Jacobo Card. Boncompagno Archiepisco-  
po, & Principe &c.*

*De Mandato Reverendissimi Patris Inquisitoris Vidit, &  
admitti posse censuit.*

21. Jun.  
1704.

*D. Antonius Barnchi Clericus Regularis S. Pauli,  
ac Sanctissimæ Inquisitionis Bonon. Consultor.*

*Stante Prefata Censura.*

*Imprimatur.*

*F. Thomas Antonius Manganoni Ord. Præd. Vic. Generalis,  
S. Officii Bononiæ.*

*AN.*

*Antonius Maria VALSALVA*

LECTORI S.



UREM Humanam, de qua modò hunc  
Tractatum edo, ut à primis ferè stu-  
diorum annis ad anatomicam perlu-  
strationem inter cæteras Partes elige-  
rem, duè potissimùm causæ induxerunt;  
Altera, quòd si vulgaras ipsius Histo-  
rias sive inter se, sive cum Aure ipsâ  
conferrem, in multis non convenire,  
perspicerem; Altera verò, quòd si Par-  
tium Auris exiguitatem, & summam illius, cui includuntur,  
Ossis duritiem animadverterem; an tale Organum adhuc pe-  
nitius perlustratum esset, vehementer dubitarem: Prima  
enim animo sciendi cupido istiusmodi perlustrationis necessi-  
tatem faciebat; Secunda incredibilem quandam gratiam  
huic operi per ipsam difficultatem addebat: Utraque simul  
subindicabat, multa adhuc in Aure facilè latere, quæ aut il-  
lustrari, aut augeri, aut etiam inveniri labore, & diligen-  
tiâ possent. Protinus ergo arduum opus aggressus sum.  
Et principiò quidem cùm intellexissem, Partium simul om-  
nium nexum, & coordinationem, si quid aliud in Aure, il-  
lustrationem exposcere; hanc verò obtineri non posse, nisi  
talis Auris Anatome præpararetur, quæ omnes simul ipsius  
Partes in naturali situ exhiberet; difficilem illicò provinciam  
suscepi, illam scilicet Anatomen elaborandi; non ut eo us-  
que mos fuerat, in varia, & complura segmina Aures di-  
videndo; sed integram totam quanta est relinquendo, nul-  
lâ fermè vel minimâ Parte à proprio situ dimotâ: quæ qui-



dem

dem Præparatio quantum laboris, quantum temporis; præcipuè verò quantum studij, & exercitationis exposulet; nemo, nisi experiatur, intelliget. Simul ergo quocunque Aures undecunque obtinere poteram anatomico examini subijcere, & singula, quæ aut clariùs, aut accuratiùs, aut noviter omninò observabam, in adversaria referre incepti.

Et jam multos annos quidquid à Medicâ Praxi, à Morboforum Cadaverum Dissectionibus, à cæteris denique studiis vacabat, id totum huic labori impenderam; cum Amplissimi Bononiensis Senatus Beneficentiâ ad Publicum Incisionis, & Ostensionis Anatomicæ Munus in Celeberrimâ istâ Academiâ conductus sum. Quare ut me Splendidiſſimo illi Ordini gratum, & non minùs collato Muneri attentum quamprimum approbarem; quæcunque in Aure observaveram, illicò vulgandi; summatim nempe, & absque ullâ connexionē, prout ferè in adversarijs jacebant; consilium cepi. Sed non priùs operi manum admovi; quàm senserim, nullam, fermè Auris Partem esse, circa quam aliqua adnotanda non haberem; atque adeò longè fariùs, & majoris etiam perspicuitatis opus futurum esse; si ordinatum, atque completum de Aure Tractatum conscriberem. Itaque meam illam Novam Auris Præparationem aliquâ adhuc ex parte mancā, nec satis perpolitā, ad illud, quod potui, complementum priùs perducere; rursusque totam Auris Anatomē, præcipuè quod ad meas Additiones, aut Inventa spectabat, pluries, & pluries à capite ad calcem percurrere volui: quā in re præstandā tot Aures aperui; ut si enumerarem; jactationi potiùs simile, quàm Veritati videri posset.

Et hæc quidem mea de rebus sæpè spectatis, iterum, atque iterum dubitandi obstinatio, necnon Ægrorum quā Physicam, quā Chirurgicam opem, sive coram, sive per litteras exposcentium assiduæ interturbationes, complementum Operis ad hoc usque tempus remoratae sunt. Utrique tamen huic remoræ plurimum debeo; nam utrinque complura crui, unde Auris non solum Historiam; sed & Usus auge-rem. Imò nisi quædam Novæ in Ægris habitæ Observatio-

nes

nes quodammodò coegissent ; fortasse de Usibus Auris nec verbum quidem fecissem. Aliàs enim animum Historiæ soliditati assuetum, & Experimentiæ potissimum immorantem piget magis dicam, an pudet per inanes, quales quidem ut plurimum solent esse, speculationes, quali ludicrâ exercitatione volitare. Et hinc quidem factum est, ut mea circa Auris Usus cogitata, tametsi Observationi, quantum fieri potest, innixa, novisque, & ni multum fallor, utilibus notitijs conspersa ; ab ipsius tamen Auris Historiâ, ceu res diversæ omninò momenti, separaverim.

Itaque Tractatus hic meus ex duplici Parte constabit. Prima Humanæ Auris Descriptionem tribus Capitibus complectetur. Altera verò in totidem Capita distributa, conjecturas meas circa ejusdem Partium Usus exponet. Nihilominus, quasi Tractatus nequaquam in duas Partes divisus esset ; series Numerorum, quibus quodcunque Caput ab alio discriminabitur, à primo Capite usque ad ultimum nunquam interrupta ducetur ; scilicet ne Citationes, quæ aded brevitate amant, æquo longiores evaderent ; si, in unâquaque non solum Capituli, sed & Partis Numerus indicandus foret. Scire enim juvat, quòd cum mihi placuerit & ob rationem nuper expositam, & ne Descriptionis filo interturbato, obscurior hæc fieret ; Historiam ab Usibus separare ; placuit tamen illis etiam consulere, qui cum Partis alicujus Descriptionem legerint ; ejusdem Usus ; aut cum Usus viderint ; simul Descriptionem habere, aliquandò, ut sit, exoptabunt ; ideòque in Primâ Tractatus Parte, ubicunque Res aliqua describetur ; ibidem in Paginarum margine indicabitur locus, in quo ejusdem Usus quærendus est ; & similiter in Secundâ Parte, ubicunque alicujus Rei Usus exponetur ; ibi, quòd loci ejusdem Historia quærenda sit, indigitabitur ; Capite nempe non solum adnotato ; sed & Numero ejus Paragraphi, in quo continebitur. Etenim in hunc finem singula Capita in plures Paragraphos distribuimus, rursus verò cum istorum aliquos paulò longiusculos materiæ ratio exposulaverit ; ne qui unam rem quærit, totos perlegere semper debeat ; per breves rerum



tracta-



tractatarum summulas, iuxta eum locum, in quo tractantur, ubicunque per marginem Paginarum dispositas, sufficienter prospectum est.

Et hæc quidem sive Usuum, sive Historiæ Citationes, item breves istæ summulæ ex abundanti, ut modò innuebam, adiectæ sunt; sed Tabularum, Figurarumque Citationes, in margine juxta rerum mentionem, quarum Figuræ sunt, pariter dispositæ; ex necessitate adiungi debuerunt; Num Partes, quæ in hoc Tractatu describuntur, ut plurimum tales sunt, ut per nullam, vel exactissimam Descriptionem intelligi satis possint; atque adeò necessario Delineationem Descriptioni unitam expostulant, ut scilicet, quæ per solum auditum aut segniùs, aut nullatenus intelligi possent; protinus, adjuvante visu, capiantur. In hunc ego finem quidquid ex Humanâ Aure utile fuit, aut potuit delineari, decem luculentissimis Tabulis ad vivum exhibui, copiosisque additis Explicationibus illustravi: in quibus Tabulis consiciendis, nulli, non dico tantùm sumptui, sed labori, & studio pepercui; sæpè rejectis illis, quas minùs rem attingere videbam, Delineationibus, & novis in illarum locum usque instauratis: cui supra, quàm credi potest, diuturno labori extremam manum imponere desperassem; nisi mea illa Nova Auris Præparatio in omnibus ferè; at præcipuè in veris rerum sitibus delineandis insigni adjumento fuisset. Sed modò satis de labore hoc meo; maximè cùm de eodem rursus verba facere in Figurarum Explicatione contingat.

Interim quid demum post tot labores, & curas, quid, inquam, novi, rarive protulerim, Aliquis hic loci interrogabit. Cui interrogationi ne hic deberem singulatim respondere, prospexi tum passim per ipsum Tractatum, & subinde etiam per appositas in margine summulas, quæ nova attulerim, indicando; tum eadem ferè omnia in Indicem, sive Summarium ad calcem Tractatus colligendo & in hunc ipsum finem, & ut ejus ope in promptu sit, quæcunque aut nova, aut rara in hoc Libello videri possunt, quandocunque placeat, comperire. Hic ergo generatim solummodò respondebo.

bo. Primò id, quod supra innuebam. Nullam ferè Partem in Aure occurrere, in qua aliquid non invenerim, aut au-  
xerim, aut saltèm illustraverim; Ad hæc inter duas & qua-  
draginta Figuras, quas exhibeo; si una n, vel alteram in  
Tabulâ III. excipias; nullam esse, quæ similiter aut nova,  
non sit, aut auctior, aut saltèm luculentior; si cum jam vul-  
gatis comparetur. Nollem interim; cùm aliquot Nova in-  
venisse me, dico; Aliquem fortasse expectare magna quæ-  
dam, & quæ omnium oculos impleant, Inventâ. Etenim in  
Minimis, ipsque Minimis, quæ à tot Nobilissimis Anatomicis  
tantâ diligentia lustrata sunt, non nisi minima inveniri pos-  
sunt. Attamen non omnia, ut ego spero, minima videbun-  
tur; & eorum, quæ minima erunt, complura utilia; omnia verò  
jucunda invenientur; nam ut verbis Senecæ utar; *Minima-  
rum quoque rerum, si insolita prodierint, spectaculum dulce est.*

Illud multò minùs vellem; quòd nempe Aliquis in pe-  
jorem partem traheret meam hanc, quæ certè à damnabili  
causâ non provenit, apertissimam libertatem, qua ipse de re-  
bus meis absque ullâ dissimulatione dico: Hoc est clarius: Il-  
lud accuratius: Istud verò novum omninò est. Ut enim norunt,  
qui me norunt; à nullâ re magis, quàm à jactatione, & elato  
animo longè absum: nullusque, ut puto, est, qui Clarissimos il-  
los Auctores, qui ante me Aurem examinarunt, pluris faciat,  
quàm ipse ego; qui nempe proprio labore expertus sum,  
quid sit Aurem perlustrare. Imò tantùm apud me potest ta-  
lium Virorum Veneratio; ut quamvis Veritate cogente (quam  
quidè n unam præ ipsis veneror) eorum Anatomem, aut Co-  
gitata defecisse, alicubi ostendam; nullum tamen ibidem no-  
minem, nisi impliciter, & generatim. Ubicunque autem Veritas  
emergere per se ipsam potest; neque obscure, & generatim  
illorum defectus indico; ita ut sæpius eligam potius, aliquot  
eorum rationes, quæ contra Opiniones meas faciant, præ-  
termittere, & Lectori facilè solvendas relinquere; quàm cas-  
dem adducendo, & solvendo, Illorum lapsus indigitare. Sed  
hæc præstiti non ob solam tantorum Hominum Venerationem;  
verùm quoque ob communis humanitatis conscientiam, cu-  
jus

ius imbecillitati quemadmodum omnes obnoxij fumus; ita omnes indulgere debemus. Illud verò totum dedi Clarissimorum Virorum obsequio; quòd imposta ab ipsis nomina religiosè servavi: & cum pauca quædam immutare coactus sum; eorum, quodocunque licuit, in imponendis nominibus mori, & genio obsecundavi, ita ut aliquandò nomina, quorum sonus fortasse non ita gratus videri potest; potius adhibuerim; quàm à vulgatis eorum vocabulis penitus recesserim.

Quæ cum ita sint, meumque erga Majores obsequium non unâ ratione elucescat; illud faciliè, ut puto, à meis Lectoribus obtinebo, ut si fortè inter tot res, quarum sive inventionem, sive augmentum mihi tribuo; una vel altera aliquandò, ut sit, deprehendatur, quæ apud illos, qui ante me scripserint, reverà (reverà inquam) occurrat, non id scienter, aut malignè factum existiment; sed potius elapsum per communem illam cunctis hominibus infelicitatem; qui nempe nec omnium Libros legere possunt, nec lectos meminisse. Sed à prudente, & docto Lectore hæc ultrò condonantur sic, ut longiori oratione petere opus non sit.

Nec similiter talem Lectorem præmonere necessum est, quid cum Sanioribus Philosophis accipiam; cum Naturam, & similia nominabo. Illud verò oportet, ut moneam; Quòd cum passim ad rerum quantitatem exprimendam lineæ nomen adhibeam; per tale vocabulum duodecimam partem ejus mensuræ innuo; quam Tabulâ IX. sub Asterisci notâ proponam. Ego enim inter cætera hoc etiam curavi, ut nempe in Tractatu hoc meo ferè omnium præcipuarum Auris Partium exactæ dimensiones reperiri possent; adeoque quæ majori licuit diligentia, & curâ ex pluribus Auribus easdem dimensiones primò desumpsi, distinctèque notavi, deinde omnibus simul collatis, illas, quæ ut plurimum occurrere, visæ sunt, in meam Historiam retuli. Sed ne, quæso, interim Aliquis sit, qui harum dimensionum colligendarum laborem præcipitanter contemnat. Nam tum ipse, quantum, hic utilis sit Auditus Phænomena explicanti, ubi de Usibus Auris

**Auris**, ex parte ostendam: tum quisquis **Organum** hoc; quod ego describo, ad Sonum spectare, animadverterit; quanti longitudinum, & cæterarum ejusdem dimensionum, exacta Notitia inter reliquas ipsius Historiæ Partes facienda sit, protinus intelliget. Hæc, & similes animadversiones facient, ne prolixior videar in quibusdam sedulò describendis; ne quid fortè in Usuum Expositione supervacaneum existimetur; ne demum Figura aliqua, aut Figuræ alicujus pars inutilis censeatur; ut quidem ab incautis primâ facie judicari posset.

Denique tamen si ego, ut Scripta hæc perspicua evaderent; hic illic per opportunam prolixitudinem, ubiq; verò per styli remissionem operam dederim; nullus tamen dubito, quin alicubi obscurus videri debeam. Ut enim mittam illud genus obscuritatis, quod & commune, & inevitabile est in hujuscemodi Historijs conscribendis; nempe quòd ad Partis alicujus descriptionem absolvendam, nonnulla memorare quandoque oportet, quæ necdum ipsa descripta sint; hoc certè Historiæ meæ peculiare est, ut plurimum, quæ in illâ exponuntur, Partium, qualiscunque descriptio obscura semper videatur, tum quia, ut supra indicatum fuit, Res tales nunquam possunt sufficienter describi, tum quia eadem, non ut complures aliæ Partes, quæ in Theatris Anatomicis sæpè, & luculenter sub omnium oculis ponuntur, non inquam, faciliè possunt Legentium imaginationi succurrere, & suas descriptiones sic adjuvare. Verùm si Partium Auris jam notarum descriptio non obscura esse non potest; quid de tot rerum omninò Novarum descriptionibus expectandum est. Nec verò ipsorum Usuum expositio omninò perspicua esse potest; utpote quæ earundem Rerum Novarum, atque adeò non ità promptè in Lectorum mentem redeuntium structuræ, & coordinationi non rarò innixa sunt. Polliceor tamen, nullibi tantam occursuram esse obscuritatem, ut illam attentus, & non omninò rudis Lector superare non valeat, adiutus præcipuè rerum Delineationibus, quas nempe, ut superius quoque dictum est, in eundem finem perpetuò in contiguo Paginarum margine indicabimus.

Quem

Quem verò fructum attentionis suæ promittere sibi Lector possit; ex ijs, quæ passim per hanc Præfationem indicata sunt, ex parte jam vider, & ex Indice magis adhuc videbit, sic ut liceat mihi ab illâ re singillatim recensendâ hic loci abstinere. Ut verò summarim dicam; spero fore, ut neque Anatomicos, neque Chirurgos, neque Medicos, neque Philosophos omnino poeniteat Libellum hunc perlegisse; sed neque etiam Mathematicos; nam quantum ipsos de illâ Facultate, quæ circa Visionis proprietates versatur, conscripuros, Oculi Anatomen novisse decet; tantum eosdem in illâ, quæ circa Sonos, Auditumque consistit, Facultate edisserendâ, Auris Anatomen callere convenit: rursus quantum Lentæ, Camera Optica, & similia secundum Oculi structuram elaborata Instrumenta ipsis, dum Opticam exponunt, adiumento sunt; tantum Instrumenta juxta exactam Auris, aut ejus Partium fabricam constructa, eosdem Auditus Proprietates contemplantæ, faciliè juvabunt. Atque utinam tantum mihi otii concessum fuisset, quantum ad talia Instrumenta construenda, experiendaque requirebatur; ut credo, me ipsis adiutum, & plura, & meliora, in meis circa Auris Usus Disquisitionibus propositurum fuisse. Verùm Præfatio, me quasi non sentiente, multò supra, quàm voluisssem, excrevit; nec te amplius, o Lector, morari convenit.

Vale.

## DE AURE HUMANA

## Tractatus

## P A R S P R I M A

Continens Auris Descriptionem.

*Auricle, & Meatus Auditorii, sive Exterioris  
Auris Cavitatis Descriptio.*

## CAPUT I.



E Aure Humanâ acturus,  
eandem in Tres Cavita-  
tes, scilicet in Exterio-  
rem, Mediam, & Inter-  
riorem divido. Exterior  
Auriculam, Meatumque  
Auditorium ; Media  
Tympanum ; Interior ve-

*Auris Diviso.*

rò Labyrinthum comprehendit : De quibus sin-  
gulis, atque in ipsis contentis Partibus eodem  
fermè ordine scribam , quo scrutantium dili-  
gentiæ successivè se produnt.

*Ordo scribendorum.*

II. Exterior igitur Auris Cavitas Auricu-  
lam, & Meatum Auditorium complectitur.  
Auricula Pars illa est omnium oculis obvia,

*Auricula, & prima  
ejus Eminentia, &  
Fovea.*

A

quæ

Earundem Delineationem

Vide Tabulà I. Figurà I.

Usum verò

Capite IV. Numero II.

quæ in Capite extra Os Temporum prominet. Nonnullis, eisque tortuosis Eminentijs, ac Foveis & elevatur, & deprimitur. Eminentiarum extrema, quæ Helix est, à Conchâ exsurgit, quam in duas Cavitates videtur distinguere; hinc contorti aggeris in modum majorem Auriculæ portionem, & præcipuè versùs superiora circumambit; ac ad postica, superato illius dimidio, quasi complanata paulatim obliteratur, & in illam infimam, mollemque Appendiculam abit, Lobum Auriculæ dictam; cui nimirum Fœminæ ornamenta committunt. Descriptæ Eminentix interiora versùs altera Eminentia opponitur, quæ Anthelix est. Hæc bipartito mediante Foveolâ principio, in Auriculæ anteriori, & quasi superiori parte incipit; inde unita, deorsum, curvo progressu vergens, sensim gracilescit, quousque aliam Eminentiam, veluti distinctam, & supra Auriculæ Lobum locatam, constituat, quam Antitragum dicunt, & hoc quidem ob alteram Eminentiam, quam fermè è directo respicit, Tragum, seu Hircum nonnullis vocitatam. Foveæ descriptis Eminentis interjectæ sunt, quæ diversas sortiuntur denominationes; Illam enim, quæ inter Helicem, & Anthelicem excurrit, nonnulli Innominatam; quæ verò inter principia Anthelicis excavatur, Scapham vocant; quæ demum ab Anthelice, Helicis portione, Trago, & An-

& Antitrigo ambitur, omnium maxima, Concha nominatur : in duas quodammodò distincta Cavitates, Superiorem nimirum, & Inferiorem. Sed in harum Cavitatum, atq; Eminentiarum nominibus variatim ludunt, nec sibi ipsis ubique constant Anatomici.

III. Auricula Eminentis, ac Foveis sic configurata, vestitur Cute, quæ hîc præter communem sui texturam plurima nanciscitur foramina, præcipuè in Conchâ, Scaphâ, & Innominatâ Cavitate, necnon in parte posteriore Conchæ usque ad Capillitium. Hæc ubi hiant, sæpè Cutis veluti in minima tubercula assurgit : & si fiat expressio; materia sub formâ vermiculorum erumpit; quæ naturaliter exiens, postmodum exsiccata, in furfuraceas distincta particulas in indicatis locis colligitur. Hujusmodi materia à subiectis Glandulis separatur, quarum natura; si earum excreta attendantur; eadem est cum illis, quæ in Spinâ, Aliisque Nasi, necnon in aliis Faciei Partibus, præcipuè verò sub Palpebris, occurrunt. Tales Glandulas usque adhuc in Auriculâ à nemine observatas, ut ab aliis discriminem, quæ in hac primâ Auris Cavitate considerantur; attentâ secreti humoris cum Sebo similitudine, Glandulas Sebaceas dicam. Similes Glandulas adesse in capillatâ Capitis parte, necnon in quibusdam aliis Corporis regionibus, præter expositas, est conjecturæ

*Auricula Cutis : & Glandula Sebacea noviter inventa.*

*De Harum Ufu Vid. Cap. IV. Num. IV.*

*Glandula ejusdem natura sub Palpebris.*

*Glandula ejusdem natura fortassis in pluribus aliis locis.*



locus. In capillatâ Capitis parte præbet dubitandi ansam illa unctuositas, quæ sæpè in eodem percipitur, insimul cum furfuribus illis, qui inter pectendum è Capite decidunt. In aliis locis idem potest conici ex unctuositate quadam, quæ in indusiis, præsertim in aliquibus Subiectis, circa Collum, & Scapulas solet manifestari. Cuti Membrana subternitur Adiposa, quæ hîc tale nomen mereri non videtur; cùm vix aliquam exhibeat pinguedinis speciem præter illam paucam, quæ ad Auriculæ Lobum, & partem Helicis inferiorem occurrit.

*Membrana Adiposa  
Auricula.*

*Auricula Cartilago.*

*Delin. Vid.  
Tab. I. Fig. II.*

*Usum Vid.  
Cap. IV. Num. II.*

IV. Cute, & Membranâ Adiposâ ab Auriculâ remotis, Cartilago Indagantium scrutinio obijcitur. Ab hujus consistentiâ Eminentia, & Foveæ jam descriptæ effinguntur; si Auriculæ Lobus excipiat, & pars Helicis inferior, quæ à simplici Communium Integumentorum duplicatione construuntur. Eadem Cartilago ad Auriculæ medietatem inferiora versûs, quâ Helicis extremum producit, ab Anthelice disiuncta spectatur. De cujus Cartilaginis alijs disunctionibus, ubi eadem Meatus Auditorii principio continuatur, alia superessent notanda; quæ ad ejusdem Meatus Historiam consulto omittuntur. Rursus hæc Cartilago ultra superius enarratas Eminentias quendam obtinet Processum, usque adhuc ab Anatomicis prætermissum, &

lo-

*Caput 1.*

3

solùm oculis obuium post diligentem Cutis separationem; nobis tamen ob Ligamenti inferius describendi insertionem non omittendum. Huiusmodi Processus exiguus, & acutus est, & in parte anteriori Cartilaginis collocatur, ubi Helix immediatè supra principium Meatus Auditorii Conchæ cavitatem claudit.

V. Super hac Cartilagine ad Tragus versus Faciem quædam Glandulæ deteguntur, de quibus hucusque nulli meminerunt. Hæ parvi ciceris extensionem solent habere, aliquandò duæ, aliquandò tres; at sæpè unica tantùm existit: quod cum est; tunc aucta magnitudo numeri compensat defectum. Earundem inquisitio debet exactè institui; quia cum Parotide ad Tragus extensâ, quandoque confunduntur; sed tamen hoc oculus, atque diligens Anatome pulchrè distinguit; quia illæ differunt ab istâ ob compositionem, quam sibi vindicant, ex toto similem Inguinalibus, & Axillaribus, necnon aliis Glandulis, per quas Lymphatica ingredientia, & egredientia pervadunt. Porro illas Glandulas nomine Glandularum Tragi accipio.

*Noviter inventa  
Glandula Tragi.*

Delin. Vid.  
Tab. I. Fig. 1.

VI. Ultra Partes hæcenus in Auriculâ consideratas, accedunt Musculi; quorum aliqui, cum uno tantùm extremo Auriculæ adnexi, reliquo suo corpore extra ipsam jaceant; Externi; alii verò, cum utrumque extremum in-

*Auricula Musculi.*

Usum Vid.  
Cap. IV. Num. III.

trà

*Externi.*Delin. Vid.  
Tab.I. Fig. III.*Musculus Superior  
Auriculae.**Musculi Auriculae  
Posteriores.*

trà Auriculam obtineant; Interni à me nuncupantur. Externorum unus Superior; tres Posteriores à situ dicuntur: quorum omnium Inventio debetur Casserio. Istis nos unicum Anteriorem addimus. Musculus Superior, qui à fibrarum carnearum quasi simplici plano construitur, circa Musculi Temporalis medietatem sparsis fibris exoritur; hinc descendendo, & simul latam suam expansionem aliquantùm constringendo, multis fibris tendineis sparsim in partem superiorem Conchæ, nec non Scaphæ à tergo infigitur. Musculi Posteriores Auriculæ quandoque quatuor, quandoque duo; sed ut plurimum tres adnotantur: & quando solum duo se manifestant; tunc unus ex illis duplicato tendine, versùs Concham deferri solet. Horum Musculorum in numero varietatem non solum in diversis; verùm etiam in eodem Subiecto quandoque vidi. Tres itaque Musculi frequentius (non verò simplex fibrarum carnearum massa, ut Quidam tradiderunt ex Recentioribus) in Auriculæ posteriora inseruntur. Hi successivè unus infra alium; origine tamen quasi unitâ; ab Ossè Temporalis supra Processum Mamillarem excurrentes, demum versùs Auriculam delati; triplici distincto tendine ad partem posteriorem Conchæ perveniunt; ad quam Medius pertingit è directo ei loco, ubi Helix à Conchâ elevatur; reliqui duo pa-  
rum

rum distantes ad ejusdem latera disponuntur. At sicut hi Musculi variant, ut scripsi, in numero; variant etiam non ita raro in modo incedendi. Frequenter enim Lateralium Musculorum fibræ Medii fibras supercandunt: aliquoties parallelo ordine pergunt: & tendines aliquandò paulò inferius; aliquandò paulò superius Conchæ alligantur. Ex quibus differentiis subortæ sunt Auctorum discrepantiæ in horum Musculorum numero, & positu, ut ex eorundem Scriptis liquet: quod non evenisset, si pluries in diversis Corporibus iidem Musculi quæsitæ essent. Nam ex multiplici observationis usu impetratur, quid in Naturâ sit perpetuum, quid usitatius, quid indifferens, & quid rarum. Musculus denique Anterior noster à Membranâ Temporalem Musculum vestiente, immediatè supra exortum, Processus Zygomatici ab Osse Temporum, enatus, rectâ versùs Auriculam tendit; quam antequàm attingat; in duas dividitur partes, quarum altera in partem anteriorem Superioris Conchæ Cavitationis; altera verò paulò superius in partem anteriorem Cavitationis Scaphæ infigitur. Musculis Externis aliquandò accedunt Fibræ Carneæ à Musculo Quadrato Colli ad partem Auriculæ inferiorem delatæ.

*Auricula Musculus  
Anterior noviter in-  
ventus.*

VII. Externorum Musculorum examen. Descriptio excipit Internorum; qui videlicet  
utrum-

*Musculi Auricula  
Interni noviter in-  
venti.*

Delin. Vid.  
Tab. I. Fig. IV.

*Musculus Tragi.*

*Musculus Antitrangi.*

*Fibra Transversa in  
gibbo Auriculae.*

Delin. Vid.  
Tab. I. Fig. III.

utrumque extremum intrâ Auriculam habent, & quos hæcenus non indicarunt Anatomici. Hi sunt numero bini : & licet parvi sint ; at tamen omnium oculis fient conspicui, maxime si in Cadaveribus eorum, qui non fuerint macie confecti , illorum instituatur indago . Unus ex istis Trago ; alter verò Antitrago donatur : unde primum Musculum Tragi, & secundum Musculum Antitrangi dicam . Musculus Tragi fibris carneis externam Tragi faciem occupat , ambitu ferè circulari circumscriptus . Musculus Antitrangi basim habens ad partem posteriorem Antitrangi, & Pyramidis in formam assurgens, in marginem Conchæ inferitur , ubi Anthelix desinit . Istis Musculis in Auriculâ associantur Fibræ Carneæ, quæ à gibbo Conchæ circa ejusdem dimidium recedunt, & in Anthelicem transversè extenduntur, ubi hæc marginem Conchæ elargitur . Hæc verò sensibiliores sunt in parte mediâ, quàm in superiori, & inferiori; adeò ut in istis aliquando ex toto abscondantur.

VIII. Auricula, ut continuatam cum Meatu Auditorio Cavitatem componat, debitumque situm conservet; Ossi Temporum firmiter alligatur. Quippe præter connexiones, quas obtinet per Musculos suos Externos; membranaceos habet nexus eandem circumplectentes, quorum ministerio eidem Ossi unita existit. Hi validiores, & distinctiores sunt

sunt in parte Auriculæ anteriori, quàm in reliquis. In illâ enim; licet adhuc ab aliis memoratum non fuerit; faciliè obuium est Ligamentum quoddam, per quod Acutus ille Processus in Auriculæ Cartilagine indicatus, necnon pars superior Cartilaginis Meatus Auditorium componentis Ossis Temporalis annectitur, quò loci Zygomaticus Processus ab isto erumpit.

*Ligamentum Auriculæ Novum.*

IX. Exteriorem Auris Cavitatem Meatus Auditorius complet. Hic Canalis quidam est à coarctatione Conchæ incipiens, & usque ad Tympani Membranam per Os Temporum, transversè progrediens, ità tamen, ut à situ verticali secundùm altitudinem versùs Faciem declinet. Ejus cavitas Cylyndro Ellyptico assimilari potest; qui tamen non rectà; sed serpentino incessu procedat. Ipse enim principio parùm ascendit; indè circa dimidium sectione circulari curvatur deorsum; iterùmque ascendit; demùm, maximè suâ parte inferiori, ad Tympani descendit Membranam, à quâ obliquâ sectione clauditur sic, ut faciat cum hac obtusum angulum parte superiori, & posteriori; acutum verò anteriori, & inferiori. Sed ut hujus cavitatis configuratio clarè percipiatur; ad quam dilucidè explicandam verba minùs sufficere, intelligo; nullus aptior modus est; quàm si cerâ, vel alio liquato corpore eandem repleas: ità enim ablatis postea

*Meatus Auditorius.*

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. I.

*Incessus Meatus Auditorii accuratius descriptus.*

Usum Vid.  
Cap. IV. Num. V.

*Verum Meatus Auditorii Incessum observandi Novus modus.*

partibus illam circumſcribentibus, remanet in concretâ materiâ cavitatis diſtincta figura, qualem quidem ſupra deſcripſi; & quæ ab eâ, quam hætenus vulgati Iconiſmi demonſtrant, non parum diſcrepat. Canalis iſtius longitudo, in iplius quidem medio deſumpta, novem lineas, altitudo quatuor, latitudo verò tres æquat: quæ tamen latitudo in iplius principio major eſt.

*Meatus Auditorii  
Pars Cartilaginea.*

Delin. Vid.  
Tab. I. Fig. II. &  
Tab. IV. Litt. f.f.

X. Componunt Auditorii Meatus parietes Pars Cartilaginea, & Pars Oſſis Temporum. Pars Cartilaginea à coarctatâ Conchæ Cartilagine formatur, quæ verſus Faciem reflexa, & intrinſecùs elongata, ſi à Trago metiamur, pluſquàm dimidiam Meatus longitudinem in parte inferiori, & anteriori conſtituit; nam partem ſuperiorem, & poſteriorem huic correfpondentem ſupplet cum ipſâ Conchâ Pars Oſſea ejuſdem Meatus, de qua inferiùs. Hæc Cartilago variis in locis eſt interrupta per Inciſuras à membranofis expansionibus tam verſus interiora, quàm exteriora Meatus clauſas: quarum Inciſurarum mentionem primùm vidi apud D. Du Verney. Iſtæ autem, ut ego obſervo, nec figuram, nec numerum certum fortitæ ſunt; ſæpiùs tamen duæ obſervantur, prior quarum paulò ſuperiùs; altera verò paulò inferiùs ſolet locari, & minorem, quàm præcedens, habere longitudinem. Interdum hæ duæ Inciſu-

*Meatus Auditorii  
Inciſura accuratiùs  
deſcripta.*

De harum Uſu Vid.  
Cap. IV. Num. V.

furæ quasi concurrunt, angulum describentes acutum. Aliquando defectum unius, vel ejusdem brevem productionem compensant nonnulla Foramina, eandem Cartilaginem penetrantia, & à Membranis pariter clausa. Parti Cartilagineæ, ut indicabam, accedit Pars Ossea, sinus videlicet in Osse Temporum excavatus, qui Parti Cartilagineæ è directo collocatur, unum continuatum Canalem cum hac efformans. Ille suâ extensione; si partem anteriorem, & inferiorem spectes; quasi dimidiam torius Meatus longitudinem; si verò partem posteriorem, & superiorem; integram quasi ejusdem longitudinem æquat.

*Meatus Auditorii  
Pars Ossea.*

Usum Vid.  
Cap. IV. Num. VI.

XI. Torus Meatus internè cingitur Cute, quæ postquam Auriculæ indumentum præstitit; Meatum Auditorium ingreditur; & cum ad ejusdem medietatem pervenit; in Membranam gracilescit tensam; at simul humore quodam aqueo madidam: quem ipsa sibi excernere, secundùm ea, quæ alibi de consimilibus Membranis indicabimus, ab Aliquo fortè credi potest. Et tali quidem Membranâ quod reliquum est Meatus investitur; imò ab eadem ulteriùs extensâ Membranæ Tympani exterior facies, uti scribemus, producit. Porro Cutis à principio Meatus Auditorii usque circiter ad dimidium parvis ornatur pilis; plurimis verò est pervia foraminibus, per quæ Cerumen egreditur.

*Cutis Meatus Auditorii accuratius descripta.*

Usum Vid.  
Cap. IV. Num. VI.



*Glandularum Mra-  
tur Auditorii No-  
vum Corpus Reti-  
culare.*

Delin. Vid.  
Tab. III.  
Fig. II. & III.

*Glandula Meatus  
Auditorii,*

*Cerumen.*

*Surditas à copiâ in-  
durati Ceruminis.*

XII. Membrana Adiposa Cuti subiecta, ingreditur & ipsa Meatum; licet solum usque ad hujus medietatem elongetur: & ab ingressu statim abit in Fibras Carneas reticulari ordine dispositas. In hujus Reticularis Corporis, hucusque non animadversi, arcibus firmantur Glandulæ, quarum primam delineationem debemus D. Du Verney. Hæ figuram obtinent variam: major tamen harum pars vel ad ovalem, vel ad sphericam accedit. Colore tinguntur flavo ab humore in earum folliculis contento, qui ob assiduam Fibrarum, Carnearum Reticularium pressionem, per Cutis correspondentia foramina in Meatus Auditorii cavitatem transmittitur. An singulæ hæ Glandulæ peculiares habeant Excretorios Tubulos correspondentes foraminibus Cutis; an immediatè uniantur eisdem, absque ullo interposito Vase Excretorio; sunt qui determinant: mihi verò adhuc non constat. Secreta autem per hæc Glandulas materia, sapore amaricante (ut notum est) necnon visciditate donatur; si quidem ea consideretur, quæ in Meatu Auditorio jam collecta est. Hæc materia aliquandò ita copiosè circa Tympani Membranam aggeritur, & in solidum corpus induratur; ut secundum illas, quas habet D. Du Verney, & meas quoque Observationes Surditatem inducat. Quæ Surditatis species, etsi frequenter sit obvia; attamen

ra-

rarò, quia non cognita, curatur; quamvis diligenti manuum auxilio desiderata possit restitui sanitas: quod annum ante, propriis manibus præstiti D. Bertocchio, Doctoris Medici Patre, septuagenario majore, qui per duodecim annos surditate laboraverat ab eadem materiâ prope Tympani Membranam indurâtâ.

*Talis Surditatis à duodecim annis asfigentis Curatio.*

XIII. Pro Meatus Auditorii Coronide, sciendum est, in Fœtu, atque etiam in Infante recenter nato Meatus parietes, maximè circa Concham, ad invicem ità accedere; ut Meatus principium ferè ex toto claudatur: & tunc hujus parietes à substantiâ crassâ, & subalbidâ recti conspiciuntur, quæ ulteriùs ad Tympani Membranam extensa, alia in ibidem Membranam videtur componere, sensim progrediente tempore exsiccandam, & in minimas distinctam particulas cum Ceruminis materiâ ab eodem Meatu egressuram. Quòd si talis Membrana non decidat; imò firmior evadat; Surditatis à nativitate species inducitur: quam quidem difficulter; sed tamen si in rebus Chirurgicis, & Anatomicis præcipuè, fueris versatus; sanare poteris.

*Meatus Auditorii in Fœtu, & recens natis constitutio.*

Usum Vid.  
Cap. IV. Num.  
VII.

*Quædam Surditatis à nativitate species, nihilominus curabilis, indicatur.*

XIV. Cavitas Auris Exterior, quam usque adhuc descripsimus, Vasis Sanguineis vehementibus, & revehentibus ditatur. Obtinet Arterias à Carotidum Externo Ramo, qui dum lateraliter per partem Auriculæ anteriorem,

Delin. Vid. Tab. II.

*Auricula, & Meatus Auditorii Arteria.*

*Forandem Vena.*

*Quibus Rami addun-  
tur à noviter de-  
scripta Venâ Occi-  
pitālī.*

Delin. Vid.  
Tab. VII. Fig. II.

*Nova Bassi Cranii  
Foramina.*

Delin. Vid.  
Tab. IV. Litt. d. d.

*Nervi Auriculæ, &  
Meatus Auditorii.*

Delin. Vid.  
Tab. II.

versus Tempora ascendit, aliasque superiores Capitis Partes; Ramulum primò per-posteriora Auriculæ; deindè alios per ejusdem anteriora spargit: qui omnes non solùm Auriculæ; sed & Meatus Auditorio prospiciunt. Venæ omnibus hisce Arteriis associantur; si tamen excipias Rantum, qui versus Tempora ascendit; hic enim sinè loco Venæ Trunco frequenter invenitur. Porro Venæ istæ ad Iugularem Externam omnes mittuntur. Præter hanc Venam Iugularem, ab Auriculæ posticâ parte revehit sanguinem etiam Vena, adhuc ab aliis non descripta; quam ego Occipitalem appellabo; cùm alios, & quidem valde plures Ramos ab Occipitis partibus accipiat; Ramosque omnes ad Occiput in Truncum recol- ligat, Venæ autem istius Truncus post Mamillarem Processum, paulò tamen interiùs, per peculiare Novum Foramen intrà Cranium ingreditur, & defert sanguinem, dexter quidem Truncus in Sinum Lateralem dextrum; sinister verò in sinistrum Sinum Lateralem Duriæ Matris eò loci, ubi ipsi Sinus versus Cranii Bassim se reflectentes, jam jam istam tangere incipiunt.

XV. Nervi duplici origine distincti, per Exteriorem hanc Auris Cavitatem distribuuntur. Primò enim Auditorii Nervorum Paris Portio Dura, ab Aqueductu Falloppiano egressa, hinc divisa, & subdivisa in Ramulos, horum

rum unum ad partem Auriculæ anteriorem, Meatumque Auditorium, & Capitis superiora mittit; reliquos verò quasi per omnes Faciei partes diffundit sic, ut omninò nullus Portionis Duræ sensibilis Ramus per Auriculæ posteriora ascendar: quod Recentiorum Aliqui; & erroneè quidem, secundum multiplices inspectiones meas; recensuerant, & delineaverant. Secundò ad Auriculam alii Nervi accedunt; quippe inter primam, & secundam Colli Vertebam Nervus egreditur, qui (non finè occulto fortassis Naturæ consilio) primum ad duos digitos transversos, & ultra descendens; indè verò ad superiora reflexus, postquam ab ipso fermè reflexionis suæ angulo ad Musculos, qui in Collo sunt, & ad Mandibulam Inferiorem, atq; Parotidem Ramos dimisit; reliquo Ramo versùs Auriculam incedit: & ubi prope hanc alterà Propagine Parotidi prospexit; post ipsam Auriculam ad superiora Capitis procedens, Ramum deniq; mittit ad tergum Antitragi; qui postmodum per totam posteriorem Auriculam ascendit. Porro hic Ramus ille est, qui à quibusdam Practicis ad sedandam Odontalgiam aduritur: cujus Rami, atque adeò ustionis certior locum, cum à nonnullis Auctoribus non ità clare indicatum viderim; & à pluribus interim in Operatione, igne ipsum minimè tangi, conspiciam; opportunum duxi brevibus hic eundem

*Nervi post Auriculam in Odontalgia adurendi certior loci.*

dem ostendere. Debet igitur Chirurgus tergo Antitragni, & quidem per transversum Auriculæ, ignitum ferramentum applicare: quod quatuor lineas longum sit; hoc enim intra spatium certè includitur Nervus. Cæterum ferramento crassities exigua sufficit: neque oportet aliùs urere, quàm usque ad cartilaginem.

*In Exteriori Auris  
Cavitate Lymphati-  
ca adesse, conicitur.*

*Glandula Lymphati-  
ca in Parotide.*

Delin. Vid.  
Tab. I. Fig. I.

XVI. Præter recensitas Arteriarum, Venarum, Nervorumque Propagines, probabiliter hic quoque Lymphatica aderunt. Quæ licet hætenus non patuerint propter Partem in horum indagine Observatorum inquisitioni difficilem se præbentem; nihilominus si inductioni detur locus; ulteriùsque animaduertatur, circa Tragum, ut scripsi, Glandulas reperiri, in quibus stabili Naturæ consuetudine alibi Lymphatica ludunt; cujus speciei & unam majusculam in Parotide etiam Humanâ (nam in Vitulinâ tantum, similem Glandulam detexerat Steno) sub ipso Auriculæ Lobo multoties observavi; etiam in Auriculâ, Meatuque Auditorio adesse Lymphatica, vero simile videri potest.



*Tym-*

*Tympani, sive Media Auris Cavitatis  
Descriptio.*

*CAPUT II.*



BSolutâ Exterioris Cavitatis Descriptione , ad Mediam Auris Cavitatem jam pergo, quæ præcedenti immediate succedit .

Quod ex eâdem primùm occurrit , pellucida quædam Membrana est , quæ vel ipsos Medicinæ Patres non latuit , Tympani Membrana usitatus dicta , eo quia Tympani Cavitatem superimpositam claudat . Hæc in fine Meatus Auditorii extenditur , eundem obliquè claudens , efficiendo angulum obtusum circa superiora , & posteriora ; acutum verò circa anteriora , & inferiora parietum ejusdem Meatus , ut in hujus Descriptione animadvertēbam . Nec quamvis valde distenta sit ; planum ideò rectum constituit ; sed in medio versùs interiora conicè gibbum , eò videlicet ; uti scribetur ; à Mallei Manubrio tracta . Hujus Membranæ Ellyptica peripheria in paris figuræ ( nisi quòd ex unâ parte interrumpitur ) osseo anulo validè firmatur ; nam cum in Fœtu iste anulus intrinsecùs sulco excavetur , & ab hoc Membranæ peripheria excipiat ; hæc superadditâ progressu temporis ossèa substantiâ , sulcoque coarctato , in-

C

se-

*Membrana Tympani.*

Delin. Vid.

Tab. III. Fig. III.

Tab. X. Fig. I. II.

Usus Vid.

Cap. V. Num. IV.

*Noviter detecta.  
Membrana Tympani  
Compositio ex duplici  
membranacea expansione,  
Durae Matris  
scilicet, & Cutis Meatus  
Auditoris.*

separabiliter eidem anulo connexa evadit. Ex duplici, diversâque expansione membranacea Tympani Membrana componitur (quæ Compositio in Humano Fœtu patescit) nam Dura Mater Tympani Cavitationem ingressâ per commissuram, quæ inter Os Temporale, & Petrosolum occurrit, & expansa per eandem Cavitationem, quò usque pertingat ad indicatum osseum sulcum; huic committitur, & per totum anuli intermedium spatium extenditur, internam producens Tympani Membranæ faciem: cui altera membranacea expansio à Cute Meatum Auditorium investiente proveniens, itidem in osseo firmata sulco, unitur, externam ejusdem Membranæ faciem, constituens. A qua, usque adhuc ignotâ, Compositione, ex Duræ Matris scilicet, & Cutis membranceis expansionibus considerabilis Membranæ Tympani firmitas, & robur dependet.

*Utrum in Membrana Tympani Foramen aliquod sit, per quod possint Fluida à Tympano in Meatum Auditorium transire.*

II. Etsi verò scripserim modò, Tympani Cavitationem per Tympani Membranam claudi; dubitari tamen potest, utrum hæc aliquo sit pervia Foramine, per quod & naturaliter, & in morbosis constitutionibus fluida corpora possint in Meatum Auditorium ab eâ Cavitate pertransire. Sic dubitandi causam præbet Tabaci fumus, quem ore prolectum multi per Meatum Auditorium, ut fertur, transmittunt: item sanies Abscessuum in interioribus

bus Capitis disruptorum, necnon sanguis in Cranii percussionibus per eundem Meatum, absque ullâ rupturæ Membranæ Tympani suspicione, multoties exstillans. Ego quidem non pauca, ut hujusmodi transitus viam attingerem, peregi tentamina; sed in hoc observationis usus adhuc nihil certi me docuit. Nihilominus aliquid subobscurè vilus sum obtinuisse, quod, ut puto, cum D. Rivini Observatione convenit. Quippe iste de hoc Membranæ Tympani Foramine alia præfatus, quæ nondum ad me pervenerunt; hæc verba addit apud D. Munnicks: *Hiatum hunc si cui intueri lubet; ei Styliformem Processum cum eâ Ossis Petrofi portione prudenter auferre necessum est: tunc enim Tympani Membrana prorsus illesa conspicitur, porcina seta immediate sub Chordâ non difficulter admittens.* Ab hac, inquam, Rivini Observatione non multum abludunt, quæ aliquoties mihi occurrerunt. Nam olim cum nihil adhuc de Rivini Observatione scirem; exiguum quoddam, & sincerum Foramen inveni in Tympani Membranæ peripheriâ, ubi Mallei Processus Minor eandem aliquantum versùs Meatum Auditorium elevat. Illud quidem verum est, me pluries postea in hujus Foraminis confirmationem inquirendo, quid simile rursus videre non potuisse. Nam licet sepè & ego eodem, fortè ad Rivini morem, setam porcina adegerim sic, ut

*Circa idem Foramen Observatio.*



*Circa idem Foramen alia Observatio.*

*Alia Observatio circa idem Foramen.*

ab unâ extra alteram Membranæ faciem penetraverim; anceps tamen semper fui; num verum Foramen adfuerit; num verò adacta manu seta sibi viam vi fecerit. Veruntamen hoc certum est, Tympani Membranam minùs esse tensam, ubi Rivinus, & ego Foramen vidimus; & quòd in Cadaveribus aliquandò per Membranam guttas aqueas eodem loco emanare, animadverti; etsi factâ postmodùm injectione per Tubam Eustachianam in Tympani Cavitatem, & vi impulsò liquore, nullus liquor ad Meatum Auditorium pervaserit. Ceterùm ut in hujus transitus obscuritate multifariam experirer, an mihi clariora constare possent; à naturali statu ad morbosas constitutiones transire volui. In Cadavere ergo Viri, cui à Capitis percussione primò sanguis, & postmodùm purulenta materia copiosè per sinistram Aurem exstillaverat; cujus tamen exitus tertiâ hebdomadâ ante mortem cessavit; inveni Tympani Membranam, qua parte Meatum Auditorium respicit, tenuiquadam subcrocèâ quasi pelliculâ obductam, quæ facilè ex materiâ puris ultimò excurrentis relictâ concreverat, ut clariùs ex illis, quæ addemus postea, cognoscetur. Hac ablatâ, Tympani Membranam consideravi, in qua nulla adfuit læsionis nota. In loco indicato de more setâ porcinâ transitum perquisivi, & sanè primâ, vel alterâ con-

conquisitione non difficulter eadem seta ingressa est. Denique cùm aliquandò advocarer ab Ornatissimo hujus Urbis Patricio ad Ulceris, quod in Aure gerebat, curationem. (quam quidem, & alias aliquot similes; ut id obiter referam; post instillati Balsami Peruviani usum, absque ullâ remanente Auditus læsione, confeci) cùmque illi pus continenter ab Aure exiret, cum quo grumefactus sanguis interdum commiscebatur; ego, ut si fortè aliquatenus appareret læsio, oculis scrutarer; Meatum Auditorium Soli objeci, ejusdemque principium diduxi. Vidi itaque Tympani Membranam ichore madentem parte superiore, certoq; loco: ex quo pariter loco fluidum morbosum simul cum aere prorumpens vidi, quandocumque æger clausis Naribus, & Ore, uti jubebam ego, aerem intrò vi comprimebat. Porro designatus locus ille idem erat, per quem indicatum adesse transitum, suspicio est.

*Alia itidem Observatio circa idem Foramen.*

*Ulcerum Auris felices Curationes.*

III. Membranæ Tympani Tympani Cavitas superincumbit, quæ insimul cum illâ Mediam Auris Cavitatem componit. Tympani ergo Cavitas in Osse Temporalis, & Petroso exculpta, irregularem licet sortita sit configurationem; attamen videtur ad Sphæricum in supernâ, & internâ parte inæqualiter complanatum accedere. Ejus interioris superficiæ maxima pars à cavernulis, eminentiis, atque fo-

*Cavitas Tympani.*

foraminibus interrumpitur. Altitudinem obtinet in aliquibus locis majorem; & in aliis minorem: minorem ibi, quò Cochleæ apex descendit; majorem Ovali Fenestrâ è directo. Minor altitudo duas lineas quasi æquat; major tres lineas vix superat. Longitudo, & latitudo vix ab invicem differunt; nam quatuor lineis utramque metimur; si quidem longitudini Sinuositas Mastoidea dematur. At si hæc illi meritò uniatur; multò erit longior: & latitudo ob additam longitudini Sinuositatem inæqualis ipsi jam erit. Hujusmodi Sinuositas Antrum quoddam est, cum aliis Mamillaris Processus minoribus sinuositatibus communicans, quod reverà tanquam appendix ad complendam Tympani Cavitatem concurrir; nam per spatium satè notabile cum hujus superiori parte communicat; ut observanti patebit. In quibus verò Animalibus talem Sinuositatem deesse, observavi; ipsa Tympani Cavitas longè amplior est. Ex quo colligitur, Sinuositatem Mastoideam à Tympani Cavitate non distingui; sed ipsi uniri, eamque ampliorem reddere.

*Sinuositas Mastoidea pars est Cavitatis Tympani.*

Usum Vid.  
Capite V. Num.  
X.

*Quatuor Officula.*

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. XI.  
Tab. X. Fig. I.

Usum Vid.  
Cap. V. Num. II.

IV. Quod in Tympani Cavitate Membrana Tympani immediatè succedit, sunt quatuor Officula; Malleus, Incus, Os Orbiculare dictum, & Stapes. Malleus, & Incus primò Anatomicis innouere, Inventore Carpo, aut potius Achillino. Malleus pro majori sui par-

parte Membranæ Tympani per longum valdè adhæret sic , ut ejus centrum intrò trahar. Est Os valde tenue , vix tres lineas longitudine excedens : superiori parte , qua cum Incude articulatur , est crassius ; & hæc Caput Mallei dicitur ; alterâ verò , qua unitur Membranæ Tympani , tenuius ; hanc verò Manubrium nominant . Caput , quod in Sinuositatis Mastoideæ principio , absque ullo tamen cum eâdem nexu , reconditur ; ex alterâ parte hemisphæricam ; ex alterâ verò superficiem obtinet inæqualem ; ut hujus beneficio , indicata cum Incude articulatio componatur . Manubrium à tribus acutis Processibus constituitur , primo Majore , secundo Minore , & tertio Minimo . Major cum Tympani Membranâ colligatur , & à Manubrii principio usque ad centrum Membranæ Tympani producitur : hic duas lineas longus est . Minor è principio præcedentis exsurgit , & Tympani Membranz quodammodò infigitur , eandem versùs Meatum Auditorium aliquantùm elevando . Minimus lateraliter post Minorem conspicitur , ubi hemisphærica Capitis superficies desinit , parallelum servans cum Tympani Membranâ positum .

*Malleus .*

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. IV.  
& VII.

V. Mallei Ossiculum tribus instructum est Musculis : quorum singulos ; ut inevitabilem aliàs aut confusionem , aut circumloquutionem declinem ; ab eo cui inferuntur , Processu

*Musculi Mallei .*

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. V.

*Musculus Processus  
Majoris Mallei.*

Usum Vid.

Cap. V. Num. VI.  
& XI.

*Istius Musculi Can-  
nalis.*

Delin. Vid.

Tab. III. Fig. XIV.

*Ab hoc Canali non  
oritur Musculus; sed  
à Tubâ Eustachianâ.*

Delin. Vid.

Tab. X. Fig. I.

Usum Vid.

Cap. V. Num. XI.

*Musculus iste Tym-  
pani Membranam  
tendit sic, ut illo ab-  
scisso, hæc relaxetur.*

*Musculus Processus  
Minoris Mallei.*

Delin. Vid.

Tab. III. Fig. V.

Usum Vid.

Cap. V. Num. II.

nominabo . Sic unus erit Musculus Processus Majoris, alter Minoris, & tertius Minimi. Musculus ergo Majoris Processus; cujus inventionis laus meritorè Eustachio tribuitur; inter Mallei Musculos profectò maximus est. Continetur iste in Canali quodam Osseo super Partem Osseam Tubæ Eustachianæ lateraliter excurrente. Porro non provenit ab hoc Canali; sed suas extremas fibras in Tubam Eustachianam inserit; cujus nempe describendæ Cartilagini per totam ejus longitudinem, in anteriori quidem latere, firmiter adhæret. Quæ Musculi in Tubam Eustachianam insertio, etsi multum, ut suo loco ostendemus, Auditui conferat; usque adhuc tamen ignota extitit. A Tubâ itaque Eustachianâ hic Musculus per eum Canalem ascendens, emergit ab ipso in Tympani Cavitatem; hinc obliquè deorsum suo tendine aliquantùm inflexus, ingigitur in Majorem Processum Mallei, inter Minorem, & Minimum; sed paulò infra; sic ut Tympani Membranam, illi Processui adhærentem, versùs Tympani interiora tendat: quæ porro hoc abscessu Musculo, in recenti quidem Aure, relaxatur.

VI. Musculus Processus Minoris à Membranâ investiente partem superiorem Auditorii Meatus, per aliquem tractum exortus, supra Tympani Membranam fertur, & cum Incudis Processu crassiore parallelè incedens, in

in Minorem Mallei Processum infigitur. Iste Musculus, cum paucis constet fibris, & insuper totus sub Incudis Corpore, & Meatu Auditorio condatur; non sine peculiari modo detegi potest. Postquam enim aperta est Tympani Cavitas; separari debet Incus à Malleo: & statim Musculi insertio apparebit; cujus integer progressus ut obtineatur; Tympani, & Auditorii Meatus Membrana blandè & vicinè amovenda est: quod quidem facillimè præstatur ob anulum osseum ibidem, commodum sanè, interruptum. Modum hujus Musculi indagandi exponere necessarium duxi; cum multi ex Recentioribus eundem Musculum omnifariam fileant, quasi nunquam hunc docuisset Casserius, & eundem negantes non obiurgasset in suo Erudito de Aure Tractatu D. Schelhammerus, imò quasi nunquam hic Musculus sensibiliter in Aure extitisset. Qui error fortasse originem traxit aut à difficultate ipsum inveniendi; aut ab eo, quòd in gracilioribus Subiectis; imò passim in frequentioribus Cadaveribus; eorum nempe, qui longiusculum post morbum decessere; hujus Musculi fibræ carneæ non ità obvix fiant: quæ tamen in lacertosiss; item in illis, qui violentà morte defuncti sunt; utpotè in quibus à prægresso morbo non contabuerunt; satis, superque apparere solent.

*Hunc Musculum,  
detegendi Modus.*

VII, Musculus Processus Minimi à parie-

D

rie-

*Minimi Processus  
Mallei Musculus,*

*Delin. Vid.*

*Tab. III. Fig. V. &  
Tab. X. Fig. I.*

*Uñum Vid.*

*Cap. V. Num. II.*

riete Tympani Faciem spectante, incipiens, & per hunc progrediens, inflectitur deindè, & Tympani Chordam subtermeans, in Mallei partem Præcedentis insertioni quasi oppositam, nempe in Processum Minimum insertum se venit. Et sic Malleus ex utrâque parte ope hujus, & præcedentis Musculi firmatus, consistit; non sic tamen, ut immobilis sit; verùm ut in ipsorum insertis extremitatibus hypomochlium in propriis moribus habeat. Sed de his alibi. Hujus autem Musculi fibræ carneæ, ad Præcedentis similitudinem, non semper manifestò occurrunt; sed & ipsæ pro Subiectorum varietate modò magis; modò minus apparent; modò ex toto abscondi videntur adeò, ut olim fuerim dubius in determinandâ musculari horum corporum naturâ. Quam tamen nunc affirmare nondubito; cùm eorum fibras quotiescunque in idoneis Subiectis quæsi; ferè semper ad evidentiam carneas apparuisse, animadverterim. Ad hæc enim, & similia determinanda non quorumcunque emaciatorum Cadaverum inspectio sufficit; sed integriora Subiecta potissimum spectanda sunt. Quod ideò inculco; quia nollem, ut præcipientes aliqui Iudices hæc, & similia statim falsa judicarent, eò quòd non Ignobiles Anatomicos legerint, eadem videre non potuisse. Quæ improba sanè judicandi ratio tantum turbarum, atque adeò damni

Rei

*Hunc, & præcedentem Musculum Aliqui ideò fortè non admittunt; quia illos imminùs aptis Cadaveribus perquisivere.*

*Præcipientium Anatomicorum Iudices redarguuntur.*

Rei Anatomicæ intulit, & in dies infert; ut mearum (quando in hæc incidi) partium esse, existimem eandem seriò redarguere. Sic igitur habendum est. Res Minimas non omnes omnium, aliàs etiam Peritiorum, oculos incurrare: & illarum aliquas uni Anatomico neutiquam apparere; quæ interim satis faciliè ab aliis ostendi possint; qui nempe, ob diurnam præcipuè exercitationem, quænam Subiecta illis rebus ostendendis sint aptiora, didicerint. Sic Vesicularem Glandularum Substantiam à Celeberrimo Præceptore meo Malpighio longo labore detectam; & tenuissimos illos Ductus, quos à corpore Testis in Epididymidem semen transferre, Solertissimus Regnerus de Graaf observavit, non desunt, qui videre se posse, negent; & tamen illis, qui in talium Partium Anatome diu, & multifariam sunt versati, ea omnia sufficienter ostendere promptum est. Quare in his, & similibus Anatomicorum dissensionibus attendendum est non utrùm Aliquis in Re Anatomicâ utcunque se exercuerit; sed in qua Parte, quanto tempore, quave indagandi ratione potissimum laboraverit: quod cum præstitum fuerit; tunc porro judicandum. Et hætenus quidem de illâ re.

VIII. Malleo superiùs descripto alterum Ossiculum, quod Incudem vocant, annexum est, Hoc in tres partes dividitur, nempe in

D 2

Cor-

*Vesicularis Glandularum Substantia, necnon Seminiferorum Ductuum à Teste in Epididymidem, transitur (quidquid alii scripserint) reverà possunt ostendi.*

*Incus. Delin. Vid. Tab. III. Fig. VI. & VII. & Tab. X. Fig. 1.*



Usum Vid.

Cap. V. Num. II.

Corpus, & in duo Crura, live Processus. Corpus longitudinem habet unius lineæ cum dimidio: major ipsius latitudo lineam æquat; crassities vix lineæ dimidium superat. Idem Corpus in parte Processibus oppositâ exiguis eminentiis, & cavitatibus est interruptum, à quibus, parvorum ligamentorum interventu, habetur immobilis articulatio cum Malleo. Ex Processibus unus est tenuior, & longior, qui per lineæ spatium, & ultra ab Incudis Corpore recedens, parallelè; sed altiori situ; cum Mallei Manubrio extenditur; extremitate tamen recurvâ versùs Stapedem deflectens. Alter crassior, & brevior est, & suâ extremitate parieti Sinuositatis Mastoideæ; in qua insimul cum Incudis Corpore, & Mallei Capite, paulò altiùs tamen repositis, occultatur; per breve, & tenue quoddam ligamentum connectitur, non sic tamen, ut Incus immobilis indè evadat; verùm ut in eo ipso, cui sic connectitur, pariete hypomochlium in suis motibus habeat. Sed de his quidem alio loco.

*Os Orbiculare distinctum.*

Delin. Vid.

Tab. III. Fig. VI.  
VII. & Tab. X. &c.

*Os istud non est Orbiculare, sed Ovale.*

IX. In Longioris Processus Incudis extremitate, primo docente Francisco Sylvio, Ossiculum omnium minimum observabile est, à formâ Orbiculare ineptè dictum; cùm potius Ovale configurationem depressam obtineat. Vix grani milii dimidium æquat. Incudis Processui indicato, atque Stapedis Capitulo interponitur; eisdem; sed potissimum primo adhærens.

X. Ul-

X. Ultimum Officulorum, si situm spectemus, Stapes est: quod merito quidem sic appellatur; cum reverà similem equestri Stapedi sortitum sit configurationem. Constat enim ex Basi, binisque Lateribus in Capitulum coeuntibus: omnibus ex substantià satis tenui compositis. Basis Stapedis figurâ ad Ellypticam accedit, quamvis ex unâ parte margo leviter deficiat. Gibbum habet versùs Labyrinthi Vestibulum; concavum verò quâ spectat ipsius Stapedis Processus, sive Latera: nec minimis est pervia foraminibus, ut quidam edocuit; sed solum plura, & minima offert spaciola, in quibus os ita attenuatur; ut per ipsa oppositum lumen transluceat. Longitudinem habet Basis lineæ unius; latitudinem verò dimidiæ. Ex utroque longitudinis ipsius extremo duo Stapedis Latera elongantur, quæ nonnulli Crura vocant. Hæc qua parte se invicem respiciunt, sulcata; aliquantum rectâ incedunt; hinc ad instar arcus inflexa, uniuntur, Capitulum constituentia parvam versùs Os Orbitulare dictum obtinens cavitatem, qua idem Os excipitur ad constituendam cum Stapede articulationem. Ab hisce Lateribus unâ cum Basi spatium in medio relinquitur: quod aliqui ex recentioribus Anatomicis à Membranâ claudi, pronunciant. Mihi autem istud intermedium Stapedis spatium aliquandò Membranâ clausum; aliquandò tantummodò semi-

Stapes.

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. VIII.  
VIII. XI. Tab. X.  
&c.  
Usum Vid.  
Cap. V. Num. II.

*Quidquid alii scripserint; Basis Stapedis non est minimis foraminibus pervia.*

*Quidquid Aliqui doceant; intermedium Stapedis spatium, nullâ plerumq; Membranâ occluditur.*

miclausum; sæpiùs verò apertum occurrit. Nec novum sanè est, in membranaceis istiusmodi productionibus quasi ludere, & variam esse Naturam; Quippe non solum in Ossium cavitatibus Sinus, & Reticula modò aperta; modò verò à Membranis clausa conspiciuntur; verùm etiam à Pleurâ, & Peritonæo filamenta, & telas membranceas modò huc, modò illuc incertâ lege ad contenta Viscera proficisci; easdemque aliàs abesse, nullus nescit Anatomicus. Ità membranaceæ expansiones, quæ irregulariter, quandoque solent protendi per Tympani Cavitatem; ad Stapedem ipsum fortuitò extenduntur, huiusque aliquandò intermedium spatium; quod sæpiùs quidem, ut indicabam, apertum est; fortuitò pariter; non certâ, aut peculiariter notabili lege occludunt. Tota Stapedis altitudo vix unam, & dimidiam lineam æquat; major verò Laterum ab invicem distantia adnotatæ Basis longitudini vix cedit. Stapedis Capitulum collocatur, medio Osse Orbiculari dicto, supra extremam partem indicati Processus Incudis: Crura verò cum Basi oblique sursum, positu scilicet medio inter verticalem, & horizontalem, ad Fenestram Ova-lem feruntur. In hanc Fenestram Pasis Stapedis intruditur, quam exactè claudit, eique tenuis Membranae interventu circumquaque adhæret; non ità tamen strictè, quin sursum

sum, deorsumve, ut opus est, per eandem Fenestram moveri possit. Olim namque in cuiusdam Surdi Cadavere Surditatis causam in eo sitam inveni, nempe quòd indicata Membrana in substantiam ossèam indurata, unum continuatum os constituëbat cum Basi Stapedis, & Margine Fenestræ Ovalis; adeòque efficiebat, ne ampliùs fursum, deorsumve eadem Basis moveri posset. Circa verò hanc Membranam, per quam Basis Stapedis cum Fenestrâ Ovali connectitur; adhuc adverto, quòd ipsa non eadem undequaque pollet firmitudine; sed videtur ex illâ parte firmior esse, quam Musculus Stapedis Capitulo infigitur, ut sæpè ego, dum Stapedem à Fenestrâ in recenti Aure distraherem, majorem ibidem sentiendo resistantiam, observavi: quæ res tametsi fortè nullius momenti primâ facie videri possit; rationem tamen, cur ita sit, suo loco indicabimus. Porro Stapedis Inventorem se dicit Columbus; quamvis non pauci malint Iohannem Philippum ab Ingrassia. Eustachius tamen asserit, se eundem publicè demonstrasse, antequàm illi scripsissent. Utcunque res se habuerit; par semper est, illos à Litterato Orbe haberi Inventores, de quibus tutò constat (sive hoc factum sit scripto, sive voce) primam ignotæ rei notitiam ab eisdem, distinctis notis emanasse.

XI. Stapes peculiarem obtinet Musculum, quem

*Membranam, per quam Basis Stapedis Fenestra Ovali annectitur, illam non omnino immobiliter annectere, probatur per Observationem Surditatis ab eisdem Membrana ossificatione.*

*Eadem Membrana videtur ex unâ determinatâ parte firmior esse.*

Rationem Vid.  
Cap.V.Num.III.

*Stapedis Musculus.*

Delin. Vid.

Tab. III. Fig. X.

item Tab. X. &c.

Usum Vid.

Cap. V. Num. III.

quem ab Indefefso Auris Anatomico Cafserio in Equo detectum, alii in Homine negarunt; alii verò, & quidem meritò, admiferunt. Hujus Musculi carneum corpus in curvo Canali Ofseo, lateraliter circa mediam Falloppiani Aquæductus partem infulpto, continetur; tendineum verò à Canali erumpens, obliquè fursum in Stapedis Capitulum tendit; in quod infixum terminatur. Porro inter descriptos Officulorum Musculos, hic Stapedis Musculus, & Musculus Proceffus Majoris Mallei adeò; nifi omninò negligenter, aut alieno loco quærantur; confpiciuntur; ut Anatomicos, qui Alterum negaverint, extitiffe, mirer. Non eft tamen; quòd duo reliqui Mallei Musculi non fint æquè inter Musculos admittendi. Cujus rei rationem cum fatiſ quidem ſuperius oftenderimus; eandem hìc loci non reperemus. Illud tantummodò addimus, quòd ſi Aliquis, non obſtante eà ratione, duos illos Musculos ità immeritò negare perſiſtat; videat ſaltèm, ne in deſcriptis locis omninò neget, duo illa Corpora reperiri, ſive Ligamenta, ſive Fibras Carneas, ſive quid aliud appellare maluerit.

*Quatuor Officula,  
omni Perioſtio carent;  
& tamen per eorum  
ſuperficiem Vaſa Sanguinea reptant.*

XII. Officula hucusque deſcripta, etſi nullà veſtiantur Membranà; Vaſa tamen Sanguinea à deſcribendis Ramis deducta, per ſuperficiem reptantia habent: quæ probabiliter etiam eorundem interiora ingrediuntur,

Sub

Substantiam obtinent multum compactam, utpotè cavernulis, saltèm sensibilibus, destitutam. Nec ipse Stapes; ut ut respectu habito ad partium extensionem, omnium levissimus sit; substantiam obtinet cavernosam, siue porosam, ut apud quosdam ratum est; sed hujus minor gravitas, à tenuitate Ossis eundem componentis dependet, quod nempe ex unicà quasi lamellâ videtur constitui. Hæc Ossicula in Infante eadem gaudent magnitudine, ac in Adulto: sed in illo substantia eorum est minùs densa; quia plurimis abundat cavernulis; quæ temporis progressu supercrescente in eisdem ossèâ substantiâ replentur.

XIII. Cùm superiùs scripserim, à Basi Stapedis Fenestram Ovale claudi; sciendum est, quòd in Tympani supernis partibus duo sunt Foramina, quorum unum Ovalis Fenestra; Rotunda alterum vocitatur. Ovalis Fenestra illa est, quæ à Basi Stapedis clauditur, eidem configuratione respondens: situmque obtinet Tympani Membranæ parallelum. Per hanc habetur aditus ad Labyrinthi Vestibulum; ipsa enim in hujus partem inferiorem se aperit. Fenestra Rotunda incertam habet figuram; ut plurimum tamen ad circularem accedentem. Hæc inferiùs paulò, quàm Ovalis, versùsque Occiput collocatur, eo situ, ut respectu plani Membranæ Tympani non

E

pa-

*Substantia Ossiculorum cavernulis caret; ne ipso quidem Stapede (quidquid alii scripserint) excepto: cuius sanè levitas non à porulis; sed ab Ossis tenuitate dependet.*

*Ossicula eadem magnitudine sunt in Infante, atq; in Adulto.*

Causam Vid.  
Cap. VI. Num. IX.

*Fenestra Ovalis.*

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. IV. & V.

Usus Vid.  
Cap. V. Num. II.

*Fenestra Rotunda.*

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. IV. & Tab. X. Fig. II.

Usus Vid.  
Cap. VI. Num. VI. VII.

parallela, sed verticalis sit: istius enim Margini è directo sita est. Sicuti verò prima Fenestra cum Vestibulo, ità cum Cochleà secunda communicat; sed & hæc clausa est. Clauditur autem tenuis Membranulæ beneficio: quæ quidem non in ipso primo Fenestræ Margine, sed paulò interiùs, per illius spatium extenditur.

XIV. Præter duo recensita Foramina, omnibus jam nota, animadverti ego Nova quædam in Tympano Foramina: quorum notitia eo libentius, ut puto, accipietur; quia si non aliud; jam certè planior per ipsam fiet Problematis illius, à nemine adhuc sufficienter dilucidati, optatissima studiosioribus Medicis solutio: Quænam scilicet via sit, per quam sanguis, aut ichor possit (ut in casibus præternaturalibus fieri, videmus) à Cranii Cavitate in Cavitatem Aurium transmeare. Etenim hæc Foramina cum Cranii Cavitate statim communicant. Sunt hæc versùs superiora Sinuositatis Mastoideæ; nempe in illo ejusdem pariete, quo ipsa à Cranii Cavitate distinguitur, è directo supra eum locum, ubi Malleus cum Incude articulatur; tametsi unâ, vel alterâ vice etiam supra ipsam Tympani, ut communiùs accipiunt, Cavitatem unum illorum, vel duo collocari, viderim. Numero irregularia sunt; nam aliquandò unum, aliquandò duo, & quandoque tria inveniuntur.

*Foramina cum  
Cranii Cavitate com-  
municantia noviter  
in Tympano inventa.*

Usum Vid.  
Cap.V.Num.VII.  
&c.

tur. Modò ad invicem proximiora sunt, modò etiam magis distita : necnon disparem inter se, incertamque obtinent configurationem, & latitudinem. Exigua licet ut plurimum, sint ; aliquandò tamen mediocres ; imò & maximum specillum admittunt. Accidit quandoque, ut ista Foramina per simplicem inspectionem mihi non paterent, sed injectione per Tubam Eustachianam institutâ, liquorem exeuntem vidi in Cranii Cavitatem per hæc Foramina, licet ita parva ; ut cessante fluidi per eadem excursu, vix essent visibilia. Quamvis verò interdum (nihil enim dissimulare me sinit studium Veritatis) quamvis, inquam, interdum, neque per eam injectionem mihi se obtulerint hæc Foramina ; attamen, tunc reverà defuisse, non affirmarem ; cum, aliàs eadem ut plurimum invenisse me, sciam ; atque insuper facillimum sit, hæc Foramina, cum adeò exigua sunt, in demortuis præsertim, obstrui ; necnon ipsum injectum liquorem aut quid crassiusculi, viscosique ex Tubâ Eustachianâ arreptum in ipsa intrudendo, aut aliquam accidentalem quasi valvulam super eadem reflectendo, expeditum aliàs transitum sibi præpedire. Quinimò quando etiam possem affirmare, illa Foramina semel, vel bis defuisse ; non inde tamen statim consequitur, eadem à Naturâ peculiariter non intendi. Siquidem ipsa Viscera, quæ nemo sanus



*Observationes de  
Lienis in cane, & de  
Renis sinistri in ho-  
mine defectu.*

à Naturâ intendi, negaverit; ipsa, inquam, Viscera aliquandò abesse, non est res adeò nova, atque invisâ; cùm mihi ipsi & in cane, cui Lien, & in homine, cui sinister Ren decrat, idem bis observare contigerit. Nec verò, ut fortasse Aliquis existimaverit; idcirco hæc ità sollicitè admoneo; quia reverà ego censeam, Foramina ista ad magnum aliquod peculiare Auris commodum à Naturâ intendi; sed admoneo; ne quis ex hoc, quòd interdum ista non appareant; illicò (ut nonnullorum hominum sunt ingenia) in aliud contrarium currat, eademque, ceu omninò Auri inutilia, statim ab ejus Anatome, inconsiderata rejiciat. Aliàs enim & ipse quadantenus dubito; an hæc Foramina peculiariter à Naturâ intendantur; cùm varium eòulque conspiciam eorundem situm, numerum, figuram, diametrum; non quidem in diversis tantummodò, sed in uno etiam eodemque Subiecto. Cæterùm sive fiant ex accidenti, sive peculiariter à Naturâ intendantur; illud sanè firmo stat talo: Foramina hæc ut plurimum saltem adesse; adeòque posse ad Usus aliquos & in hoc ipso, & in Quinto Capite explicandos, sufficienter inservire; maximè verò ad illud Problema solvendum: Quænam scilicet via sit, per quam ichor, sanguis, vel aliud simile Fluidum in Cranii Cavitate effusum, in Aures transmeet aliquandò. Iam enim patet, quòd

quòd si ullum ex talibus Fluidis in illa, quæ inter Cranium, & Duram Matrem sunt, Interstitia effusum, ad Foramina ista perveniat, aut super ipsa discurrat; descendere per eadem poterit in Tympani Cavitatem: ex qua postea vel per Tympani Membranam (si quidem per hanc transitum admittamus) vel certè per Eustachianam Tubam, vel per utramque foras eliminatum, nobis conspicuum fiet. Porro non solum accidit, ut Fluida in modò indicata Interstitia, immediatè, utputa à Duræ Matris Sanguineis Vasis effusa, per hæc Foramina in Tympanum, & deindè foras descendant; sed idem accidit etiam Fluidis, quæ inter Duram, & Piam Matrem, necnon in Ventriculos effunduntur; ab istis etenim locis sive per ignotas adhuc naturales vias; sive per vias sibi morbosè apertas, sæpè in Interstitia, quæ inter Cranium, & Duram Matrem sunt, eadem derivari, contingit. Inter eas, quæ circa has res mihi occurrerunt, Observationes; duæ modò in promptu sunt; altera, in qua purulenta materia, altera verò, in qua sanguis ab interiore Cerebro per Nova Foramina in Tympanum, & hinc foras defluxit: quas quidem, & maximè primam, in hunc potissimum finem recensebimus; ne quis fortasse modò expositam illius Problematis Solutionem, ceu supervacaneam, vel etiam erroneam reprobaret; occupatus nempe ipse

ab

*Nova hæc Foramina via sunt, per quam in quibusdam casibus præternaturalibus Fluida à Cranii Cavitate in Auram pertransiunt.*

*Nam (quidquid Alii  
qui existimaverint)  
non est veritati con-  
sentaneum, quòd ta-  
lia Fluida à Cranii  
Cavitate non ema-  
nent.*

*In hoc ipsum Ob-  
servatio.*

ab illâ non admittendâ Opinione: Quòd fal-  
sum omninò sit id, quod, supponitur in solu-  
to Problemate: Quòd videlicet talia, quæ per  
Aures excernuntur, reverà à Cranii Cavitate  
promanent. Fuit enim, qui ante inventa hæc  
Foramina Problema solvere conatus est, ne-  
gando, talia ab ipsâ Cavitate Cranii proma-  
nare. Prima esto Observatio illius Cadave-  
ris, de quo etiam supra Num. II. meminimus,  
Viri nempe, cui à Capitis percussione copio-  
sus primò sanguis; deindè purulenta materia  
per sinistram Aurem ex intervallis excerneba-  
tur: quæ porrò excretio quoties fiebat; Æger  
à Capitis oppressione, Mentisque alienatione,  
quæ illi ab ictu successerat, notabiliter leva-  
batur; cùm verò ex toto suppressa est; apho-  
nos est factus, insigni accedente virium lan-  
guore, atque Marasmo, quibus tandem periit.  
Hujus itaque Cerebrum (in cujus Ventriculis,  
quemadmodùm inter Duram, & Piam Ma-  
trem, Serum limpidum copiosè stagnabat) par-  
te anteriore Sphacelo correptum erat, croceo-  
que infectum colore: quo colore etiam Dura  
Mater tingebarur non solum quâ vitiatam  
Cerebri partem vestiebat; sed usquequâ ad  
Nova Foramina, eorumque viciniam, in fini-  
strâ quidem parte, exporrigebatur: Porrò in-  
specta, quæ eisdem Foraminibus supponeba-  
tur, sinistri Tympani Cavitas eodem croceo  
colore undequaque infecta apparuit; imò eâ-  
dem

dem tinctura extendebatur usque ad faciem anteriorem Membranæ Tympani, ut loco indicato scriptum fuit. Altera Observatio habita est in quodam Viro à repentinâ Affectione Apoplecticâ cum resolutione sinistræ potissimum medietatis Corporis, intrâ non multas horas occiso; cui jam mortuo de ore (quò nempe per Eustachianam Tubam descendit) sanguis profluxerat. Inveni autem in utroque anteriore Cerebri Ventriculo sanguinem effusum; paucissimum quidem in sinistro; sed multò, & multò copiosiore in dextro: imò cum sinister Ventriculus aliàs sanus esset; dextri Ventriculi pars inferior maximo hiatu, & cavitate disrupta erat. At verò Aurem, quæ ex eodem dextro latere locabatur, pariter sanguine refertam inveni. Porro & in hoc secundo casu, & in primo Nova Foramina adeò ampla, adeò capacia occurrere; ut ipsis inspectis, nulla superesset dubitatio, num Fluida, indicata per eadem in Tympani Cavitatem, dimissa essent. Sed modò satis de his Foraminibus.

*Altera Observatio.*

XV. Tympani hucusque descripti parietes quodam aqueo Humore irrigantur, à Membranâ eisdem vestiente probabiliter profecto; cum hæc sit; uti scriptum fuit, Duræ Matris elongatio. Dura verò Mater saltèm quando intrâ Cranium est, humorem aqueum effundit: quod guttæ aquæ certâ ratione ab eadem

*Tympanum Humore quodam irrigatur, à Membranâ, quâ vestitur, fortasse proveniente.*

Usum Vid.  
Cap.V.Num.VII.

*A Dura Matris stru-  
cturâ humor, quo ipsa  
madet, videtur pro-  
venire.*

dem compressâ erumpentes, palâm facere videntur; præsertim cùm Cerebrum ferosâ coluvie scatet; ut per repetita pluries experimenta compertum mihi est. Unde non improbabile videbitur; cùm aliunde in Tympani Cavitate Glandulosa Corpora non constent; quòd à Membranâ illam Cavitatem vestiente indicatus Humor emanet. Aliquis tamen derivare etiam posset eundem Humorem per descripta Nova Foramina ab ipsâ Cranii Cavitate, nempe ab Interstitiis saltèm, quæ sunt inter Duram Matrem, & Cranium. Hæc enim Interstitia (sive in ipsâ quoq; excretum suum humorem Dura Mater possit deponere; sive humor aliunde proveniat) hæc, inquam, liquore aliquo madere, tum experientia videtur indicare; tum periculum, quod aliàs esset; ne Dura Mater assiduè ad Cranium allisa, ex eâ parte siccescere; aut etiam ipsi Cranio undequaque adhærere, non sinè suorum Munerum perturbatione, cogeretur.

*Humor, quo Tympanum irrigatur, credi etiam potest, ab Interstitiis, qua inter Cranium, & Duram Matrem sunt, promanare.*

*Tuba Eustachiana.*

Delin. Vid.

Tab. III. Fig. III. & XIV. Tab. IV. Litt. K. K. K. K. & Tab. X. Fig. I. II.

Usus Vid.

Cap. V. Num. IX. X. Item Cap. VI. Num. VI. VII.

XVI. Demittitur à Tympani Cavitate supra Palati extrema quidam Canalis; cujus necessariam existentiam primus intellexit Aristoteles; descriptionem verò tradidit nunquam satis laudanda in Anatomicis Eustachii Solertia. Quem interim Canalem ubi ego volam indigitare; attentâ ejus, ut par est, configuratione, necnon Inventoris Cognomine, Tubam Eustachianam; quando usque adhuc apto

no.

nomine caremus; appellitabo. Tuba itaque Eustachiana proficiscitur à Tympani parte inferiore, ab eo latere Membranæ Tympani, quod versùs Faciem est; sic tamen, ut ejus Orificium, sive Principium eidem Membranæ è directo quasi collocetur: hinc obliquè deorsum fertur, quòusque Pterygoidis Processus Internæ Alæ, anteriori sui labro contigua, ad latera Internorum Nasi Foraminum, supra Uvulæ Basim terminetur. Ejus Cavitaris figura assimilari pòcessit duobus contrapòsitis inæqualis altitudinis Conis, compressiorem Ellypsim pro basi habentibus, & antequàm in apices desinant, coeuntibus. Porrò Cavitaris altitudo Calvariæ Basi fermè verticalis est. Cavitas altitudinem non ubique equalem habet; nam principio quidem duas lineas alta est; sed indè sensim ità decrescit; ut antequàm ad finem suæ Partis Ossæ perveniat; vix unam excedat lineam: quam quidem altitudinem per exiguum spatium æqualiter servat: hinc Ossæ Parte superatâ, gradatim altitudine augescit; adeòut ad Finem Tubæ deveniens, quatuor lineas alta sit. Cavitaris altitudo ità se habet. Latitudo autem, in Parte quidem Ossæ, unius semper lineæ est: quanta verò sit in reliquâ parte, non est ità facile explicatu. Nam si ultimum Orificium, seu Tubæ Finem excipias, necnon totam superiorem partem; per quam nempe semper apertam, semper

F

ali-

aliquis transitus, ut ut angustior, per Tubam apertus remanet; utique tota hæc reliqua pars lateribus connivere invenitur. Sed sicuti in demortuis conniventem inveniri, certum est; ità quomodò in vivis se habeat, ambiguum: est enim facilè inferiùs dilatabilis, ut ex scribendis magis patebit. Illud tantummodò, quod modò innuebamus, pro certo adnotari potest; videlicet hanc reliquam Tubæ partem multò præ Ossèâ ejusdem Parte, supernè angustiores esse, ità ut eo in loco quasi arctiore sulco excavata videatur: quo quidem loco ex Cartilagine componitur.

*Tuba Eustachiana  
Pars Ossæ.*

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. XIV.  
Tab. IV. Tab. X. Fig.  
I. II.

*Ejusdem Pars Mem-  
branacea.*

Delin. qualemq;  
Vid.  
Tab. III. Fig. XIV.

*Subiecta huic glandu-  
losa substantia.*

Ufum Vid.  
Cap. V. Num. IX.

XVII. Constat enim Tuba ex Parte Ossèâ, Membranaceâ, Cartilagineâ, atque Carneâ. Pars Ossæ continuatio Ossis est, in quo Tympani Cavitas continetur. Illa eòusque elongatur, ut tertiam, & ultra longitudinis Tubæ partem conficiat. Hæc eadem cum Tympani Cavitate vestitur Membranâ, quæ extensa rotam Tubam internè cingit: diversam tamen sensibilibiter acquirit indolem, ubi hanc Ossæam Tubæ Partem superavit. Hic namque, ob subiectam glandulosam substantiam crassiuscula evadit, & pluribus foraminibus pervia conspicitur, per quæ mucosa materia egreditur, ab ipsdè subiectis Glandulis separata. Porro hæc glandulosa substantia crassior fit; & foramina copiosiora, & majora evadunt versùs Tubæ Finem: quò loci eadem Mem-  
bra-

brana internæ Narium Membranæ continuatur. Restat, ut scribam de Parte Cartilagineâ, & de Carneâ. Pars Cartilaginea partem reliquæ Tubæ superiorem, necnon ambas laterales componit: lateralem quidem posteriorem pro majori; lateralem verò anteriorem pro minori tantummodò parte. Ipsa autem Pars Cartilaginea ad extremum Tubæ Orificium, sive Finem, præcipuè verò ad posteriora ejusdem Orificii dilatata, & crassifaccta, non parvam Labrorum ipsius partem constituit. Pars denique Carneâ, sive Muscularis reliquæ Tubæ partem lateralem anteriorem tegit. Sed oportet jam, ut de hujus Substantiæ Carneæ progressu, atque insertione distinctiùs scribam.

*Tuba Pars Cartilaginea.*

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. XIII.  
& XIV. item Tab.  
X. Fig. I. II.

XVIII. Cùm superiùs ambigebam, an in vivis latera Eustachianæ Tubæ conniveant; id quidem solummodò quò ad statum Tubæ assiduum, sive ordinarium ambigebam. Musculus enim Tuba Eustachiana sortita est, à quo, ubi opus sit, eadem potest dilatari. Quod Assertum sicut in Anatomicis Scholis novum est, ità mihi, quem diutina conquisitio, & improbus labor id docuere; inter ea, de quibus certiores sumus, videtur reponendum. Porrò hic Novus Tubæ Musculus ità se habet. Procedunt fibræ carneæ ex latere anteriori Tubæ Eustachianæ, à Parte ejusdem Membranacæ, necnon à contiguo extremo margine

*Novus Tuba Eustachiana Musculus.*

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. XII.  
& XIV. Tab. IV.  
Litt. m. m. item Tab.  
X. Fig. I. II.

Usus Vid.  
Cap. V. Num. XI.  
item Cap. VI. Num.  
VI. VII.



Partis Cartilagineæ , per totum quidem illud spatium, quod inter Tubæ Finem, & ejusdem Osseam Partem intercedit. Hinc obliquè descendendo , simul collectæ, efformant tendinem per partem inferiorem Internæ Alæ Processus Pterygoidis excurrentem. Postquam, verò hunc tendinem efformarunt, & per indicatam Pterygoidis partem excurrerunt; ità tendineæ descendentes, rursus explicantur , & diffunduntur circa inferiorem marginem Foraminum Nasi Internorum, in quorum Membranâ desinunt : quarum fibrarum tendinearum aliquot quandoque cum tendineis fibris Musculi comparis , nempe alterius lateris uniuntur. Itaque ex hujus Musculi Descriptione; si quidem extremorum insertiones attendantur; perspicuum est , hunc aliud præstare non posse; quàm duas, quibus annectitur, Partes dilatare, Tubam nempe Eustachianam, & Foraminum Nasi Internorum extremitatem. Quod totum ad evidentiam etiam ipsis oculis potest percipi ; nam si Musculus iste leviter digitis trahatur ; tunc Nasi Internæ Foramina , Tubaque Eustachiana dilatantur .

XIX. Quoniam verò (utì ostensus sum, ubi Partium Usus exponam ) non potest Tubæ Eustachianæ Usus suum exquisitè præstare, absque Uvulæ certis motibus, & dispositione; ne postea ubi illuc pervenero , aliquid de-

desideretur; oportet, ut modò Historiæ Tubæ Eustachianæ Musculorum Uvulæ Historiam subnectam; maximè cum hæc ab eâ, quam nobis exhibent Anatomicorum Descriptiones, & Iconismi, profectò longissimè absit. Sunt ergo tria Musculorum Paria, quæ Uvulæ famulantur. Primum Par, pro Pterygostaphylino Interno acceptum; aptius verò Salpingostaphylinum appellandum, non oritur sanè ab Alâ Internâ Processus Pterygoidis; sed à Parte inferiori Ossæ Tubæ Eustachianæ: hinc sub Parte Membranaceâ inferiori ejusdem Tubæ obliquè ad Uvulæ Basim descendit: ibidemque fibræ unius Musculi fibris comparis Musculi quasi continuantur. Secundum Par mihi est Glossostaphylinum. A lateribus Linguae in parte ejusdem inferiore paucis fibris erumpit: quibus aliquantùm restrictis, ad latera versis Uvulæ medium infigitur. Hic Musculus licet exiguus sit, attamen distinctos præstat motus: qui clarè manifestantur; si aperto ore vivi hominis, Uvulæ motus diligenter consideremus: quod etiam de aliis Musculis ad eandem Uvulam spectantibus, si lubet, possumus experiri. Tertium Par Pharyngostaphylinum appello. Hoc latam, & amplam habet originem à parte inferiori Pharyngis, ubi iste incipit in Oesophagum restringi; & per ejusdem Pharyngis partem anteriorem lateralem assurgens, cum ad ipsius superiora

*Musculorum Uvula  
Nova Descriptio.*

*Musculi Salpingostaphylini, qui à Pterygoide Processu falsò deducuntur.*

Delin. Vid.  
Tab. IV. Litt. n. n.  
Tab. V. Fig. I. & II.  
item Tab. VI. Litt.  
A. A.  
Usum Vid.  
Infra Num. XXI.  
& Cap. V. Num.  
XII.

*Glossostaphylini.*

Delin. Vid.  
Tab. V. Fig. I. &  
Tab. VI. Litt. C. C.

Usum Vid.  
Infra Num. XXI.

*Pharyngostaphylini.*

Delin. Vid.  
Tab. V. Fig. I. II.  
& Tab. VI. a. a.

Usum Vid.  
Infra Num. XXI.  
& Cap. V. Num. XII.

rora pervenit; fibras suas instar arcus inflectit, quæ sub Tonsillis excurrentes, parti inferiori, & laterali Uvulæ se annectunt. Hoc Musculorum Par, si detrahatur Membrana, Pharyngis, & Uvulæ faciem vestiens; evidentem præbet suarum fibrarum directionem. Ex his Musculorum Paribus Uvulæ tributis, Primum jam à longo tempore utcunque notum est; Reliqua autem duo, præsertim quod attinet ad fibrarum positum, & insertionem, nunc nova manifestantur; etsi levis non sit eorundem Usus, eorumque indicium anteculus sit, quotiescunque in apertum Os versus Lingue radicem introspicimus; Duo enim arcus, quos inde versus Uvulam assurgere videmus, à subiectis hisce Musculis fiunt; primus quidem à Secundo Pari; alter verò à Tertio.

XX. Nunc quando credi possum Musculorum Uvulæ Historiam absolvisse; adeoque jam ad Mediam Auris Cavitatem complendam properare; Pharyngis Historiam instituere antea cogor: quæ quantum primò alterius Digressionis speciem videtur præferre; tantum cum præcedente connexa; imò ejusdem continuatio censenda est. Neque enim Motuum Uvulæ, ejusque Musculorum; atque adeò earum rerum, quæ ad Tubæ Eustachianæ Usus explicandos necessariæ mihi futuræ sunt, sufficiens notitia obtineri potest absque

notitiâ Orificiorum, Motuum, & Musculorum Pharyngis; Neque Uvula, ut creditur; ità à Pharynge distincta est; imò pars est ipsius Pharyngis, ab isto nullâ ratione dividenda. Quòd si passim Auctorum Descriptiones, & Tabulæ sejunctam tradunt; id totum Anatomico Cultro imputandum venit, qui adeò nimis sedulus sæpè est, ut novas sibi faciat vias, sibi quidem parum; Naturæ verò, nullatenus notas. Atque utinam Majores (quibus tamen plurimum deberi fateor) in istiusmodi Partibus dividendis minùs solliciti; in perscrutandis autem magis oculari extitissent; sanè ego nulla habens, quæ notarem, & nulla, quæ adderem; neutiquam primæ Historiæ meæ filum interrumpere coactus essem; sed Lectorem & quò ad Uvulæ & quò ad Pharyngis Historiam ad eòdem ablegare potuissem. Pharynx itaque superior Oesophagi pars est, quæ à Cricoide Cartilagine usque ad Capitis imum, quasi ad infundibuli similitudinem laxata, assurgit; adeòque, velut ipse Oesophagus, obtinet tum Membranam internam, subiectasque isti Glandulas; nisi quòd aliquot harum magis conspicuas hic illic ostendat; tum Fibras Carneas; quætamen in ipso Pharynge in distinctos Musculos disponuntur; ut ex horum Descriptione modò patebit. Pharynx tria obtinet Orificia, præsertim si in hujus compositionem Uvulam,

ut

*Uvula est reverà  
Pars Pharyngis.*

*Novæ Pharyngis  
Descriptio.*

*Pharynx tria obtinet  
Orificia, unum ad  
Oris, alterum ad Nares;  
ultimum ad Oesophagum.*

Delin. Vid.

Tab.V. Fig.II.

Pharyngis Musculi.

*Staphylopharyngai,  
qui ab imo Capitis  
provenire perperam  
dicuntur.*

Delin.& Usus ubi  
sint quærenda, Vid.  
supra, ubi de Pha-  
ryngostaphylinis.

ut par est, admittamus; Unum nempe maximum Oris cavitati correspondens ( quod erit Orificium ad Os ) Alterum majus, viam nempe ad Interna Narium Foramina aperiens ( quod erit Orificium ad Nares ) Ultimum minus, ubi scilicet Pharynx in Oesophagum abit ( quod erit Orificium ad Oesophagum ) Quæ porro Orificia cum modò debeant restringi ; modò debeant dilatari ; idcirco Pharynx peculiaribus instruitur Musculis : quos juxta diversam eorundem insertionem, diverso ab invicem nomine recensebimus. Primum Par , quod dici solet Cephalopharyngæum , eo quòd ab imo Capitis provenire perperam putetur ; illud est , quod ego inter Musculos Uvulæ sub nomine Pharyngostaphylini describo : quodque si Aliquis Staphylopharyngæum dicere hic velit ; non repugnabo . Hoc enim Par non minori ratione inter Pharyngem moventes colloco ; quàm inter moventes Vvulam reposuerim ; cum reverà non minùs Pharyngem , quàm Uvulam valeat movere, eò quia ejus Musculi utrumque extremum mobile habent : quales quidem Musculi in aliis aliquot nostri Corporis Partibus etiam occurrunt ( quamvis illorum plures à multis Doctõribus unius tantùm Partis Musculi statuuntur ) imò quales inter Nasi Interna Foramina , & Tubas superiùs descripsimus ; qualesque aliquot reperiri inter Uvu-

Uvulæ jam descriptos Musculos, & inter Pharyngis mox describendos, semel pro semper hîc admonemus. Cùm Primi itaq; hujus Paris Descriptionem supra dederim; pergo ad Secundum Par, quod falsò, ex parî cum Primo causâ, Sphenopharyngæum vocatum, Glossopharyngæum appello. Istud à lateribus Linguae in parte hujus inferiori erumpit prope Musculum Glossostaphylinum, cum fibris cujus confusam habet originem: hinc per partem superiorem Pharyngis quasi circulari incessu fertur sic, ut fibræ unius Musculi cum fibris alterius, interpositâ tamen lineolâ quadam tendinosâ, concurrant. Tertium Par Stylopharyngæum (utî quidem notum est) à Processu Styloformi procedit: hinc obliquè descendit; & Musculi Hyopharyngæi fibras interfecando, ad latera Pharyngis desinit. Quartum Par, quod omninò Novum, Hyopharyngæum dico. Duplicem habet insertionem in Osse Hyoide: unam longiorem; & alteram brevior. Longior connectitur Appendicibus Cartilagineis, lateraliter ad Basim ejusdem Ossis degentibus; brevior verò Processibus ejusdem Cornutis. Ab his porro terminis fibræ, aliquantulùm obliquè recedentes, versùs superiora Pharyngis inclinant, & in hujus medium latâ expansione desinunt, quò loci cum oppositis concurrentes, rectam lineam tendinosam componunt. A Musculo-

G

*Glossopharyngæi, qui falsò creditur à Processibus Ossis Sphenoidis provenire,*

Delin. Vid.  
Tab. V. Fig. II.  
Tab. VI. Litt. CC.

Usus Vid.  
Num. sequenti.

*Stylopharyngæi.*

Delin. Vid.  
Tab. V. Fig. II. &  
Tab. VI. Litt. E. E.

Usus Vid.  
Num. seq.

*Hyopharyngæi, Par omninò Novum.*

Delin. Vid.  
Tab. V. Fig. II. &  
Tab. VI. Litt. F. F.  
F. F.

Usus Vid.  
Num. seq.

culorum istius Paris violentâ distensione; quando videlicet nimis copiosa, & non benè mansa cibariorum quantitas in Pharynge protruditur; potest Luxationis species succedere in Appendicibus Cartilagineis ejusdem Ossis Hyoidis: quod ego in Muliere Bononiensi à deglutitione crassioris boli bovillæ carnis non benè mansæ observavi. Putabat Mulier, multisque impofuerat, se divexari à bolo in Faucibus hærente: quem ut indè deturbaret; varia Manuum, & Medicamentorum auxilia tentavit; sed incassum. Iamque elapsum triduum erat absque eò, quòd ullum cibum, vel potum assumere potuisset; cùm denique à me opem quæsit. Ego verò omnibus perpensis, cùm in aliquâ ex Appendicibus Cartilagineis Ossis Hyoidis Luxationem suspicarer; Partem, ut Anatomica indicabat Cognitio; ità digitis contrectavi: & illicò per unam, vel alteram contrectationem, omnia in pristinam sanitatem redacta sunt sic, ut immediatè absque ullo deglutiendi incommodo jusculum sumere, & cibum Mulier, modò desperata, potuerit. Quintum Par Musculorum Pharyngis Thyropharyngæum nuncupamus; Hoc enim ab utroque antico latere Thyroidis, per totam hujus altitudinem, duas acutas productiones formando, recedit (licet quòd ad aliquot fibras etiam ab anteriore laterali parte Cricoidis acutâ itidem inferiori pro-

*Observatio, necnon  
Curatio Deglutitionis  
Impedita à Luxatione  
Appendicium Cartilaginearum Ossis  
Hyoidis.*

*Musculi Thyropharyngæi.*

Delin. Vid.  
Tab. V. Fig. II. &  
Tab. VI. Litt. G. G.  
G. G. g. g.

Usum Vid.  
Num. seq.

productione proveniat) & suis fibris oblique ascendendo in partem posteriorem Pharyngis ad ejus medium in rectam lineam tendinosam, ad præcedentis similitudinem extrema mittit. Ex qua descriptione liquet, fibras istas, non unicum, sed duos componere Musculos: quod olim adnotavit Casserius; etsi illum pauci ex Successoribus secuti sint. Ultimus, qui restat Musculus mihi dicitur Cricopharyngæus. Locatur iste in principio Oesophagi: illeque est, qui magis ad Sphincteris naturam accedit; nam ejus fibræ; quæ sub inferiori Paris Thyropharyngæi productione ab eadem cum istâ Cricoidis parte recedunt; ejus, inquam, fibræ transversè tendunt, & Oesophagi principium cingunt. Dum Pharyngis Musculos, ità divido, atque describo; fieri posse, sentio, ut Aliquibus in hac divisione liberalior videar; Aliquibus verò fortè & parciore: quorum neutris pertinaciter repugnabo; verùm ut pro arbitrio, horum Musculorum numerum minuant; aut, si placet, augeant, ultrò concedam. De hoc enim ego minimè sollicitus sum, qui cenfeo, tunc nobis cujusve Partis Musculos satis esse perspectos; cùm tantummodò Fibrarum ejus insertionem utramque, & tendentiam noverimus; sive illas postea in plures, sive in pauciores Musculos, ut cuique videtur commodius partiiri contingat. Mihi itaque sufficit Musculares

*Hi non sunt, ut vulgò creditur, unus Musculus; sed verè sunt duo.*

*Musculus Cricopharyngæus.*

Delin. Vid.  
Tab. V. Fig. II. &  
Tab. VI. Litt. H. H.

Usum Vid.  
Num. seq.



Fibras in Uvulâ, & Pharynge, ut à me communicatum est, ità quò ad ambas suas insertiones, & quò ad tendentiam ut plurimum se habere : ut plurimum sanè ; nam aliquandò variam ; interdum etiam ex parte deficientem hìc deprehendi Naturam. Ut enim unicum tantummodò Musculum attingam ; Musculum Hyopharyngæum vidi ad Linguam quandoque fibrarum fasciculum producere ; quandoque verò neque alteram illam productionem suam ad Appendices Cartilagineas lateraliter ad Basim Ossis Hyoidis degentes mittere. Verùm enimverò non in solis Musculis Pharyngis ludit Natura : quæ porrò non ità strictis, & perpetuis legibus ; ut nonnulli facere videntur ; quò ad fibrarum carnearum quasdam productiones, & terminationes est alliganda. Ne enim multum à Pharynge recedam ; non ità pridem, dum circa hunc cultum exercerem ; vidi sub Linguâ Geniohyoidæum Internum unam ex suis extremis partibus ad Mandibulam Inferiorem circa ultimum Molarem Dentem elongare : & in ipsâ Linguâ Chondroglossum Musculum à Neoterico descriptum, non semper ; sed quandoque tantum invenio. Mirto cætera, & dum in his adhuc sumus ; jam quales descripti Musculi Pharyngi, & Uvulæ præstent motus, ex singulorum insertionibus, & fibrarum tendentiâ deductum eo.

*Musculus Chondroglossus, à Neoterico recensitus, solum aliquandò inveniri potest.*

XXI. Quando itaque cibaria deglutituri versùs Pharyngem propellimus; Musculi Stylopharyngæi istum ad latera sursum trahendo, breviorē; at simul latiorē Cavitati Oris è directo efficiunt, ut meliùs transmissa cibaria excipere possit. Quæ porrò dum excipit, & ope indicandorum Musculorum per Orificium ad Oesophagum est protrusus, ne protrusa illa, per Orificium ad Os in Os redeant, aut in Nares per Orificium ad Nares ascendant; tunc ambo hæc ultima Orificia à Musculis suis clauduntur. Nam Glossostaphylini, Glossopharyngæi, necnon Pharyngostaphylini circa Orificium ad Os contracti, ipsum, Linguâ præsertim coadiuvante, occludunt. Iidem verò Pharyngostaphylini unâ eâdemque operâ Uvulæ corpus hinc, & hinc trahendo, in valvulam veluti extendunt, & extensum simul aliquantulùm retrò trahunt (quod in viventibus quandoque; in mortuis verò, cùm eos utrinque Musculos trahimus; observare licet) Quod corpus ità extensum dum ingredientia cibaria impingendo, sursum retrudunt; non possunt non Orificium ad Nares claudere; maximè cùm eodem tempore, satìs angustius hoc sit ob eandem Uvulam retrò tractam tum per Pharyngostaphylinos, uti mox indicatum est, tum per Salpingostaphylinos, sanè ad Uvulam sursum retrò trahendam factos. Interim relaxatis Musculis

*Usus, quem præstant in Deglutitione Uvula, & Pharyngis Musculi superioribus Numeris descripti, & Tab. IV. V. & VI. delineati.*

*Usus Uvula in Deglutitione.*

lis Stylopharyngæis, atque Hyopharyngæo, necnon Thyropharyngæo Pari operante, deorsum obliquè constricto Pharynge; cibaria; quæ per duo illa clausa Orificia egredi non possunt; juvante etiam propriâ gravitate per Orificium ad Oesophagum coguntur descendere: in quem fibræ superati Cricopharyngæi, se restituentes, ultimò protrudunt. Hæ siquidem fibræ aliàs vim quòdammòdò, & munus Sphincteris obtinent; ut impédiant, ne cibaria à Pharynge in Oesophagum descendant; nisi postquàm indicatorum Musculorum contractio accesserit; ope cujus expresso ex Tonillis, & ex Glandulis, quæ per Pharyngem sparguntur, liquore; hoc debitè illa imbuantur. Hæc obiter quò ad actionem, quam descripti Musculi in Deglutitione exercent. Cùm verò Aliquot ex ipsis efficiendo, ut Uvula magis, minùsve supra Laryngis aperturam propendeat; utque magis, minùsve Orificium ad Os, item illud, quod ad Nares est, restringatur; per hanc ibi inductam varietatem, etiam Vocistonum non leviter sanè variare possint; Aliquot verò ad Auditum quoque (quod caput rei est, & in cujus gratiam cætera oportuit scribere) non parum conducant; Alterum illud ut ex superiùs scriptis quisque sibi explicet, sinemus, brevitati consulentes, Alterum verò, ubi Partium Usus tractabimus, ibi opportuniùs edisseremus.

Vid. Cap. V. Num.  
XII.

XXII.

XXII. Ad complendam Mediæ Auris Cav-  
 itatis susceptam Descriptionem, oportet jam,  
 ut illius Vasa peculiariter describamus. Non  
 enim quæ in unâ Cavitate Vasa Sanguinea  
 occurrunt, eadem successivo cursu ad reliquas  
 Cavitates pervadunt; sed singulis Cavitatibus  
 distincta Vasa contingere: quæ res (ut in tran-  
 situ hoc innuam) inter cæteras argumento ef-  
 fe potest: allatam à principio Auris Divisio-  
 nem in Tres Cavitates, ipsi Naturæ innixam  
 esse. Itaque prope initium Offei Canalis, per  
 quem Arteria Carotis scandit ad Cerebrum;  
 ejusdem Arteriæ Ramulus, Canali perforato,  
 in Tympanum; ut ego inveni; deflectit, ipsum-  
 que sparsis propaginibus alluit. Quæ verò à  
 Tympano Venosa regrediuntur Vasa, in unum  
 truncum unita, Venæ Iugularis Diverticulum  
 subeunt. De Lymphaticorum in hac Cavi-  
 te existentia quid censeam; ex illis, quæ circa  
 eorundem in præcedenti Cavitate existentiam  
 censui, sufficienter intelligi potest. Superest,  
 ut de Nervis quoque verba faciam. Porro  
 Auditorii Nervorum Paris Dura Portio, dum  
 per Aquæductum Falloppianum ad Tympani  
 latus decurrit; ad ipsum Tympanum, ejusque  
 Partes furculos mittit: quos inter magis con-  
 spicui sunt duo Sinuositate Mastoideam sub-  
 euntes, necnon alius, qui Stapedis Musculo  
 prospicit. Ad hæc erumpit ab eo Tympani  
 pariete, qui versùs Faciem collocatur, Ner-  
 veus

*Singulis Auris Cavi-  
 tatibus distincta.  
 Vasa Sanguinea con-  
 tingere: ex quo allata  
 Auris Divisio in Tres  
 Cavitates confirmari  
 posse videtur.*

*Arteria Tympani  
 vera origo.*

Delin. Vid.  
 Tab. VII. Fig. I.

*Vena Tympani.*

Delin. Vid.  
 Tab. VII. Fig. II.

*Nervi Sarculi à  
 Durâ Auditorii Ner-  
 vorum Paris Portio-  
 ne Tympano imperia-  
 ti.*

Delin. Vid.  
 Tab. VII. Fig. III.

*Chorda Tympani.*

Delin. Vid.  
Ibidem, item  
Tab. III. Fig. III. &  
Tab. X. Fig. I.

*Non est ità certum,  
Tympani Chordam  
esse propaginem Quin-  
ti Paris.*

*Circa Usum Chor-  
da Tympani Dubita-  
tio.*

veus Ramulus, qui statim in subiectum Mini-  
mi Processus Mallei Musculum exiguam pro-  
paginem inserit. Hinc transversè per Tym-  
pani Cavitatem, parallelus Membranæ Tym-  
pani, excurrit; per quem tractum Tympani  
Chorda nuncupatur. Excurrit autem inter  
Malleum, & Incudem sub utriusque articula-  
tione, ità dispositus, ut in eorum motibus  
non moveri non possit. Postquàm verò Tym-  
pani Cavitatem emensus est; peculiarem Ca-  
naliculum subit: & per hunc in extremam fe-  
rè Aqueductus Falloppiani partem se insinuat,  
ubi tandem cum Durâ Portione unitur. Por-  
rò hic Ramulus ab Aliquibus esse dicitur Quin-  
ti Paris soboles, & ab ipso Quinto Pari in-  
Duram Portionem transmitti. Qui sanè cur  
non potius dici debeat Duræ Portionis propa-  
go, quæ ab hac in Par Quintum transmitta-  
tur, viderint illi, qui oppositum pronunciant.  
Ego certè & Ramulum hunc, & alios com-  
plures, qui pariter inter unam, & alteram  
Coniugationem ducuntur, qua ratione alte-  
rutri potius Coniugationi assignari possint,  
non video. Caterùm eundem Ramulum  
ità interiectum, ità solitarium, adeò regulariter,  
adeò perpetuò per Tympani Cavitatem tran-  
sire, & præcipuè inter Ossicula ità disponi; ut  
in horum motibus statim debeat commove-  
ri, cùm hæc omnia res sint, quæ in eodem  
aliquod Naturæ Mysterium latere, indicent;  
tum

tum me impulerunt, ut eundem oculis, animoque multoties contemplerer, tentaturus, num fortè novi aliquid circa illius anatomen; num saltèm illius causas possem comperire. Quod dum agerem, aliquandò excogitavi, posse hunc fortè conspirare cum Majoris Processus Mallei Musculo ad motus illos, quos suo loco exponemus, Novi Tubæ Musculi excitandos. Hinc hujus Ramuli communicationes quæ, & quibus cum Nervis sint; ad hæc qui Nervi indicato Tubæ Musculo famulentur, rimari exorsus sum. Sed cùm in re hac nondum mihi licuerit omnem illam, quam vellem, & quæ par est, operam impendere; contentus desiderium, & consilium meum circa ipsam indicasse; de eadem in præsentiarum verbum ampliùs non addam.



*CAPUT III.*



Enestræ, quæ in Tympani Cavitate occurrunt, Ovalis videlicet, & Rotunda in Interiorem Auris Cavitatem transitum Observatoribus aperiunt. Hæc verò in eâ Ossis Temporum parte, quæ ob maximam duritiem, Ossis Petrofi nomen præ reliquis ejusdem partibus sibi vindicat, sic excavatur, ut è directo Membranæ Tympani, eidem, quasi parallela, super Tympani Cavitate locetur. Labyrinthi autem nomen (quod nempe diu non nisi ejus parti concessum est) universæ huic Cavitati passim tribuere non verebor, tum quia toti convenit non minùs sanè, quàm parti, tum quia & D. Du Verney ita adhibuit. Cum quo pariter eandem Cavitationem in tres Partes, ut clariùs procedam, divido; scilicet in Vestibulum, Canales Semicirculares, & Cochleam.

*Vestibulum.*

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. II.  
& V. item Tab. X.  
Fig. I. & II.

II. Vestibulum Cavitas est irregulari configuratione constructa, parietes undequaque ostendens concavos: cujus longitudo, & latitudo duarum linearum est; altitudo ad sesquilineam non pervenit. Situm obtinet immediate

diatè supra Basim Stapedis, inter Canales Semicirculares, & Cochleam; scilicet Canales habendo ab exteriori potiùs parte, sive eâ, qua Auriculam respicit; Cochleam verò ab interiori, sive oppositâ. In hac Cavitate plura aperiuntur Orificia, videlicet Orificium Fensetræ Ovalis, quinque Orificia Canalium Semicircularium, Orificium Cochleæ, & quinque Orificia Nervis aditum præbentia, atque ideò ab istis occlusa.

*Orificia, quæ in Vestibulo aperiuntur.*

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. I.  
II. V. Item Tab. X.  
Fig. I. & II.

Usum Vid.  
Cap. VI. Num. III.  
&c.

*Canales Semicirculares.*

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. I.  
III. &c. Item Tab. X.  
Fig. I. II.

Usum Vid.  
Cap. VI. Num.  
III. IV. &c.

III. Secunda Labyrinthi Pars Canales Semicirculares dicuntur, tales à formâ nuncupati; quia nempe singuli in Semicirculi modum curvantur. Numero sunt tres; singuli ad vitandam confusionem diversis nominibus distinguendi. Hæc autem nominum diversitas à nullâ re aptiùs; nisi ego fallor; desumi potest; quàm à diversâ singulorum longitudine. Attentâ itaque ratione diversæ longitudinis, qui à Neotericis Canalis Semicircularis Inferior non ità verè à situ appellatur; aptiori vocabulo poterit dici Canalis Semicircularis Major; qui verò dicitur Superior; Canalis Semicircularis Minor; & qui Medius Canalis Semicircularis Minimus poterit nuncupari. Sed ne, quæso, Aliquis illud forè in me reprehendat; quòd ad nomina, ab aliis imposita, immutanda proclivis sim: nam & ego ab hac re vehementer abhorreo. Sed tamen cum in scribendo duo mihi proposue-



rim, Veritatem scilicet pro meâ virili aperire; addiscendi verò labores, quantum res sineret, faciliores reddere; Cùmque hæc duo per veridicas nomenclaturas; quibus præsertim aliæ, non ità veræ, tollantur, & potissima rei indicatæ proprietas exprimat, ex parte obtineri, videam; hinc est, quòd nova imponere nomina invitus cogar aliquandò. Canales Semicirculares Cavitate Ellypticâ donantur: quam tamen aliquoties Cylindricam vidi. Hujus latitudo dimidiam lineam aliquantulum superat; altitudo verò latitudinis mensuram paululum excedit. Quamvis verò in latitudine, atque altitudine eandem dimensionem servare omnes Canales videantur; nihilominus aliquandò Canalem Majorem præ Minore; Minorem præ Minimo angustiorem latitudinem habere, comperi. Hæc modò de istis Canalibus in genere. Iam verò eosdem singulatim perlustremus.

*Canalis Semicircularis Major.*

Delin. Vid.

Tab.VIII. Fig. I.

II. III. & V. Item.

Tab.X. Fig. I. & II.

Usum Vid.

Cap.VI.Num.III.

&c.

IV. Canalis Semicircularis Major à Neotericis, ut indicatum est, non ità verè Inferior appellatur; quia non quemadmodum illi videntur credere, Vestibuli partem inferiorem cingit; si quidem Labyrinthum in naturali sede contemplemur; sed quasi totus locatur in parte præ ipso Vestibulo altiore; quâ Labyrinthus Occiput spectat. A nobis verò non impropriè Major dicitur; quia præ reliquis majorem obtinet longitudinem. Hanc ego nunquam

quàm inveni quinque lineis cum dimidiâ minore, neque verò octo lineis majorem. Canalis hic Major communicat cum Vestibulo per duo Orificia; unum Proprium, & alterum Commune: antequàm verò per Proprium Orificium cum eodem communicet; solet in Orbicularem quandam Cavitatem ipse Canalis dilatari. Porro Orificium ipsius Proprium aperitur inter Cochleæ Orificium, & unum ex Orificiis Minimi Canalis. Circulare est: & margo ille, quo Fenestram Ovale respicit, in exiguum quasi aggerem videtur assurgere. Commune verò Orificium nihil aliud est, quàm extremitas mox describendi Canalis Communis: quæ circulari Orificio, paulò latiori, ac sit eiusdem Canalis diameter, hiat in parte superiore Vestibuli, Orificio Cochleæ e directo. Canalis Communis nuperrimè indicatus, est portio Canalis, quæ sit à concursu Canalis Semicircularis Majoris, & Canalis Semicircularis Minoris, unius lineæ longitudinem excedens: cavitare non Ellyptica, sed Cylindricâ gaudens singulis Canalibus duplo ampliore. Sed & ego intelligo, difficile esse; ne dicam impossibile; & hunc Canalem, & alios cum eorum posituris, & Orificiis per descriptiones sub oculos ponere, nisi cui simul figura, aut potius ipsa Auris ostendatur.

V. Canalis Semicircularis Minor, dictus à qui-

*Orbicularis Cavitatis in Canali Majore ante ipsius Orificium Proprium noviter observata.*

Delin. Vid.

Tab. VIII, Fig. III. &c.

*Canalis Communis*

Delin. Vid.

Tab. VIII, Fig. I. II. III. V. &c. Item Tab. X. Fig. II.

Usum Vid.

Cap. VI. Num. III. &c.

*Canalis Minor.*

Delin. Vid. ?  
Tab. VIII. Fig. I.  
III. V. item Tab. X.  
Fig. I. II.

Usum Vid.  
Cap. VI. Num. III.  
VI. VIII.

quibusdam Superior, aptè mihi dicitur Minor; quia minorem præ antecedenti habet longitudinem. Hæc cum maxima est; septem lineas vix superat: cum verò est minima; quinque lineis minor non est. Hic autem debeo adnotare, quòd quando Canalis alicujus, exempli causâ istius Canalis Minoris longitudo maxima est; longitudo quoque cæterorum Canaliū consueto major est, & è converso: aliàs enim Canalis hic Minor aliquandò non esset reverà minor. Canalis iste; qui versùs faciem respicit, super Vestibulo collocatur: cum quo duplicem communionem obtinet; unam per Orificium Commune, alteram per Orificium Proprium. Orificium Commune est idem cum Orificio Communi Canalis Majoris; adeòque superiùs descriptum est. Proprium verò, in quod priusquam desinat Canalis Minor, sensim in fine ampliatur; figuram habet Ellypticam, ut suus Canalis: & aperitur immediatè supra unum ex Orificiis Canalis Minimi eo situ, ut non è directo, sed lateraliter Ovali Fenestræ opponatur; opponatur verò è directo Orificio Cochleæ.

*Canalis Minimus.*

Tab. VIII. Fig. I.  
III. IV. V. item Tab.  
X. Fig. I. II.  
Usum Vid.  
Cap. VI. Num. III.  
IV. VI. VIII.

VI. Minimus Canalis certo positu inter utrumque præcedentem locatus, Aurisquæ exteriora respiciens, Majori, & Minori Canali longitudine cedit; & sic omnium minimus est. Ejus enim longitudinem nunquam comperi

peri quinque lineas cum dimidiâ superantem; neque tribus, & dimidiâ minorem. Canalis iste hoc peculiare habet, ut sui gyri dimidio, ut plurimum jam confecto, sensim incipiat dilatari usque ad illud suum Orificium, quod secundo loco mox describemus. Nam & hic Canalis cum Vestibulo communicat per duo Orificia; Angustius unum; Latius alterum. Angustius Orificium inter Orificia Commune, & Proprium Majoris Canalis tali ratione locatur; ut Orificium Cochleæ, necnon Fenestram Ovalet quodammodò spectet. Hoc circulare est, & vix sibi continuato Canali amplius. Latius verò situm est sub Orificio Proprio Minoris Canalis, huic omninò simile, eundemque penè habens ad Fenestram Ovalem, & Orificium Cochleæ respectum, quem idem habere ad ista, superiùs scripsimus. Hic ergo Canalis inter Semicirculares unicus est, qui ambo Orificia Propria habeat.

VII. Ex his, quæ scripsi, stat quidem, Canales Semicirculares eam inter se habere longitudinis proportionem; ut major unus; alter minor, tertius verò minimus sit: quam sanè proportionem eos semper, ex multis, ac iterum multis, quas secui, Auribus; manifestò servare, comperi; nisi quòd semel differentiam vix sensibilem inter Majorem, & Minorem potui invenire. Sed cùm de Organo ad Sonum spectante agatur, inquirere ulteriùs opus est, qualis

*Canalium Semicircularium in longitudine proportionem non videri indagata.*

Vid. Tab. IX.

*Sunt autem Canales in eâ longitudinum proportionem; ut unus major; alter minor; tertius verò minimus sit.*

Usum Vid.  
Cap. VI. Num. IV.

qualis sit præcisè hæc proportio, quam iisdem Canales inter se habent; idest quantò præcisè Major Minore longior sit; quantòque Minor longior Minimo. Hac de causâ plurimos diverforum Subiectorum Canales Semicirculares eo meliori modo, quo Partis permittit conditio, metiri nîlus sum ope fili per eisdem ducti. Quo in præstando, non omni sanè metu carco; quin potuerim quandoque veram Canaliû dimensionem tantillû augere, & quandoque tantillû minuere; quia in consimilium rerum mensuris; ut sit diligens hominum iudustria; facilè tamen accidit, ut quod veller, exactè non assequatur. Quâ igitur potui curâ, & sedulitate, compluribus Canaliû mensuris collectis, & tabulæ demandatis; adinveni, quæsitam proportionem nullo pacto determinari posse; eò quòd incerta admodû, & in diversis diversa sit. Siquidem inter tot, quæ adhibueram, Subiecta neque duo comperire potui; quorum tres Canales Semicirculares in eâdem præcisâ proportionem essent. Illud ex adverso comperit mihi est, esse stabilem Naturæ consuetudinem; quòd in eodem Subiecto Canales Auris dextræ, & Canales sinistræ non solum sint utcunque in eâdem præcisâ proportionem; verûm singuli singulis correspondentibus æquales sint sic, ut iisdem exactissimis dimensionibus gaudeant. Imò tanta Canaliû, utrius-

*Sed magis præcisâ earundem longitudinum proportio determinari non potest; cum in diversis diversâ sit.*

*In eodem tamen Subiecto Canaliû unius Auris longitudines longitudinibus Canaliû alterius Auris æquales sunt.*

Huius rei Causam.  
Vid. Cap. VI. Num.  
IX.

utriusque Auris congruentia est; ut si aliquando in uno ex Canalibus reperi vitium à nativitate contractum, idem prorsus vitium in alterius Auris correspondente Canali detexerim. Ità non diu est, cum in nescio cujus Subiecti unà Aure Canalem Semicircularem Minorem tortuosè incedentem observavi, & eandem tortuositatem in alterius Auris Canali Semicirculari Minore adinveni, ità profectò similem, ut ovum ovo. Sed exactam hanc utriusque Auris similitudinem non solum in Canalibus Semicircularibus, verum etiam in multis aliis earum Partibus non semel vidi. Hoc modò memini, quòd cum aliquando Auris dextra Minimum Mallei Processum consueto longiorem ostendisset, Processum eundem pariter longiorem compar Auris exhibuit. Sed ut redeam ad Canales Semicirculares, eorumque dimensiones, non solum quidem ea, quæ supra deducta sunt, ex eorundem Canalium Mensuris, à me primùm, non sinè diuturno labore, collectis, eruere possumus, verum ipsis attentis, quæ inter diversorum Subiectorum Canales sunt, irregularibus longitudinum differentiis, quorundam circa Auditum Phænomenorum causæ explicari queunt, quorum sanè, non prægressà illarum cognitione, vix validam ullam habebamus rationem, ut quidem de Ufù Partium agentes, inferiùs ostendemus.

I

VIII.

*Si quando aliquod vitium à nativitate contractum in uno unius Auris Canali observatur; idè prorsus in alterius Auris correspondente Canali invenitur.*

Hujus rei Causam  
Vide Cap. VI. Num.  
IX.

*Imò eadem congruentia in multis aliis utriusque Auris Partibus observatur.*

Vid. Cap. VI. Num.  
IX.

*Cochlea.*

VIII. Cochlea tertia Labyrinthi Pars est, quæ Canalibus Semicircularibus è directo, inferiori tamen posito, inter Canales, & ipsam interjacente Vestibulo, collocatur, eleganter Limacem Cochleam repræsentans, unde nomen sortita est. Construitur Cochlea ex Canali, quendam, uti vocant, Modiolum circumvoluto, & ex Septo Canalem in duos alios Canales dividente. Primò enim ossei parietes ejus Sinuositatis, per quam Nervi Auditorii Portio Mollis ad Cochleam pertingit, ità disponuntur; ut efforment Modiolum, sive potius conum, basim versùs Craniî Cavitatem; apicem verò habentem versùs Tympanum. Itaque totum hunc conum spiritaliter circumvolvitur indicatus Canalis sic, ut duos gyros cum dimidio conficiat. Canalis cavitas an sit Ellyptica; an potius Cylindrica, ambigere. Hujus Cavitatis superficies non ex eadem substantiâ componitur, ac superficies cavitatis Canaliû Semicircularium; quæ nempe durissimum os est; sed ex substantiâ ità friabili, ut in exsiccatis saltè Auribus, calcinatum Os referat: quæ substantia maximè conspicua est in eo cavitatis pariete, qui Modiolo adhæret; à quo pariete, quò magis opposito appropinquat, eò magis sensim imminuitur. Latitudo autem istius cavitatis ad lineam unam accedit: eandemque, aut vix inæqualem mensuram ipsa quoque obtinet altitudo,

*Canalis Cochlea.*

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. II.  
& IV. item Tab. X.  
Fig. I. & II.

*Canalis istius superficies ex friabili substantiâ componitur.*

De istius Usu Vid.  
Cap. VI. Num.  
VIII.

tudo ; ut ex indicatâ cavitatis figurâ manifestum est. Et hæ quidem dimensiones cavitatis principio conveniunt ; siquidem quò magis ad Modioli apicem Canalis accedit ; eò magis ( sensim tamen ) videtur imminui. Hic faciliè Aliquis expectabit , ut quemadmodùm Canaliū Semicircularium , sic & longitudinis Canalis istius dimensiones ex compluribus Subjectis desumptas afferamus : istatque cum alicujus illorum dimensionibus compareremus. Sed rei difficultas nullo pacto concessit exactas colligere mensuras ; adeoque de hac longitudine nihil habeo , quod scribam. De totâ Cochleâ hoc addam ; Ejus Basis diametrum quatuor lineas non superare . Canalis verò iste ; uti supra indicatum est ; ope cujusdam Septi in duos Canales ità diuiditur ; ut Canalis alter cum altero nullo pacto communicet. Hoc Septum ; quod Septum Cochleæ dici poterit ; duplici constat substantiâ ; Solidiori unâ ; Molliori alterâ . Solidior corpus quoddam est mediam habens consistentiam , inter substantiam Membranaceam , & Cartilagineam ; faciliè friabile , præsertim in exsiccata Aure ; ab eo Canalis pariete , qui Modiolo adhæret , proficiscens ; & ultra dimidium altitudinis Canalis extensum : & hoc corpus Lamina Spiralī nuncupatur . Substantia verò Mollior est quædam tenuis , & pellucida Membrana , præcedenti Lamina continuata ; non

*Septum Cochleæ.*

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig.  
VII.

*Eiusdem substantia  
Solidior, sive Lamina  
Spiralis.*

Delin. Vid.  
Ibidem.

*Eiusdem substantia  
Mollior, sive Zona  
Cochleæ.*



Delin. Vid.

Tab. VIII. Fig.  
VII. VIII. IX. item  
Tab. X. Fig. III.

Usum Vid.

Cap. VI. Num. VI.  
VIII.

#### *Scala Tympani.*

Delin. Vid.

Tab. VIII. Fig. VI.

Usum Vid.

Cap. VI. Num. VI.  
VIII.

#### *Scala Vestibuli.*

Delin. Vid.

Tab. VIII. Fig. VI.  
V.

Usum Vid.

Cap. VI. Num. VI.  
VIII.

*Scala Tympani (tametsi ab aliis contra-  
rio nomine appelle-  
tur) Superior est; Sca-  
la autem Vestibuli  
Inferior.*

*Capacitatis, figura,  
& superficiei differen-  
tia inter unam, & al-  
teram Scalam ani-  
madvertuntur.*

*Istarum Diversita-  
tum Causam Vid.  
Cap. VI. Num. VIII.*

idem planum cum eadem efficiens; sed ver-  
sus describendam Tympani Scalam Ellypticâ  
curvaturâ deflectens. Hæc alteri Canalis pa-  
rieti se se annectit; super quem, dum annectit  
se, videtur reflecti, quasi ut firmius adhe-  
reat. Istius autem Membranæ denomina-  
tionem, & ulteriorem, si fieri poterit, perlu-  
strationem, quamprimùm ubi de Nervis ad  
Cochleam pertinentibus, habeo. Duo Ca-  
nales, in quos Cochleæ Canalem ab exposito  
Septo partiri, indicavimus; Scalæ nominan-  
tur. Quarum una per Fenestram Rotundam  
respicit Tympanum (hanc Tympani Scalam  
dicamus) altera verò cum Vestibulo commu-  
nicat per Orificium quasi Ellypticum, ad la-  
tus Fenestræ Ovalis situm, inter hanc, & Ori-  
ficium Proprium Canalis Majoris (istam Ve-  
stibuli Scalam appellemus). Scala Tympani  
superiorem situm obtinuit; Scala autem Ve-  
stibuli inferiorem: quod attendatur, velim;  
nam Recentiores Anatomici hanc Superio-  
rem; illam verò Scalam Inferiorem perperam  
vocant; ex hoc faciliè decepti, quod fortè La-  
byrinthum non in naturali sede; sed à reliquâ  
Aure sejunctum consideraverint. Scalæ non  
solum situ, & Orificio ab invicem discrepant;  
verùm etiam aliis rationibus. Nam quamvis  
ambarum longitudo eadem esse videatur; la-  
titudinem tamen, atque altitudinem in Scalâ  
Tympani, præsertim prope Fenestram Ro-  
tund-

tundam, majorem, quàm in alterâ observo, licet aliquandò æqualem viderim. Rursus Scala Tympani cavitatem habet irregulari figurâ donatam, necnon frequenter superficiem Modiolo adhærentem, asperam, & inæqualem obtinet; Scala autem Vestibuli Ellypticam cavitatem, & lævem superficiem exhibet. Quæ quidem capacitatis, figuræ, & superficiæ differentiæ, à me in Scalis consideratæ, Usûm Partium exponentibus utiles erunt, licet hæctenus præterfugerint Anatomicos.

IX. Ad actuandas, & peculiari Partium conformatione ditandas Labyrinthi cavitates, Portio Mollis Auditorii Nervorum Paris descendit. Nam Portio ejusdem Dura non ad Labyrinthum; sed ad Tympanum, aliasque indicatas attinet Partes; quamvis de istâ quoque hîc simul agemus, tum propter affinitatem; tum ut ejusdem Descriptioni, quam alibi magnâ ex parte exhibuimus; lucem, imò complementum asseramus. Ut verò istorum Nervorum progressus clariùs innotescat; Officium Canalem, per quem iidem pervadunt, primò describere necessarium duco. In Office Temporalis, & Petroso excavatur Nervorum Auditoriorum Canalis: quem non sinè ratione in duplicem partio, nempe in Communiem, & Particularem; siquidem ille ambas simul Portiones; hic verò Duram tantummodo

*Officium Nervorum  
Auditoriorum Cana-  
lis.*  
Delin. Vid.  
Tab. VII. Fig. IV.  
& V. Tab. X. Fig. II.  
Tab. IV. Litt. g. g.

dò continet . Communis Particulari est latior ; Particularis verò præ Communi longior est . Communis à Cranii Cavitate versùs Vestibulum obliquè defertur : & ad finem in tres parvas Sinuositates dividitur ; quarum una versùs Cochleæ centrum pauxillùm descendit ; duæ verò alteræ versùs Vestibulum excavantur ; in quarum unâ insigne Foramen observatur , quod Canalis Particularis principium est . Canalis iste ab Auctore Fallopio Aquæductus vocatus ( quod à D. Schellhammerio jam inculcatum , consultò ego rursus admoneo ; cùm multorum in Libris Tuba Eustachiana Aquæductus nomine incautè adhuc , & non sine confusione vocitetur ) Canalis , inquam , iste paulò postquàm ab indicato Foramine incepit , in duas dividitur Partes : quarum altera brevissima se apertum it in Cranii Cavitatem , altera verò opposito cursu usque ad medietatem Minimi Canalis Semicircularis primò procedit ; hinc deorsum flectitur , sensimque capacior fit ; donec sub Sinuositatem Malloideam delapsa , patentiori hiatu inter Mamillarem , & Styloformem Processum aperitur .

*Nervi Auditorii ,  
& primò*

X. Per descriptos Canales ambæ Auditoriorum Nervorum Portiones deferuntur : quarum singulæ licet simplicem truncum habere videantur ; diligentiori tamen inspectione circa ipsarum principium adhibitâ , ex  
plu-

pluribus funiculis componi inveniuntur. Hæ itaque postquam ab eo, unde emergunt, Cerebri loco per breve spatium recessere; Communem suum Canalem ingrediuntur: per quem ubi Portio Dura pervenit prope illud Foramen, quod Canalis Particularis principium est; deflectit, ipsum Canalem subeundo; per cujus utramque Partem excurrit. Nam hæc quidem in Cranij Cavitatem pergit; & per Duram Matrem, necnon per Quinti Paris Nervorum Truncum sparsis Ramis se se diffundit; illæ verò progreditur versus Tympanum: ad quod ubi misit Surculos alibi descriptos; duos verò à Quintâ Coniugatione Ramulos (ut communiter loquuntur) accepit; ad Foramen, quod inter Styloformem, & Mamillarem Processum hiat, descendit: indèque ita in Ramos, Ramulosque diducitur, uti suo loco ostensum est.

*Portio Dura,*

Delin. Vid.  
Tab. VII. Fig. III.  
& Tab. VIII. Fig. XI.

XI. Portio autem Mollis ad Canalis Communis finem in duas Partes dividitur, per quas Labyrintho prospicit; per unam nempe, quam in Sinuositatem, versus Cochleæ centrum excavatam, insinuat; ipsi Cochleæ; per alteram verò, quam Sinuositatibus versus Vestibulum exculptis committit; eidem Vestibulo, necnon Canalibus Semicircularibus. Ut hanc secundam Mollis Portionis Partem primò prosequamur, sciendum est, Sinuositates, versus Vestibulum excavatas, non per tria, ut tra-

*Portio Mollis.*

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig.  
VIII. IX. X. & Tab.  
X. Fig. I. & III.

*Non tria; ut ab aliis traditur; sed quinque Foramina aditum. præbent Nerviis Surculis in Vestibuli Cavitate.*

Delin. Vid.

Tab. VIII. Fig. II.  
item Tab. X. Fig. I.  
& II.

*Membrana Vestibuli.*

*Tres Canaliculi Semicircularium Zona Sonora, nunc primum vulgata.*

Delin. Vid.

Tab. VIII. Fig.  
VIII. IX. X. item.  
Tab. X. Fig. III.

Usum Vid.

Cap. VI. Num. IV.  
V. VI. IX.

traditur; sed per quinque Foramina aditum concedere in eam Vestibuli Partem, quæ Canaliculis Semicircularibus opponitur, nempe supra Orificium Scalæ Vestibuli. Indicata ergo Mollis Nervi Pars in quinque Surculos dividitur, & ipsos per ea quinque Foramina intrà Vestibulum mittit; in quod statim accessi sunt, laxati in tenuissimam quandam Membranam solent uniri. Quæ quidem Membrana modò in Vestibuli medio suspenditur; modò, præsertim in Auribus non recentibus, propter exsiccationem, ut puto, unita ejus fornici reperitur. Hujus autem Membranæ in Vestibulo figura, longitudo, & latitudo diversis in Subiectis diversæ sunt.

XII. Quinque Nervi Surculi in Vestibulo in Membranam dilatati, peculiari incessu membranaceo ulteriùs progrediuntur. Etenim à Membranâ Vestibuli quædam aliæ Membranæ recedunt, quarum singulæ diversum Canaliculorum Semicircularium Orificium ingrediuntur; ubi verò Membrana per unum Canaliculi Orificium ingressa, Membranæ per alterum ejusdem Canaliculi Orificium intranti, percurrente occurrit; unam continuatam Membranam ambæ componunt. Tales cum striatioris teniolarum (vernaculâ linguâ diceremus d'una Cordellina) sive parvæ zonæ figuram habeant; sintque Motibus Sonoris excipiendis, tanquam Proprium Sensorium, destinatæ; idcirco

circò à me Zonæ Sonoræ nuncupantur. Hæ sunt numero tres; nempe toridem, ac Canales: eandemque cum istis obtinent longitudinem. Earum autem latitudo non pertingit ad lineæ dimidium; etsi Zona, quæ Canalis Communis Orificium pervadit, præ aliis latior sit: utpote quæ ad divisionem Canalis in Majorem, & Minorem in duas pro his Canalibus Zonas debet mox dividi. Zonæ istæ aliquandò minima ramenta membranosa per Canales emittunt; sed ut plurimum nulla emitendo, per eisdem gradiuntur.

XIII. Licet verò has Zonas, quales descripsi; tales quàm sæpissimè viderim, exactèque perspexerim sic, ut de verà earundem existentia nullatenus dubitem; meminì tamen, aliquandò dum ipsas quærerem, præsertim minus adhuc exercitatus; loco Zonarum non nisi quasdam hic illic earum particulas, incertaque tantum vestigia invenire potuisse; non quòd Zonæ abessent, sed aliis de causis, ut postea comperi. Itaque ne Aliquis, si fortè ipsi contingat, quod mihi tunc contigit, indè fallatur, & Zonarum existentiam in dubium trahat; libenter nonnulla circa Zonarum quærendarum rationem communicabo; maximè cum istæ Auditorii Organi præcipua Pars sint; tantumque absit, ut in Libris eorum, qui ante me scripserunt, id possit addisci; quin usque adhuc; ut apertè scri-

K

bam;

bam, nullus, quem sciam, distinctè de Zonis locutus sit. Nam Laudatus alibi D. Schellhammerus integram quidem Membranam ex uno tantùm Canali Semicirculari extraxisse, se, narrat; sed in Corvo; sed qualis, & unde fuerit ea Membrana, non exponit: imò de Membranâ, Canales, ut credebatur, investiente, tunc scribit; & an Nervi in Labyrinthum ingrediantur, aliàs dubitat; Præclarissimus autem D. Du Verney nihil aliud à Nervis in Canales immitti, refert, quàm nerveum filum: quod quidem merum esse filum; sive meram Nervi Ramificationem, etiam Figura, quæ ipse Canaliū Nervos ostendit, Figuræque Explicatio confirmant; Quòd si alicubi (& ferè extra locum) hosce Nervos in Membranas explicari, indicat, istas neque ibidem, neque ullibi describit; imò easdem & ipse vult, nullas alias esse, quàm illas, quibus Canales intùs vestiri existimantur, nisi multùm me fallunt quotquot adhibui, illius Latinæ Versiones; nam Gallica Editio ad meas non pervenit manus. Nec verò quia hoc, ut & quædam alia non detexit Vir ille Exercitatusissimus; idcirco vel minima Magnæ ejus Famæ pars intercidit; nam alia multa, de quibus aut nihil; aut si aliquid; multùm obscurè locuti sunt, qui ante ipsum fuerunt; Scriptis ità tradidit, & Figuris; ut sæpè eisdem superaverit: & fortassis in Libello hoc quædam defuissent; nisi

nisi illius Labores conatus præcessissent meos. Verùm ut ab Officio, quod Præstantissimo Viro, hac præsertim occasione, debebam, ad promissa deveniam mea; Illud primùm ad-  
 verto, quòd dum Zonæ in exsiccata Humana Aure quærentur; potest de levi cum por-  
 tiunculâ Canalis, quæ anatomico ferro ele-  
 vatur, contenta Zona; Canali nempe non ra-  
 rò adhærescens; ità simul disrumpi; ut saltè  
 ex parte ipsius figura, & progressus frustra  
 postea quærantur. Itaque Canales limâ sen-  
 sim aperire, & diligenti, atque expertâ manu  
 pertractare oportet: & in hoc tota fermè ra-  
 tio consistit Zonas exactè detegendi. Ne-  
 que enim consulere possum, ut recentem po-  
 tiùs Aurem adhibeas, qui noverim, in tali Au-  
 re, non solùm Zonas; sed & similia ab Hu-  
 more quodam inferiùs memorando quodam-  
 modò obscurari sic, ut possint minùs exerci-  
 tatos oculos fallere. Neque in ipsis resiccatis  
 Auribus certa sunt præcepta, quibus edoceam,  
 à quo potissimùm latere Canalem aperiendo,  
 contentarum Zonarum læsionem evites. Zo-  
 næ enim; quas quidem in medio Canalis  
 quasi suspensas interdum vidi; modò su-  
 perioribus, modò inferioribus, modò late-  
 ralibus ejusdem parietibus unitæ reperiuntur.  
 In Ovinis verò Auribus regulariter inveniun-  
 tur incedentes super Canaliū pariete infe-  
 riori; adeoque dum inter aperiendum Cana-

*Ratio, qua indica-  
 ta Zona queri debent.*

*In Ovinis Auribus  
 facilius Zona inven-  
 iuntur.*



les, parietem illum devites, integras Zonas in his Animalibus consequeris. Quæ cum in eisdem subobscuri coloris causâ citius occurrant; eò etiam facilius ex his; Quæ de Zonis in Homine præcipua scripsimus, addisces; tum ad eas in ipso Homine aptius detegendas, detectasque dignoscendas instrueris. Sed & in Canalibus Aquilæ Zonarum figura, & progressus cuique ad evidentiam conspicua erunt.

*Item in Auribus  
Aquila.*

XIV. Ut integrum Nervi Mollis in Labyrintho progressum consideremus, Alteram quoque superius indicatam illius Partem prosequi oportet. Hæc verò, ut ibidem scriptum est, Sinuositatem, versùs Cochleæ centrum excavatam, manifestò quidem ingreditur, At qualem à Sinuositate in Cochleam habeat transitum, hoc diutius quærere coactus sum.

*Vid. Tab.X. Fig.II.*

Vidique demum minima quædam Foramina, in certum numerum difficilè cogenda, per quæ Nervæ Fibrillæ Cochleam subeunt. Intrà hanc verò eadem probabiliter in Membranam expansæ, Partem illius Septi Membranaceam componunt, quam superius descripsi; & quam ut à Canaliū Semicircularium Zonis discriminem; cum quibus videlicet multum figurâ, substantiâ verò penitus convenit; Zonam Cochleæ appellabo. Porro an hæc Cochleæ Zona continuationem habeat cum Membranâ Vestibuli, pluries indagavi, sed

*Zona Cochlea, sive  
Septi Cochlea Sub-  
stantia Mollior, de  
qua etiam supra.*

*Delin. Vid.*

*Tab. VIII. Fig.  
VII. VIII. IX. item  
Tab.X. Fig.III.*

*Usum Vid.*

*Cap. VI. Num.  
VIII.*

ni-

nihil solidi in re hac usque adhuc potui reperire.

XV. Descriptis Labyrinthi Nervis Vasa Sanguinea, & fortè etiam Lymphatica associanda sunt. A Cerebro enim simul cum Nervorum Truncis illa observatur versùs Labyrinthum delabi; quorum progressus licet perrarò in Zonis evidenter conspicuus sit; attamen non inverisimile est, eadem Vasa, Nervos comitando, & Canalium, & Cochleæ Zonas irrigare. Quam assertionem non parum roborat Nervi Optici, dum in Retinam se expandit, observatio. Ut enim obvium cuique est; Vasa Sanguinea cum Nervo delapsa, cum ipso quoque in Retinam diffunduntur. Quinimò ipsa etiam Vasa Lymphatica, & Nervum Opticum, & ejus in Retinam expansionem comitantur; Nam ut primus ego in Oculo Bovis, ad multos dies in aquâ macerato, perspicuè observavi; Vasa Lymphatica, eaque sanè non exilia, per Retinam elegantissimè ludentia, indèque verò in majores truncos collecta, se in Opticum Nervum intrudunt, quò loci hic incipit in Medullares Fibras radiatim se se explicare; ut Retinam nempe componat. Sed hæc Vasa in Retinâ observare non semper in promptu est; nam aliàs aliquale tantummodò ipsorum vestigium (prout modò magis, modò minùs Lymphatica apparent) aliàs neque illud ipsum vestigium adnotare

*Vasa Sanguinea  
Labyrinthi.*

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. X.

*Vasa Lymphatica  
in Retinâ, & Nervo  
Optico Bovis noviter  
observata.*

po-

potuimus. Præter verò ipsos Lymphaticorum, & Sanguineorum Vasorum Ramulos, Zonas, ut credimus, perreptantes; sæpè Sanguineæ Propagines internos Vestibuli, Canaliculum, & Cochleæ parietes alluere conspiciuntur: quæ porro an ab ipsis Nervorum Vasis Sanguineis oriantur; an potius sint extimicorum Surculi, quæ interiorem Ossis Petrosi substantiam irrigant; res apud me incerta est. Illud tamen scio, multoties me quævisisse, an talia Vasa distinctis trunculis, & per peculiare Foramen Labyrinthum ingradientur, præsertim circa Fenestram Rotundam, ut apud quosdam legitur; semper verò frustra quævisisse. Nollem interim, quòd occasione horum Vasorum internos Labyrinthi parietes perreptantium, putaret Aliquis, internos eòdem parietes peculiari undequaque vestiri Membranâ, non dissimili ferè modo, ac Ossa solent externè Perioestio indui; se se innitens illi, quam multi obtinent, Opinioni: Vasa Sanguinea per extimam Ossium superficiem non progredi; nisi Membranis contexta suffulciantur; Cum hac enim Opinione profectò pugnat experientia; per quam ego scio, omni Perioestio exactè Ossibus adempto; & quidem sinè ullâ fermè vi, & distractione; Vasa Sanguinea super nudâ Ossium superficie illæsa, & integra mihi pluries apparuisse; Ad hæc super Ossicula in Tympano descripta, Sanguinei repunt.

Sur-

*Opinio illa; quòd scilicet Vasa Sanguinea extimam Ossium superficiem perreptare non possint; nisi Membranis suffulciantur; experientia non respondet.*

Surculi ; illa tamen nullo Perioftio veftiuntur . Ut verbo me expediam ; hoc fcio , me præter fuperius defcriptas , nullam aliam Membranam intrâ totum Labyrinthum videre potuiſſe .

XVI. Partes in hac Interiori Auris Cavitate hæcenus defcriptæ , videlicet Veſtibilum , Canales Semicirculares , & Cochlea unâ cum contentis Membranâ Veſtibili , & Zonis Sonoris quam magnitudinem obtinent in Adultis ; eandem prorsùs in Infantibus habere videntur . Quod quidem non finè ſagaci Naturæ confilio factum eſſe , ubi de harum Partium Uſu ſcribetur , fortasſe monſtrabimus .

XVII. Pro hujus Cavitatis Coronide ſcire juvat , Labyrinthum Humore quodam aqueo , & hoc copioſo intrùs madefactum reperiri , unde contentæ Membranæ humeſcunt : de quo nulli fecere mentionem . Humor iſte in recenti Aure obſervatur . In Fœtu quidem ſanguineâ tincturâ rubefcit ; ſed hunc colorem ſenſim progrediente tempore amittit ſic , ut aqua limpida videatur : quæ quidem etiam Fluido , quo Thorax , & Abdomen humectatur , contingunt . A quibuſnam Fontibus Fluidum iſtud in Labyrinthum emanet , ſenſibus eſt admodum difficile ; ne dicam impoſſibile ; aſſequi : Rerum enim parvitas , & firmiſſimi , in quo reconduntur , Offis durties inquirentis perquiſitionem eludunt . Men-

*Labyrinthus , & contenta in ipſo Partes eâdem magnitudine videntur eſſe in Infante , atque in Adulto .*

Rationem Vid.  
Cap. VI. Num. IX.

*Humor quidam aqueus , quo totus Labyrinthus , & contenta intrâ ipſum Partes madefcunt .*

Uſum Vid.  
Cap. V. Num. IX.

re autem utcumque illud percipi facilius poterit. Et quidem cum omnis externo humori aditus in Labyrinthum intercludatur; in ipso verò Labyrintho præter descriptas Membranas nullæ aliæ aptæ secretioni Partes occurrant; iam hinc video, non defuturos, qui Humorem illum ab eisdem Membranis derivari posse, credant; non dissimili ratione, ac à Peritonæo, à Pleurâ, à Pericardio, à Durâ Matre, à Vaginali Testium, & si quæ sunt, consimilibus Membranis, Serum ( & quidem; uti ex parte mox indicatum est; huic nostro simile ) in Cavitates excerni, observamus. Quos quidem neque probare, neque refellere mihi tempus est. Pariter institui hîc posset quaestio; an excretus Humor ( undecunque demum proveniat ) per frequentes Zonarum concussiones absumptus, in halitus evanescat, an verò perpetim in Labyrinthum depositus, perpetim quoque indè revehatur, & sic effluat, & refluat. Sed cum de re hac non solum in istâ, verum in compluribus Cavitatibus, cum magnâ, ut auguror, Practicæ, & Theoricæ utilitate disquirendâ, sententiam proponere non possim meam, sinè multiplici Experimentorum, & Observationum prænarratione, atque examine; profectò quaestionem solvere nil aliud esset, quàm alteram Historiam hîc exordiri, ubi præsentî finem imponere satius est.

DE

# DE AURE HUMANA<sup>81</sup>

## Traſtatus

### PARS ALTERA

Continens Auris Partium Uſus.

---

*Uſus Auriculæ, & Meatus Auditorii, ſive  
Exterioris Auris Cavitatıs.*

#### CAPUT IV.



Ntrâ nimis anguſtos limites, innata homini ſciendi cupido. ſe cohiberet; ſi quæ in Naturâ tam magna, tam ſubtiliter ducta, tam nitida obſervantur, ſoli oculorum aſpectui committeret: quaſi eorum perditura fructum, ſi ulteriori Mentis contemplationi non obijcerentur. Itâ Compluribus injucundi eſſent labores mei, niſi quæ hucusque in Humanâ Aure viſu exploravimus; intellectu percurreremus. Igitur à Partium Auris Descriptione

L

ad

ad istarum Usus, præsertim minùs obvios, ediferendos animum converto. Qua in re præstandà consilium sanè mihi non est ea omnia perspeculari, quæ in Libris suis subtiliores Philosophi, aut Mathematici circa Aurē consecrari possent, utpotè longioris sæpè indaginis, & à Medico Anatomico non, rarò disparata, sed talia non nisi strictim, & quasi obiter, curiosiores excitaturus, ut plurimum tangam: in cæteris, quæ Medicos Rationales scire magis convenit, ampliùs diffusus. Porro ubicunque res concedet, sententias meas solidis pro meo modulo rationibus, atque experimentis probare conabor: ubi verò res in opinione consistent, si quæ proposuero, scopum apud Aliquos attingere non videbuntur; horum vel contraria judicia neque mirabor, neque refellam; nam cùm arbitrium solis Mentibus relinquitur, ferè unumquemque sua sibi velle cogitata parere, & parata fovere, nec novum est, nec usque adeò intolerandum.

*Ordo Scribendorum.* II. Incepturo duo Ordines occurrunt, quos scèter. Alter ille est, quo Partes se offerunt, idem nempe, quem in Descriptione secuti sumus; alter verò Ordo ipse, quem Motus Sonori, ab Auriculà ad ultimum usque Sensorium progrediendo, observant. Quorum singulos cùm seorsim pulchros esse, intelligo; tum, ambos simul connexos esse pulcherrimos, sentio;

tio; ideòque utrumque simul ut plurimum servare constituo: tunc solummodò ab alterutro, vel ab utroque recessurus; cùm aut inevitabilis Usus cum Ufu colligatio; aut spes majoris perspicuitatis; aut evitatio repetitionum; aut demum similis alia potior ratio suadebit. Igitur Motus Sonori Auris interiora subituri, ad Auriculam primùm appellant. Motus autem Sonori (sive isti sint Vibrationes; sive Tremores; sive Undulationes, sive quodcunque aliud, & in quocunque subiecto, quod à Sanioribus Philosophis excogitetur) pervulgatum jam est, quòd quò plures, quò magis in unum contracti, quò demum fortius impulsì Auris interiora subeunt, eò vividius, atque distinctius percipiantur; nisi quidem vel ipsà nimietate peccarent. Porrò Auricula ad universa hæc commoda facta est tantum, ut si cui desit; hunc debilius audire, jam notum sit. Nam cùm forinsecus, ad instar infundibuli dilatata, exporrigatur; & cùm quantò magis Foveis, atque Eminentis inæqualem, tantò majorem obtineat superficiem; hinc est, quòd Sonoros Motus Auditorio Meatu plures committat. Eisdem verò Cavitates ità configurari, atque disponi; ut quibus reflexionibus Motus illos in Auditorium Meatum trudent, eisdem in unum cogant, jam ab aliis ostensum est. Demum quis non videt, cartilagineam Auriculæ firmitudinem ad

*Auricula Ufus.*

Descriptionem Vid.  
Cap. I. Num. II.

Delin. Vid.  
Tab. I. Fig. I.

*Ejusdem Fovearum,  
& Eminentiarum U-  
sus.*

*Ejusdem Cartilagi-  
nis Ufus.*



Descript. Vid.  
Cap. I. Num. IV.  
Delin. Vid.  
Tab. I. Fig. II.

*Ejusdem Integumenta cur sine pinguedine.*

De hoc Vid.  
Cap. I. Num. III.

*Musculorum omnium, & Fibrarum Auriculae Usus.*

Descript. Vid.  
Cap. I. Num. VI. VII.

Delin. Vid.  
Tab. I. Fig. III. & IV.

Motus, quos reflectit, fortiùs impellendos multùm conducere? Ad quod non parum sanè juvare etiam Ipsius Integumentorum constitutionem, quæ nempe, in indicatis præsertim Cavitatibus, pinguedine destituuntur; satis, superque svademur per vulgatam illam Observacionem de nudo cubiculo, præ illo, quod Auræ insternitur, ad audiendos Sonos conducente.

III. Verùm non satis fuerat Naturæ, Sonorum Motuum fortiorem impulsus per Cartilaginis consistentiam, & pinguedinis defectum ab Auriculâ procurare; sed antequàm ipsi Auditorium Meatum subirent, constituit, ut ab eadem Auriculâ, quatenus Musculis adhuc firmatâ, validiùs repellerentur. Illam igitur Auriculæ Partem, quam iidem Motus, jam jam Meatum subituri, contingunt, Concham videlicèt, circumquaque dispositis Musculis, in tonico perpetim motu persistentibus, ità ex unâquaque ejus parte firmavit; ut rota Concha in eo robore, & tono jugiter permaneat, quò appellentes Sonori Motus fortiùs adhuc reflecti possint. Nam superiorem illius partem perpetuò firmam reddit Musculus Superior; posteriorem Musculi Posteriores. Quòd verò ceteræ quoque ejusdem partes, ut par erat, perpetim firmentur, inventi à nobis Musculi, & Fibræ argumento sunt. Nam Musculus quidém Anterior, necnon Musculus Tragi partem Conchæ lateralem

lem anticam firmant; Musculus verò Antitrage partem inferiorem lateralem posticam . Ad quam lateralem posticam magis, & vndeque firmandam conducunt deniq; Fibre Transverse in Conchæ marginem ex illà parte infixæ . Quæ omnia cùm ita se habere, ipsæ Musculorum, & Fibrarum suo loco descriptę tendentię, & extrema evincant; quidni censeam, tum Concham peculiari hac firmitudine roboratam ad validiorem Sonororum Motuum reflexionem plurimum facere; tum multos Anatomicos injuriâ Auriculæ Musculis omnem Usus hac ratione, quòd eos moveri, non conspicerent, denegasse; quasi verò in Motu Tonico consistere non posset eorum Usus; aut Motus Tonicus conspici deberet: ne illos perstringam, qui ex eadem ratione usque ad ipsos Musculos pernegandos processere .

IV. Hic Aliquis animadvertens, Auriculam non solum tot Motus Sonoros excipere; verum eisdem tantâ vi repellere; facile exco- gitabit, Glandulas Sebaceas à nobis in Auriculâ, & præsertim circa Concham, detectas hoc fortè præstare, ne videlicet Auriculæ Partes assiduis Motibus magis subiectæ, eademque ob al- latas rationes pinguedine destitutæ supra quàm par est, arescant; eas scilicet, sed per quàm levissimè obliniendo; non multum dissimili ratione, ac Volæ Manuum, & Pedum, aliz- que Partes, ne à frequenti motu incallescant;

per

*Glandularum Au-  
ricula Sebacearum,  
qualisunque Usus,  
Descript. Vid.*

Cap. I. Num. III.

*De Tumorum quorundam Cysticorum origine.*

*De eorundem ex Palpebris excisorum ratione.*

per copiosiores, & insigniores Glandulas humectantur. Verùm ego quid de Sebacearum Glandularum Ufu & in Auriculâ, & alibi potissimùm sentiam, nondum proponere audeo. Aliud circa has Glandulas in universum hac occasione adnotabo. Posse nempe de ipsis ambigi (maximè si per omnem ferè Curim, ut coniecimus, reverà adessent) Num forè quibusdam Tumoribus Cysticis, præfertim verò Steatomati originem præbeant. Siquidem tum materia, quæ in Steatomatis Folliculo continetur, illi, quæ in talibus Glandulis reperitur, similis omninò est, tum verò in nullâ aliâ Parte crebriùs mihi se observandos, & secandos ij Tumores obtulere, quàm in Palpebris; in quibus videlicet Sebaceæ Glandulæ, ut suo loco indicavimus, præ alijs Partibus copiosiores sunt, & patentiores. Sed de hoc, & de ratione, qua Steatomata, & similes Tumores ex ipsis Palpebris feliciter excicare soleo, quo nempe artificio, ne Circulares ipfarum Fibræ, aut Tendo Musculi Attollentis Palpebram Superiorem notabiliter lædatur, præcaveam, & quomodò non à parte externâ Palpebræ; sed ab internâ sectionem instituendo, certiùs, & nullâ relictâ cicatrice, eos Tumores tollere excogitaverim; de his, inquam, omnibus opportunior forè olim occurreret scribendi locus.

V. Motus Sonori ab Auriculâ in Meatum Au-

Auditorium intrusi, per hunc versùs Mediam Auris Cavitate contendunt. Sed per ipsum quantum augeatur illorum vis, iam disquisitionum est tum ab illis, qui à lato in angustum tendentis Meatus ad ipsos colligendos aptitudinem animadverterunt; tum ab alijs, qui incurvum ejus incessum ad illos augendos Motus non minùs, quàm inflexam Tubam, aut Cornu, factum scripsere: qui sanè postquam ego talem incessum magis adhuc, quàm credebatur, tortuosum descripsi; in Sententiâ magis confirmari poterunt suâ. Nos itaque tantummodò à re prætermisâ, nempe ab Incisuris in Meatus principio occurrentibus, hanc Sonorum Motuum corroborationem deduci etiam posse, coniiciemus, secundùm Observationem quandam, quam accepimus à Clarissimo Hiemyniano Rondello Bononiæ Matheſeos Professore. Hic sibi construxerat Tubam Polyphonicam ex pluribus conglutinatâ chartarum stratis: quam & ad loquendum, & ad audiendum dum adhiberet; ipsam præ cæteris, quibus antea usus fuerat Polyphonicis Tubis, sive emitteret, sive (quod ad rem nostram) exciperet voces; ipsam, inquam, magis, quàm cæteras, voces intendere, animadvertit. Quam porrò dum attentè, & diligenter perlustrat, ut augmenti illius causas dignoscat; nil demum in hac peculiare adinvenit; hoc uno excepto, quòd ubi cæteræ undique erant con-

xis

*Meatus Auditorii  
Usus.*

Descript. Vid.  
Cap. I. Num. IX.

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. I.

*Incisurarum Meatus  
Auditorii Usus.*

Descript. Vid.  
Cap. I. Num. X.

Delin. Vid.  
Tab. I. Fig. II. &  
Tab. IV. Litt. f. f.

xis stratis, & minimè ab invicem dimotis; in istâ interna strata hîc illic, laxato glutine, ab invicem paulò discefferant sic, ut complures intercapedines inter se relinquerent, vacuitates scilicet Meatus Auditorii Incisuris æquivalentes; cùm istius Incisuræ nil aliud sint, quàm intercapedines inter unam, & alteram Membranulam relictæ. Nunc verò certum est, Meatum Auditorium, cùm ex lato in angustum procedat; Tubam quandam Polyphonicam ad Sonos excipiendos Auri admotam referre; quidni ergo coniiicere Aliquis possit, eas, quæ in illo sunt, Incisuras, sive stratorum intercapedines, idem præstare, quod eadem in Tubis Polyphonicis præstant; præcipuè cùm tali situ locatæ fuerint, ut maxima Sonorum Motuum pars, qui Meatum subeunt, necessariò ad ipsas allidatur. Porro si hæc conjectura uti nobis, ità & cæteris probaretur; & quod Laudato Viro successit, aliis quoque constanter responderet Experimentum; sanè in consimilibus Tubis conficiendis, tales inter strata intercapedines in posterum elaborari deberent, ut perfectiores effectus obtinerentur, quos vel ipsa Natura hac Meatus Auditorii constructione videtur polliceri. Atque utinam Artes possent ab illis etiamdum ignotis, per quæ Natura in nobis operatur, instrumentis, præcepta desumere; ô quantum perfectionis Artibus, quantum commodi Rei-

pu-

*Monitum illis, qui  
Tubas Polyphonicas  
conficiunt, propo-  
sum.*

publicæ, quantum toti Orbi novitatis accederet, atque etiam oblectamenti!

VI. Quid verò Sonororum Motuum viribus, ità in Meatu Auditorio adauctis, id quoque conferat, quòd ejusdem Meatus parietes pro maiori parte ex Osse construuntur; ex illis quæ superiùs de Cartilaginum ad eos Motus viviùs reflectendos aptitudine indicata sunt, jam satis, nisi fallor, colligitur. Quocirca tum modò; tum deinceps; cùm quidem reliquum Auditus Organum in Osse excavatum sit; quanto cum Sonororum Motuum comodo Auris penetralia quæque ex Osse construuntur, explicare consultò omitemus; maxime cùm idem ab aliis indicatum fuerit. Illud verò hic admonebimus, quòd nempe cùm ad Membranam Tympani componendam, aliosque Usus super Meatus Auditorii osseos parietes Cutim extendi, oportuerit; poterat hac ratione illud commodum, quod ob ossicâ superficie Sonoris Motibus provenit, admodum minui; sed ne ità contingeret, per dimidiam saltèm, ultimam Meatus partem, Cutis, uti quidem ego observavi, tensa, & summoperè attenuata est. Per quam tamen Cutis eo loco tensionem, & tenuitatem; cùm sensibilibior illa sic fiat; etiam hoc præstatur, ut externarum injuriarum ad Tympani Membranam jam accedentium; utputa dum Auriscalpio purgamus Aures, op-

M

por-

*Cur Meatus Auditorii Cutis pro magna sui parte ità attenuetur, atque tendatur.*

Descript. Vid.  
Cap. I. Num. XI.

*Ufus Ceruminis.*

portunè admoneamur. Cæterùm quæ reliqua in Meatu Auditorio Cutis pars est, ut à certo injuriarum genere præmuniret, utilem istam Sonoris Motibus tenuitatem, atque tensionem obtinere non potuit. Nam Cerumen excernere, excretoque oblini debuit, quò nempe animalculis aditum in Aures intercluderet per ejus, ut perhibetur, visciditatem, necnon etiam per ejus, à qua fortassis fugantur, amaritiem. Cerumen verò insuper ad Cutis, à qua separatur, sicuti humor ille aqueus, tenuiorem Cutim humectans, ad ejusdem tenuioris Cutis inter tot assiduos Sonorum Motuum ictus conservationem facere fortasse poterit, secundùm illa, quæ de Ufu Glandularum Sebacearum superius indicata sunt.

*Constrictionis Meatus Auditoris, crassaque in ipso occurrentis substantia in Foetu Usus.*

Descript. Vid.  
Cap. I. Num. XIII.

*Infantes recens nati aut nihil, aut minimum audiunt.*

V II. Verùm ut Cerumen, Cutisque indicatæ sensibilitas ad arcendas à Membrana Tympani injurias in nobis conducunt; ità in Foetu ne ad eandem fortasse nimis laxandam Liquor Amnii permearet, cautum est per Meatus circa ejus principium constrictionem, necnon per crassam illam, quæ idem tunc operitur, substantiam. Quæ duo cum jam nato Infante, non illicò sanè auferantur, clarum est, eadem hoc quoque præstare, ne scilicet externis injuriis Aures recens natorum statim exponantur: eosdemque primis diebus nihil, aut minimùm audire, hac etiam

etiam de causâ perspicuum est.

VIII. Quid verò Nervi, Arteriæ, Venæ, & Lymphatica Exteriori huic Cavitati præstent, aut duabus etiam sequentibus; cum id quidem aliis Partibus commune ut plurimum sit; supervacaneum foret hic, aut deinceps peculiariter explicare. Ideò si quid minus obviæ Vasorum occasione nobis succurrer, hoc scriberetur: cætera autem mittentur. Hic ergo occasione Venæ Occipitalis à nobis descriptæ, duo tantum indicabimus. Alterum, quod nempe mirari subit, cur Natura quem sanguinem deorsum in Jugularem Venam expeditius demittere potuisset; pertusâ peculiari Foramine Calvariâ, intrâ hanc compellere in Lateralem Sinum maluerit; Alterum, verò, quod mihi olim Tumoris cujusdam naturam dignoscere, atque adèd ad Dominum Joannem Baptistam Morgagni Philosophum, & Medicum Forolivientem, à quo circa eundem Tumorem per litteras consulebar, probè, & utiliter respondere multò difficilior fuisse, si hanc Venam Occipitalem ignorassem. Ut enim scribebat Juvenis iste Judicio, & Studio Spectatus, & qui mihi in Publicis Anatomicis Administrationibus, tum in hoc ipso conficiendo Tractatu adiutrices præbuit manus, Cuidam Agro Tumor erat in Occipite (& quidem eo loco, ubi illius Venæ Truncum postmodum inveni) magnus,

M 2

glo-

Descript. Vid.  
Cap. I. Num. XIV.

Delin. Vid.  
Tab. VII. Fig. II.  
Tab. IV. Litt. A.A.

*Circa Venam Occipitalem Problema.*

*Observatio, & Signa cujusdam Speciei Tumorum à sanguine extravasato provenientium.*



*Altera eorundem  
Observatio.*

globofus, æqualis, non variciformis; mollis, qui fluidum intus stagnans continere videbatur, & qui ficuti appreffis digitis fenfim ex toto evanefcebat; ita iisdem ablatis, redibat; neque tamen pullabat. Ego fanè cùm paulò antea confimilem in Collo Tumorem; qui parum defuit, quin à Chirurgis aperiretur; à rupturâ Venæ Jugularis Internæ languinem, in viciniam effudentis ortum effe, poft Ægri mortem comperiffem; hunc quoque ex iisdem fignis ejufdem effe generis, ex unâ parte cogitabam. Sed ex alterâ, cùm fufficientem Venofum Truncum nullum ibi adeffe, fecundùm vulgatas Venarum Descriptions, fcirem; hunc Tumorem à difruptâ Venâ deduci poffe, non credebam. Nec verò nullius momenti ea mihi videbatur Dubitatio. Nam fi primum ftatuerem; illum fanè Medicum, in eo confirmare debebam, ut Tumorem hujufmodi temerè, & à quocunque aperiri, quemadmodùm Æger curabat, neutiquam permetteret. Si autem fecundum, ut Tumoris apertionem fufpectam facerem, nulla ferè ampliùs me ratio movebat. Verùm me ita incertum animi, & confilia fufpendentem, illa, quam ibi interim detexi, Vena illuftravit. Illa enim effecit, ut in conceptâ iftiusmodi Tumorum probabili Diagnofi perffiterem; adeòque non finè Ægri utilitate, in primâ potiùs confirmavit fententiâ.

*Usus*

*Ufus Tympani, sive Mediae Auris  
Cavitationis.*

C A P U T V.



Icui verò Auriculæ, & Meatus Auditorii Anatomica consideratio ostendit, Motus Sonoros, per illa fortiores factos, usque ad Tympanum se se deferre; ità Motus illos non nisi per quatuor Officiorum Mechanicum motum, per Tympanum in Labyrinthum transferri, ipsius Tympani contemplatio indicabit. Quod ideò in ipso limine statim prædico, ut tantò libentiùs hæc, quam exordior, Disquisitio perlegatur; quanto citiùs notum fuerit, Opinionem meam circa rationem, qua Sonori Motus per Tympanum ad Labyrinthum transeunt, ab istis, quæ circumferuntur, Sententiis diversam fore. Omnes enim, ut puto, novam aliquam circa hoc Opinionem libenter legent; cum jam vulgaritas ob res, quæ in Tympano observantur, multas; minùs verisimiles esse, sciant. Quis enim non videt, quòd si Motus Sonori; ut communius perhibetur; deferre ipsi se se in Labyrinthum deberent; officerent expedito ipsorum cursui tot interposita per Tympanum impedimenta, scilicet non solum Membrana ipsius Tym-

*Vulgatas Opiniones circa modum, quo Sonori Motus per Tympanum ad Labyrinthum transeunt, ipsa Tympani Anatomie minùs verisimiles esse, ostendit.*

Tympani ; sed hinc Stapes Ovalem Fenestram obturans ; illinc Membrana Fenestram Rotundam claudens ; necnon situs ejusdem Fenestrationis, advenientibus Sonoris Motibus non adversæ ; sed lateralis. Quantum verò ad cæteras Sententias attinet ; quot res in eadem Tympani Cavitate ; imò in Ossiculis ipsis sunt, quæ omninò credere non sinunt, Sonoros Motus per quosdam intestinos tremores, aut alios similes motus ab uno Ossiculo reliquis successivè communicatos, in Labyrinthum transferri ? Sed per aliarum Opinionum subversionem sententiam hinc aliquam adstruere neque consilium, neq; institutum meum est. Præstat itaque, ut ipsas Tympani Partes juxta consuetudinem nostram consideratione percurrendo, ostendamus, si possim, quod pollicebar ; Opinionem illam ; nempe quòd Motus Sonori per quatuor Ossiculorum Mechanicum motum ab Auditorio Meatu in Labyrinthum transferantur ; ab ipsà Tympani contemplatione indicari. Quod ut clariùs præstem ; juvabit à quatuor Ossiculorum consideratione initium capere ; qua nempe tota hæc mea Opinio qualis sit, ante omnia explicetur.

*Opinio nova circa  
hanc rem.*

*Ossiculorum, & Ovalis Fenestra Usus.*  
Descript. Vid.  
Cap. II. Num. IV.  
VII. VIII. X. XIII.  
Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. V.  
VII. III. XI. & Tab.  
X. Fig. I.

II. Principiò autem illud ex nostris Descriptionibus, & Tabulis colligi potest, Malleum ità construi, & supra talem sui locum, mobilem esse ; ut Vectem primi generis, sicuti loquuntur Mechanici, repræsentet ; Manubrium enim,

enim, sive unum extremum ad Membranæ Tympani centrum; Caput verò, alterum scilicet extremum ad Mastoideam Sinuositatem extendens, hypomochlium inter utrumque habet, nempe in oppositis insertionibus Musculorum sui Minoris Processus, & Minimi; à quorum tonico motu hypomochlii firmitudo dependet. Rursus ex eisdem Descriptionibus, & Tabulis deduci similiter potest, Incudem quoque ejusdem generis Vectem referre; cum Corpus, sive unum sui extremum ad eandem Sinuositatem; Longiorem verò Processum, nempe alterum sui extremum, Stapedem versùs exporrigens; hypomochlium pariter habeat inter utrumque, videlicet in eo Sinuositatis indicatæ pariete, cui Processus illius Brevior alligatur. Deinde illud quoque ex eisdem constat, Mallei Caput, & Incudis Corpus firmiter committi, nempe unam unius cum alterâ alterius Vectis extremitate connecti; adeoque vim unius Vectis alteri statim applicari sic, ut quo tempore ultima unius Vectis extremitas, utputa Mallei Manubrium, loco moveatur, eodem ultima alterius Vectis extremitas, scilicet Processus Longior Incudis debeat pariter commoveri. Ad hæc ex eisdem Descriptionibus, & Tabulis habetur, Longiori huic Processui Stapedem, ceu quandam appendicem, adiungi: atque adeò illo moto, oportere, ut hic quoque moveatur. Quæ  
cùm

cùm ità sint, attentis etiam cæteris, quæ circa Officulorum posituram, & locum fuerunt scripta; colligitur: Quòd eodem tempore, quo Mallei Manubrium versùs Tympani Cavitationem magis, aut minùs repellatur; eodem, inquam, tempore Basis Stapedis sursum magis, aut minùs per Ovale Fenestram movebitur: & quòd illo versùs Meatum Auditorium redeunte; hæc quoque uno eodemque tempore versùs Tympanum relabetur. Porro totum hoc, quod ex Mechanicà expositorum instrumentorum constitutione colligimus; & quod facilè Alicui inter legendum, arduè nimis, aut obscurè; fortasse etiam imaginariè deductum videtur; totum hoc, inquam, per ipsam autopsiam facillimè, & exactissimè in recenti Aure confirmari posse, testamur. Cùm reverà ergo Natura adeò manifestam, adeò excogitatam, adeò mobilem, hìc apparaverit Machinam: cùm ultimas ejusdem extremitates eà ratione constituerit; ut quo tempore earum una magis, aut minùs moveretur, eodem altera magis, aut minùs moveatur: cùm demum earundem extremitatum alteram, nempe Basim Stapedis eo loco posuerit, ut non possit moveri, quin suos aëri, qui in Labyrintho est, communicet motus; alteram verò, idest Mallei Manubrium tali loco, talique ratione locaverit, ut quàm facillimè à Sonoris Motibus (quorum nempe

adve-

advenientium cursui ante cætera Officula quasi occurrit, & totum quantum est, obvertitur) quàm facillimè, inquam, ab advenientibus Sonoris Motibus vim pati queat; Quis non conijciat, Machinam hanc factam esse ad eodem Sonoros Motus in Labyrinthum transferendos; maximè cum isti; nisi hac ratione transferrentur; Fenestræ Rotundæ Officia perturbare possent, ut sequenti Capite ostendetur; & cum insuper per hanc Machinam tam mirabili celeritate transferri queant, ut quando alteram ejus extremitatem, ad Tympani principium attingunt; per alteram in Labyrinthum translati jam reperiantur.

Vid. Cap. VI. Num.  
VII.

III. Hucusque in Officulis consideravimus eorum structuram, hypomochlia, commissuras, situm, & locum. Itaque ad susceptam eorundem contemplationem absolvendam, superest, ut eorum denique Musculos consideremus. Verùm cum illa, quæ de Musculo Processus Majoris Mallei cogitamus, perspicuè exponere non nisi inferiùs possimus, de Musculis verò cæterorum ejusdem Mallei Processuum alia non suppetant præter ea, quæ obiter paulò superiùs indicabamus; idcirco hîc loci Musculum Stapedis tantummodò examinabimus. Et sanè si benè considerentur tendentia, & insertiones istius Musculi; etiam ex ipso expositi Officulorum Motus indicium aliquod obtinebitur. Videtur enim Musculus ille esse

N

da-

*Usus Musculi Stapedis.*

Descript. Vid.  
Cap. II. Num. XI.

Delin. Vid.  
Tab. III Fig. X. &  
Tab. X.

*Ratio, cur Membrana, qua Basim Stapedis Fenestra Ovali circum alligat, ex una determinatâ parte firmior sit.*

Descript. Vid.  
Cap. II. Num. X.

datus, ne unquam vi majoris alicujus motus ita altè Stapedis Basis per Fenestram ascendat, ut circumligans Membrana rumpatur: item ad promovendum aliquandò (simul cum vi elasticâ annexæ Ossiculis Membranæ Tympani, alijsque concausis) impulsorum Ossiculorum restitutionem, aut saltèm præcavendum, ne in validiori eorundem restitutione, tenuis Stapedis cum reliquis Ossibus commistura dissolvatur. Nempe valet Musculus ille Stapedem, paulò altiùs per Fenestram adactum, opportunè retrahere, atque adeò cogere, ut adnexorum Ossiculorum restitutionem promptè sequatur. Quoniam verò hic Musculus (sive ipsum retrahat in hunc finem, ut probabile satis videtur; sive in alium) Stapedem non potest, nisi obliquè retrahere; non potest verò Stapedem obliquè retrahere; quin eam Basis illius partem, quæ ex sui ipsius latere est, margini Fenestræ apprimat; hinc factum reor, ut Membrana eam Basim colligans, ne fortè ex illâ appensione atteratur; ex eadem parte, uti ego animadverti, firmior, & robustior constructa sit.

IV. Si quæ verò Pars in Tympano superest, quæ sicuti expositum Ossiculorum Motum; atque adeò Sonororum Motuum transvectionem non parvis commodis juvet; ita ad illum indicandum conspiret; eam profectò Membranam Tympani esse, non sinè ratione  
exi-

existimamus. Membrana enim hæc idcirco videtur (si quidem quæ præmissa sunt, hîc simul attendantur) idcirco, inquam, videtur Mallei Manubrio adhærere; ut videlicet quæ Motuum Sonorum lineæ (ut sic loquamur) aut radij, in ipsûm Manubrium non cadunt, illarum quoque ictus, quos nempe exceptos, per suas concussiones ipsa communicat, in idem Manubrium vim faciant. Alteram Membrana Tympani utilitatem eidem Sonorum Motuum transvectioni confert. Illa enim sua Cavitas Conica, adeoque à lato in angustum contracta, videtur sanè aliquot eorundem Motuum radios versùs sui apicem, seu finem aliàs non ituros compellere; At verò extremitas Manubrii, scilicet ea pars, quæ ut ab hypomochlio remotissima est; sic facillimè præ cæteris moveri potest, ad apicem istum, seu finem Conicæ illius Cavitaris collocatur.

V. Dum nos hæc commoda, quæ Sonoris Moribus in Labyrinthum sic tranvehendis à Membranâ Tympani proveniunt, & quatenus eorum aliquot ità colligit, & quatenus ferè omnium ictus excipit, recensemus; non deerunt, qui talia subverti posse, existiment per vulgatum illud VVillisii Experimentum de Cane, post pertusam utriusque Tympani Membranam ad tres menses adhuc audiente. Quibus nos illud primò dicemus. Opinionem

*Membrana Tympani Ujuz.*

Descript Vid.

Cap. II. Num. I.  
&c. Item Num. IV.

Delin. Vid.

Tab. III. Fig. III.  
&c.



*Assignati Membrana Tympani Usus non tolluntur per Experimentum Villisi de Cane, post ejusdem Membrana perforationem audiente.*

*Quadam desiderantur in ejusdem Experimenti relatione.*

nostram non esse, ut ea, quas Membranam Tympani conferre censemus, utilitates omnino ad audiendum necessariae sint; sed tantummodò ad perfectè audiendum non parum conducant. Rursus eandem, si probe attendatur, à Membranà etiam alicubi disruptà, licet non ità exactè, præstari posse. Quæcùm ità sint, porrò subiiciemus: Nos Experimento isto minimè urgeri, in quo nempe referendo, Auctor aliàs Studiosissimus, ità jejune se gerit, ut quomodò audiret Canis post eam pertusionem, non satis expressè, & absolute enarrat; quænam verò in Membranà Tympani læsio; occiso Cane, inventa sit, neutiquam recenscat; adeoque permittat, ut nos interim suspicemur, eam Membranam alicubi tantum disruptam (sive ut ipse ad rem nostram loquitur) perforatam fuisse; itidem Canem, præsertim primis ab eà perforatione diebus, tantummodò ruditer (ut idem Auctor antequàm Experimentum enarrat, indicare videtur) ruditer, inquam, & imperfectè audivisse. Qua quidem unà responsione licet nos optimo jure interea uti possemus adversus illos, qui Experimentum istud obiiicerent, nolumus tamen unicæ huic suspitioni fidere; sed hoc potissimum respondemus. Fuisse, ut velint, Membranam notabiliter disruptam, Canemque tres postea, & plures etiam, si velint, menses ità ferè audivisse,

ut

ut antea solebat. Hoc totum concedimus. Illud verò negamus. Constare scilicet, quòd ea ruptura eodem tempore in Membranâ perstiterit. Quiaimò illa, ut nos putamus, facile sanata est: & Membrana in pristinam integritatem probabiliter rediit. Quæ res licet multis paulò difficilior videri possit; qui tamen animadvertent, divisas per rupturam, introrsumque adactas Membranæ partes facile ita se posse in priorem locum reducere, ut rursus singulæ ad invicem accedant; item reverà Naturam tum posse, tum solere istius Membranæ rupturas ex facili sanare; illis profectò non ita difficilis apparebit. Sanè ego in Auribus cujusdam Mulieris, quæ ab Ulcere Tympani, hujusque Ossiculorum Carie jampridem in Auditus Gravitatem inciderat, proximam hujus Affectionis causam nuperrimè inquirens, alteram quidem Aurem; qua Mulierem Surdam fuisse, necesse est; absque Tympani Membranâ, Ossiculisque omnibus; si Strapedis Basim excipias, inveni, & totum insuper Tympanum ab informibus fibrosis veluti excrecentiis occupatum vidi; sed in oppositæ Auris Tympano corrosam quidem maximâ ex parte Tympani Membranam comperi, ita ut Malleus, necnon Incus omninò intacta, indaganti statim occurrerent; statimque cognoscere liceret, Processum Longiorem ejusdem Incudis, scilicet per quem cum

Sta-

*Non ita difficile est,  
Membrana Tympani  
rupturas sanari.*

*Observatio causa-  
rum Surditatis ex  
vna Aure; & Gra-  
vitatæ Auditus ex  
alterâ.*

*Membrana Tympani maximâ ex parte corrosione abscipta à Natura restituta est.*

*Obiter confirmatur expositus quatuor Ossiculorum Usus.*

Stapedis Capitulo solet articulari, omninò abrasum fuisse sic, ut nulla ampliùs inter hæc duo Ossa intercederet articulatio; At corrosam Membranæ partem Natura quodammodo restituerat; nam nova quasi Membrana Tympani ab illâ Membranæ parte obliquè per Tympani Cavitatem producebatur eâ ratione, ut Malleum, Incudemque excluderet; Stapedem verò obtegeret, cujus Capitulum ipsi annectebatur: quasi Natura, cum abruptâ Ossiculorum unione, non ampliùs interesset, ut Membranæ Tympani Major Processus Mallei uniretur; Stapedis saltèm Capitulum eidem Membranæ annecti, voluisset. Ex qua Observatione sicuti unum deducere, fortasse possum in confirmationem Opinionis istius meæ de utilitate, quam Ossicula, quatenus in Vectem disposita, atque unita, in audiendo præstant; nam hic, ubi Vectis destructa erat, Auditus Gravitas aderat; ità hoc alterum eruo, quòd si Natura Membranam hanc maximâ ex parte corrosione absumptam ità ex integro ferè restituit; eò faciliùs Membranæ ejusdem aliquam partem, non absumptam, sed tantùm dimotam, in Cane illo, fortuerit, non dico regenerare; sed tantummodo unire. Verùm quid ego diutius immoror in hoc ostendendo; posse videlicèt Naturam sanare ex facili rupturas Membranæ Tympani; cum adductis urgentioribus experimentis in-

indiciū possim exhibere, quòd de facto Natura soleat easdem rupturas faciliè sanare. Ego enim cū duobus Canibus Tympani utriusque Membranā, adactō crassiori specillo, certissimè (id scilicet modò rupturæ crepitu, modò simili aliā re testante) certissimè, inquam, perrupissem; imò specillo huc illuc ducto rupturam, quantum potui, dilatasse; occisis postea Canibus, singulas perruptas Membras itā in pristinā integritatem restitutas inveni, ut nec minimas rupturæ reliquias in earum ullā; imò neque levissimum (si unam tantummodò excipias) ductæ cicatricis signum reperire potuerim. Nec verò Aliquis interea obloquatur: Ut res se se habuerit in adductis Canibus; certè Cani isti VVillifiano Tympani Membranā non fuisse restitutam; cū demum post tres menses in totalem Surditatem inciderit. Nam mihi non constat, an ex persistenti illius Membranae aperturā, externis nempe injuriis aditum concedente, ea Surditas ortum duxerit; cū potius secundū mea Experimenta arbitrari possim, à vitio aliquo aut Membranae, quæ Stapedem Fenestræ Ovali annectit, aut Ossiculis, aut simili alii Parti in eā perforatione inducto, causā Surditatis exortam esse, quæ paulatim in dies aucta, tandem sensibiliter Auditum vitiaverit; imò & sustulerit. Illud mihi certum est; in Experimento illo conficiendo

*In duobus Canibus, quibus Tympani Membrana perrupta fuerat, eadē in pristinā integritatem restituta est.*

*Cur hac Membrana Tympani restitutione non obsistente, aliquandò tales Canes incidere in Surditatem possint.*

*In conficiendo indicato Experimento VVillifio, quamvis subesse deceptio possit,*

ciendo, non ità facile esse certam tantummodò Partem, utputa Membranam Tympani, lædere, neque cùm confeceris, affirmare, an istam solùm; an verò etiam alia vitiaveris, nisi quidem animal eneces, & inspicias. Sed de istis fusiùs, necnon de Canibus, quibus Tympani Membrana perrupta est; nihilominus ad sex menses, ad annum; imò usque dum vixerint, audientibus, fortasse olim verba faciam; cùm nempe omnia, quæ circa hoc Experimentum, imperfecta adhuc mecum agito, experientia perfecerit, & tempus maturaverit: qua occasione fortassis etiam rem disparatam primâ facie disquiram; quæ nempe causâ sit, ut inter audiendum distinguamus; ex qua Parte proueniat Sonus, scilicet an ab inferiori loco; an à postico; an à superiori; an verò ab antico.

*Canes post rupturam Membrana Tympani, non solùm ad tres menses, verùm ad annum, imò usque dum vixerint, audiuisse, indicatur.*

VI. Hactenus copiosè; fortassis etiam prolixè responsum est illis, qui ex VVillisiano Experimento contenderent, Membranam Tympani eas, quæ recensebantur, præstare non posse utilitates. Ostendam modò: tot rationibus coniici posse, Naturam de iisdem Usibus mximoperè fuisse sollicitam; quot adhuc Partes in Tympani Cavitate perpendendæ supersunt; quas nempe assignatis Membranz Usibus auxiliari, probabimus, singulas ordinatim considerando. Quod si præstabimus; tum simul implicite ostenderimus, singulas, quæ

quæ in Tympano sunt, Partes Officulorum, Mechanico Motui favere, tum denique singularum Tympani Partium Officia eadem operâ exposuerimus. Et primò quidem Membrana Tympani ità feliciter à Sonoris Motibus in utiles illas concussiones adigi non posset; si remissa, & laxa utcunque penderet; idcirco ope Musculi Processus Majoris Mallei; ut in hujus Historiâ probavimus; ità retrahitur, ut non solum in Cavitatem illam Conicam opportunè conformetur; verùm tota sic contendatur, ut ab incurrentibus Sonoris Motibus facillimè possit commoveri.

VII. Ne verò à tot, & tam assiduis motibus eadem Membrana supra quàm par est, exsiccaretur; cautum est per levem ejusdem humectationem; humore fortasse educito ab ipsâ Membranæ structurâ; aut certè à Tympani Cavitatē. Certum enim est, Humore quodam Tympani Cavitatem madere; adeoque etiam internam Membranæ Tympani faciem illo humectari, & fortassis etiam faciem externam. Nam si illud Foramen, de quo suo loco scripsimus, in Membranâ hac admittatur; facile est, Humorem per illud supra faciem Membranæ externam demitti; maxime si Humoris istius partem descendere in Tympanum per superiores hujus parietes, coniiciamus, nempe per Sinuositatem Mastoideam; in quam per inventa illa Foramina

O

mina

*Ufus Musculi Processus Majoris Mallei.*

Descript. Vid.  
Cap. II. Num. V.

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. V.  
& Tab. X. Fig. I. & II.

*Ufus Humoris illius quo Tympanum irrigatur.*

De hoc Vid.  
Cap. II. Num. XV.

mina à Cranij Cavitate diffillat.

VIII. Quando autem in Nova hæc Foramina incidimus, de quorum naturali Ufu refpectu Membranæ Tympani, & Auris nihil aliud adducere possumus præter conjecturam istam, quam alibi proposuimus, & mox indicabamus; sinat Lector, ut potiùs, quot, & qualia commoda in præternaturalibus Capitis constitutionibus hæc Foramina Ægris præstent, quasque utilitates ipsis etiam Medicis eorum afferat cognitio, hic loci recenscamus sanè hanc, qualiscunque est; sive digressionis, sive prolixitudinis veniam ipsa rerum gravitas exigit. Quò breviori possum compendio, ab utilitatibus, quas Ægris præstant ea Foramina, me expedio. Non enim hic repetam alibi enarratam historiam Viri, in Capite percussi, qui, quoties pus per Aurem exiret, à morbo levabatur; cùm verò ex toto suppressum est; morbo oppressus interiit; nam ibidem ab eisdem Foraminibus utilem illam, cùm fiebat, excretionem, quantum satis esse possit, deduxi. Mittam pariter Abscessuum in interioribus Capitis disruptorum, per Meatum Auditorium, aut Os felices, quas vidi, expurgationes exponere; nam ex illis, quæ iam pridem indicavimus, sat potest intelligi, me tales sive per Os, sive per Meatum Auditorium expurgationes ab eisdem Foraminibus derivare. Addam hic tertiam præ-

*Utilitates, quæ à Foraminibus noviter in Tympano inventis proveniunt.*

Descript. Vid.  
Cap. II. Num. XIV.

*Per hæc Foramina expelluntur Morbofa Fluida à Cavitate Cranii ad Meatum Auditorium.*

*Item ad Oris Cavitatem.*

præternaturalium expurgationum Capitis viam, nempe Nares, ab eisdem Foraminibus excernendas recipere posse materias. Scilicet valde proximum vero hoc mihi videtur; in aliquot nempe serosis per Nasum excretionibus, per quas Capitis Dolores vidi sublato, ferum illud, quod excretum est, à Cranij Cavitate per ea Foramina descendisse. Nam hinc circumstantiæ à Cranii Cavitate delapsæ esse, persuadent, hinc verò eadem ferè ratione, qua ab illis Foraminibus, materia ad Os demittitur, & in Nares potest amandari, cum Tuba Eustachiana eò desinat, unde materia ferè æquali facilitate & in Os ipsum, & in illud Nasi Internum Foramen, quod ex latere Tubæ est, deflectere valeat. Dum verò hæc ità recenseo, res simul altera perspicua fit, scilicet Quòd ego cum ista Foramina inveni, quæ illinc cum Cranii Cavitate; hinc cum Ore, & Naribus communicant; Hoc etiam inveni; Externum scilicet hunc aerem, quo circumfundimur, quoque Os, Naresque assiduè plenas habemus, quatenus illi, qui Tubas, & Tympanum replet, continuatur; immediatè Duram Matrem contingere: adeòque eundem externum aerem, prout varius est; ità varias in eandem, & in Cerebrum vires statim exercere posse: non tenue fortasse argumentum tum Cerebri, & Morborum ejus Scriptoribus, tum ipsi mihi,

*Item ad Nares.*

*Capitis Dolores serosis per Nasum excretionibus sublato.*

*Per hæc Foramina potest aer externus immediatè agere in Duram Matrem.*



cui quidem illę, quę per hęc Foramina Ægris  
proveniunt, utilitates, in præsens scribuntur.  
Verùm ego, memor, quid potissimùm in hoc  
Libello tractandum assumpserim, hæc omnia  
dimitto, uno tantummodò excepto, quod,  
quia cum aliis utilitatibus superius expositis,  
ad præternaturales Capitis expurgationes per-  
tinet; ob hanc causam explicabo. Cùm igitur  
ille, quo Os, Naresque replentur, aer per  
hęc Foramina usque ad Duram Matrem per-  
tingat; clarum est, quòd ab ijs quoque For-  
aminibus illud beneficium obtinetur, ut in Vul-  
neribus Capitis penetrantibus, dum clausis  
Naribus, & Ore, aer vi intrò comprimitur; fa-  
nies à Cranij Cavitate per Vulnus prorumpat.  
Etenim in tali conatu aerem per Tubam Eu-  
stachianam versùs Tympanum, & consequen-  
ter postea versùs Foramina, & Cerebrum impe-  
tu compelli, non solùm ratio ostendit; sed mul-  
tiplex quoque Experientia. Nam (ut pro omni-  
bus unam, quam alibi innui, hìc proponam) si  
quis in Tympano, aut in viciniâ Ulcus, aut  
tale quid gerens, unde ichor in Meatum Au-  
ditorium assiduè distillet; si, inquam, iste,  
clauso Ore, & Naribus, aerem intrò compri-  
mere conetur; indè sanies in Meatum Audi-  
torium ità copiosè solet eodem actu pro-  
trudi; ut ad istiusmodi Ulceris deterfionem  
nullum promptius, aut utilius Ægris reme-  
dium commendare consueverim; quàm me-  
dio-

*Per hæc quoque Fo-  
ramina illud habetur,  
quòd in Vulneribus  
Capitis penetranti-  
bus, animà vi com-  
pressa, sanies per  
Vulnus prorumpat.*

*Facile, nec non uti-  
le Remedium ad Ul-  
cerum Tympani de-  
terfionem.*

dioeriter frequentem talis conatus iterationem. Illa ergo, & similia commoda Ægris proveniunt ab illis Foraminibus in præternaturalibus Cerebri expurgationibus, sive expurgatio fiat per Vulnus, sive per Nares, sive per Os, sive per Meatum Auditorium. Sed non pauca alia beneficia eisdem proveniunt à compluribus utilitatibus, quas ex illorum cognitione Medici possunt eruere. Ne longus sim; neque hìc vagabor per omnes, per quos possem, Morbos; sed tantùm ex quibusdam Affectibus Apoplecticis unicum pro Assertionem meam argumentum depromam. Verùm antequàm hoc producam; necesse est, ut moneam, illos Affectus Apoplecticos, in quibus altera medietas Corporis resoluta est, pendere à læsione alterius medietatis Cerebri: hac tamen ratione, ut si medietas Corporis sinistra resoluta sit; adsit læsio in dextro Cerebri Hemisphærio; si verò dextra; in sinistro. Quam non levem sanè notitiam ne quis fortasse dubitet ex merà imaginatione meâ deduci (quod quidem infortunium accidisse videtur illis, qui eandem ante me tetigere; ipsam enim interea negligi, & in ijs Tractatibus, in quibus minimè deberet, perinde, ac si falsa esset, communiter prætermitti, conspicio) hanc mihi compertam per annorum complurium labores, & quàm plurimis Cadaverum sectionibus confirmatam esse, seriò testabor;

ut

*Affectus Apoplectici, in quibus dextra medietas Corporis resoluta est, ij reverà causam habent in sinistro Cerebri Hemisphærio; in quibus verò sinistra resoluta est, ij causam habent in dextro.*

ut probè noverunt nonnulli Docti, Gravesque Viri, nominatim D. Petrus Molinellus Philosophiæ, & Medicinæ Doctor, & D. Hippolytus Franciscus Albertinus in Bononienſi Univerſitate Medicinæ Profeſſor, qui nempe pro noſtrâ interiori Amicitia talibus ſectionibus adfuere. Nec verò ſolùm hic loquor de illis Hemiplexiis, quæ à Capitis Vulnere proveniunt; ſed in univerſum aſſero, me nullam fermè vidiffè in Apoplecticiſ Affectibus alterius medietatis Corporis reſolutionem, cujus cauſam, ſectò Cadavere, in oppoſitâ Cerebri parte non invenerim\*. Quòd ſi aliquandò ad alteram etiam Cerebri partem extenſam reperi læſionem; hæc tamen erat in oppoſitâ parte multò norabilior. Quam rem adeò manifeſtè, adeò frequenter, ità ſe habere, obſervavi; ut in uno, vel altero caſu, in quo ( ne diſſimulem ) æqualis læſio in utroque Hemiphærio mihi apparuit; parum abſit, quin ſinè ullâ dubitatione cenſeam, læſionem in oppoſito Hemiphærio, ut ut inſenſibiliter, reverà tamen fuiſſe majorem; Aliàs enim & mihi, & aliis Obſervatoribus notum eſt, aliquandò ipſius repentinæ mortis cauſam, licet certè adfuerit, nullam tamen in Cadaveribus ſenſibiliter apparuiſſe, imò ( ut in ipſo Genere Nervolo dem proprium quoddam exemplum ) cùm Nervi Cordis ad jugulum Canis ſilo acutè conſtricti, & illi-

\* Intellige tamen de illis Reſolutionibus, quarum cauſa ſenſibilis eſt, & in organi- cā læſione conſiſtit.

Canis, cui Nervi Cordis tantummodò ſtringantur ſilo; &

illicò soluti, adeò in structurâ insensibili labefactentur; ut Canis intrâ aliquot dies, eodem modo, ac si Nervi illi amputati essent, indè moriatur; licet ijdem rursus inspecti, in se nullum sensibilis læsionis vestigium ostendant; Quidni in casibus indicatis suspicer, oppositum Cerebri Hemisphærium, quamvis apparenter non pejùs altero affectum; tamen aut à Fibris Duræ Matris vehementer convulsis peculiariter compressum, aut simili aliâ, etiam ignotâ, adhuc causâ malè præ altero fuisse multatum; quando recensitis tot aliarum, & tam luculentarum Observationum, consensus hoc ipsum videtur innuere; imò svadere. Verùm tamen si istud perpetuum esse, omninò non constaret; cùm tamen quàm frequentissimum esse, ex indicatâ Sectionum, mearum longâ serie certum jam sit; quantam id lucem præbere possit Anatomicæ Cerebri, & Nervorum cognitioni; quantam plurium Morborum Capitis Theoriæ; quantam denique Apoplecticarum istiusmodi Resolutionum Curationi, & ipse intelligo, & cæteri sentient. Certè Resolutiones istæ Apoplecticæ (quas tamen fateor curatu esse difficillimas) attentâ hac notitiâ, aptius saltèm tractari à Practicis poterunt. Eâ enim suppositâ, jam firmum aliquod fundamentum habemus determinandi, In quam potissimum Capitis partem decumbere Aëgris conveniat:

Cui-

*Statim solvantur 2 moritur eodem modo, ac si ijdem amputati fuissent; licet illi rursus inspecti, in se nullam sensibilem læsionem ostendant.*

*Juxta communicatam circa tales Apoplecticos Affectus Notitiam Decubitus ratio, Localia, Vena sectio aptius in iisdem præscribi possunt.*

Cuinam Capitis parti Localia congruentius adhiberi possint: Demum utra Iugularis, item de sinistro, dextroque Brachio utrum ad Venæ sectionem eligendum sit; nempe an illud, quod ex latere resolutum est; an verò potius oppositum. Quæ omnia per partes, & cum suis distinctionibus decernenda aliis relinquere me cogit studium brevitatis. Illud tamen obiter innuam: Constare mihi, quòd in similibus Morbis, institutâ Venæ sectione non ex latere Corporis magis resolutum; sed (quemadmodum Observationes meæ indicant) ex opposito, sive illo, quod omninò sanum videbatur; illicò ferè Ægri aliquot levati sunt. Nunc quam utilitatem exhibeant Medicis Nova illa in Tympano inventa Foramina, faciliè explicabo. Cùm enim ex rebus paulò superius indicatis liquere possit, tantò majori cum spe, atque sedulitate posse Medicos congrua Odoramenta similium Ægrorum Naribus admoveere, quantò ab iisdem Naribus ad Cranii Cavitatem transitus per Nova hæc Foramina manifestior est; Nunc ex eisdem rebus, & ex additâ circa tales Affectus Notitiâ, hoc etiam perspicuum est, in talium Ægrorum curatione posse Medicos Odoramenta uni ejusdem Nasi Foramini, sive Cavitati aprius, quàm alteri applicare. Nam quando altera Corporis medietas, utputa dextra, resoluta est, & consequenter sinistro Cerebri

He-

*In talibus Affectibus instituta Venæ sectio ex latere Corporis non resolutum, ferè illi cò profuit.*

*Post Notorum Foraminum istorum notitiam Odoramentorum in Affectibus indicatis efficacia magis elucet.*

*Si medietas Corporis dextra resoluta sit; Odoramenta aprius adhibentur sinistra Nari, quàm dextra; & e contra.*

Hemisphærio per remedia consulere oportet; multò promptiùs, & copiosiùs, ad læsam hanc partem odores transmitti; si quidem Cavitate sinistræ Nasi adhibeantur; per Novorum Foraminum dispositionem patet; siquidem cùm unius lateris Foramina per ejusdem lateris Tubam cum Naso communicent; Tuba autem unius lateris magis obvertatur, atque communicet cum eâ Nasi Cavitate, quæ ex eodem latere est; Quis non videt, expeditius iter ad sinistrum Cerebri Hemisphærium, nempe per sinistra Foramina, esse à sinistrâ ejusdem Nasi Cavitate?

IX. Antequàm Usus, quos in præternaturalibus constitutionibus præstare possunt Nova hæc Tympani Foramina, exponere inciperemus; circa naturalem eorundem Usus conjecturam illam repetebamus; Per ea quoque Humorem istum in Tympani Cavitationem distillare, quo præcaveatur, ne Membrana Tympani supra, quàm par est, exarescat: de qua istiusmodi humectationis utilitate cùm in superiori etiam Capite respectu Membranarum aliarum meminimus; idcirco in eadem neque modò ulterius immorabimur, neque in Capite sequenti, ubi occasione Zonarum limpidi illo Seromadenrium, rursus de ipsâ scribendum foret. Igitur Humor ille, postquàm Membranæ Tympani, aliarumque etiam in Tympano contentarum Partium incolumitati prospexit; ne for-

*Ufus Tuba Eustachiana.*

Descript. Vid.  
Cap. II. Nu. XVI.  
& XVIII.

Delin. Vid.

Tab. III. Fig. III.

&c. Tab. IV. & Tab.

X.

*Observatio Ulceris  
ad Processum Mamil-  
larem, per quod inje-  
cta, statim in OrrisCa-  
vitatem, licet unde-  
quaq; illam, trans-  
mittebantur.*

*Usus substantia glan-  
dulosa Tuba Eusta-  
chiana.*

Descript. Vid.

Cap. II. Nu. XVII.

tè superabundans, eandem Tympani Mem-  
branam nimis laxando, hac ratione ad Sono-  
ros Motus ritè suscipiendos ineptam reddat;  
per Tubam Eustachianam, ad Pharyngem,  
Naresque amandari potest. Quod quidem  
fieri posse, tum ex nonnullis, quæ sparsim  
scripsimus; tum ex illis, quæ de Tubæ latitu-  
dine, & declivi situ suo loco exposuimus, evi-  
dentissimum puto: adeoque mitto prolixiùs  
confirmare per quandam meam in vivo ho-  
mine Observationem, de Nobili scilicet Viro,  
Ulcere ad Processum Mamillarem cum hujus  
Carie laborante; in quod quæ iniiciebantur,  
illicò ad Fauces perveniebant; adeoque à Tym-  
pano, quò per illius Processus sinuositates  
ascendebant, per Tubam certè derivabantur;  
cùm præter expositam, nullius alibi, & præ-  
cipuè in Ore, aperturæ, aut læsionis esset in-  
dicium. Hoc ergo tam utile emissarium,  
Tuba videlicet, ne unquam fortè claudere-  
tur; provisum est per illam glandulosam  
substantiam, quæ in totâ ejus non osceâ par-  
te sub Membranâ conspicua est. Ejus enim  
latera, quæ nempe versùs hanc partem conni-  
vere inveniuntur; ne unquam simul conglu-  
tinentur, facit humor, qui iugiter ab illâ sub-  
stantiâ, non ità exiguâ quantitate, separatur.  
Verùm non solùm hic Usus per Tubæ aper-  
turam Membranæ Tympani exhibetur; sed  
alter etiam longè præstantior, & per quem il-  
lud,

lud, quod polliciti sumus, ulteriùs ostendatur, scilicet Naturam de assignato Membranæ Tympani Usu non parum fuisse sollicitam.

X. Illud enim perspicuum est, quòd Tympani Membrana eò ampliùs, atque faciliùs ab impellentibus Sonoris Motibus in utiles illas commotiones adigetur; quò minùs aer Tympani Cavitatem occupans, impulsæ eidem Membranæ resistet, citiùsque, & promptiùs cedit. Sicuti autem coniicio, fortasse in hoc ipsum Tympani Cavitatem tantâ cum solitudine à Naturâ amplam atque capacem desiderari; ut quando Sinuositatis Mastoideæ spacia ipsi non adduntur; ejus Cavitas, ut in multis Animalibus observavi, consueto amplior sit: sic enim aer quò se contrahat, habendo, faciliùs locum concedit: sicuti, inquam, istud coniicio, ità illud sinè ullâ fermè dubitatione censeo; Tubam Eustachianam impulso à Membranâ Tympani aeri, quâ facilè cedat, viam aperire. Nam illa in Tympano ex adverso ejusdem Membranæ opportunè Orificium explicat suum, idemque præ tubo succedente sanè amplius: quò scilicet aer subire copiosior possit, & compressæ Membranæ expeditiùs cedere. Tanti autem ponderis hic Usus est, quem Membranæ Tympani Tuba præstat; simul tamen cum illo, quem etiam Membranæ Fenestræ Rotundæ

*Usus Principij Tubæ, quatenus tali situ, talique gaudet capacitæ.*

Descript. Vid.  
Cap. II. Num. XVI.

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. III.  
&c.



*Si Tuba Eustachiana claudatur; illicò Auditus amittitur.*

*In hoc ipsum Observatio.*

*Altera in idem Observatio.*

*Ufus Musculi Procerfus Majoris Mallei.*

Descript. Vid.  
Cap. II. Num. V.

dæ probabiliter exhibet, qui sequenti Capite explicabitur; ut si eadem Tuba fortè claudatur, illicò, ut ego comperi, amittatur Auditus. Possem hoc fortè probare per Observationem in Patricio Cæsenate habitam, Poly-po Narium laborante, qui usque ad Uvulam se se extendebat. Quò enim hic Polypus magis in dies crescebat, & consequenter quò magis ad Orificia Tubarum penitus claudenda accedebat; eò magis in dies Auditus Ægro minuebatur sic, ut tandem omninò surdus evaserit. Verùm ut rem adducam ambiguitatibus minùs obnoxiam; quidam plebejus Ulcus gerebat supra Uvulam in sinistrâ parte, quod quidem eam, quam invaserat, partem exeserat, atque abstulerat sic, ut Ulceris cavitas cum extremo sinistræ Tubæ Orificio communicaret. Igitur quoties homo mollem turundam remediis imbutam in Ulceris cavitatem intrudebat; toties illicò sinistrâ Aure evadebat surdus, talisque permanebat toto eo tempore, quo turunda in Ulcere relinquebatur: statim verò, ac amovebat; pristinum Auditum recuperabat: perspicuo argumento, quod referatâ Tubâ, illicò interceptus obtinetur Auditus; oclusâ verò, statim intercipitur, sive tollitur.

XI. Cùm ergo ad audiendum hoc requiratur, ut compresso à Tympani Membranâ aeri expeditam Tuba præbeat viam; idcirco

ne

ne unquam cùm audiendum est; via hæc fortasse minùs aperta permaneret; per Musculum Processus Majoris Mallei, & præsertim per Tubæ Musculum Novum sagax Naturæ Ingenium consuluit. Nam quotiescunque audiendum est; ab adveniente Sonoro Motu, simul cum Membranà Tympani incipit Mallei Manubrium leviter intropelli; Sed hoc leviter intropulso, jam Musculus Processus Majoris Mallei, assiduè tensus inter hoc, & Tubæ Cartilagineum anterius latus, non potest non leviter simul relaxari; adeòque istud Cartilagineum Tubæ latus, quod priùs per longum tendendo, stabilius, & motu difficilius faciebat, incipiet quoque remittere, & faciliùs mobilem reddere. Hac verò Cartilaginei istius lateris relaxatione Novus Tubæ Musculus ad se contrahendum excitatus, non solum ob sublatum quodammodò æquilibrium; verùm etiam ob influxum (ut ego puto; & in similia functionum Musculis fieri solet) secundùm indigentiam, nobis insciis, superadditum, contrahetur, & per contractionem suam indicatum Tubæ latus, quatenus hujus remissio concedit, extrorsum trahere incipiet; & consequenter quotiescunque audiendum erit, statim Tuba incipiet magis aperiri. Porro aere sic egredi statim incipiente, jam Membrana Tympani ab eodem Sonoro Motu faciliùs, atque ampliùs retropulsa, Mallei Manubrium

Delin. Vid.  
Tab. X. Fig. I. &c.

Ufus Musculi Tubæ  
Novi.

Descript. Vid.  
Cap. II. Num.  
XVIII.

Delin. Vid.  
Tab. III. Fig. XII.  
&c. Tab. IV. Litt.  
m, m. Tab. X. Fig. I.  
&c.

nubrium ulteriùs retropellet, hoc Musculum Processus Majoris Mallei magis relaxabit, Musculus verò iste indicatum Cartilagineum Tubæ latus magis remittet; adeòque Novus Tubæ Musculus idem magis extrorsum trahendo, Tubam successivè magis aperiet, & sic tantò majorem aeris quantitatem dimitti, finet, quantò retropulsio Membranæ Tympani successivè major evaserit. Dum verò mirabile hoc machinamentum, cujus partes aprè adeò invicem, promptèque consentiunt, ut extremâ unâ vix tactâ, altera extrema illicò operetur; Dum, inquam, ad hoc, ut aer Membranæ Tympani à Sonoris Motibus impulsæ faciliùs cedat; efficit, ut idem à Tubâ, quam patentiore reddit, faciliùs dimittatur; Ad hoc, ut expeditiùs adhuc, & sinè ullâ remorâ dimittatur; eâdem operâ hoc præstat, ut promptiùs à Nasi Cavitatibus, in quas dimittitur, excipi queat. Siquidem qua contractione Novus Tubæ Musculus indicatum Tubæ latus extrorsum trahendo, Tubam ipsam dilatat; eâdem marginem inferiorem Internorum Nasi Foraminum deorsum ducendo (nam utrumque extremum mobile habet hic Musculus, ut suo loco ostensum est) eâdem, inquam, marginem illum deorsum ducendo, illorum Foraminum, ante ipsum Tubæ Orificium sitorum, ampliorem reddit capacitatem. Et hoc quidem præstat

ma-

magis, aut minùs pro majori, aut minori indigentia; nam cum unâ eâdemque contractione & Tubam, & Foramina indicata dilatet; quando magis contractus, illam magis expandet; & hæc etiam magis dilatabit.

XII. Quantum verò hæc Nasi Foraminum dilatatio ad exquisitè audiendum conferat; quatenus scilicet facit, ut aer ipse, qui ad Finem Tubæ est, impulsui Membranæ Tympani expeditius, & sinè ullâ remorâ cedat; non solum Ratio ostendit, verùm complura alia artificia, quibus in hoc ipsum usa est Natura, imò & communis quædam Observatio confirmabunt. Nam illa omnia fanè eò conspirare, & in id facta esse videntur; ne scilicet aeris à Tubâ exitus impediatur, sed quàm expeditissimus esse possit. Primò enim per extremi Orificii Tubæ constitutionem, prospectum est, ne aer inspiratus, aut expiratus, dum per Nares ante Orificium Tubæ pertransit; illius labrum, in quod primò incurrit, versùs alterum impellendo, ipsum Tubæ Orificium temerè coarctet. Nam illinc contiguus Osseus Processus antè Orificii labrum in inspiratione defendit; hinc verò consultò crassèfacta Tubæ Cartilago suâ firmitudine posterius labrum in expiratione tuetur. Et fanè aeris expirati, aut inspirati transitus multùm poterat, præcipuè in quibusdam casibus, Officii Tubæ nocere, non solum ejus Orificium co-

*Cur antè Orificii labrum  
extremi Tuba Orificii  
sit Processus Pterygoi-  
di contiguus; poste-  
rius verò ex crassèfa-  
cta ejusdem Tuba  
Cartilagine cõstitua-  
tur.*

Descript. Vid.  
Cap. II. Num. XVI.  
& XVII.

*Cur quando levio-  
rem aliquem Sonum  
audire contendimus;  
animam comprimere  
consequerimur.*

arctando, ut modò exponebamus; verùm quoque jam exeuntis de Tubâ aeris ulteriorem cursum interturbando, remorandoque. Et ob hanc præcipuè rationem est, quod cùm aliquem Sonum aut ob distantiam, exilitatemque perceptu difficilem, aut ob quamcunque causam attentè expectatum exquisitè percipere volumus; tunc, ut observatur, respirationem, quoad possumus, intermittere consuetudine didicerimus. Quoniam verò in hoc ipso actu necessarium est, ut subindè respiratio qualiscunque instituatur; ne tunc exspiratus aer alterum de Tubâ exire debentem, adeò incommodè perturbet; Natura, nisi ego multùm fallor, aprissima instrumenta paravit ad Fauces, per quæ in eo actu aer sive exspiratus, sive inspiratus, à Narium viâ, & consequenter à Tubarum Orificiis satis arceatur. Illâ instrumenta sunt Musculorum Paria duo Pharyngostaphylinum, & Salpingostaphylinum, & cum his Uvula; Nam ut aer sive in expiratione, sive in inspiratione Narium viam percurrat; opus est, ut transitum habeat per illud Pharyngis Orificium, quod versùs Nares aperitur: quod si coarctetur; consequenter aer ille minori quantitate Narium viam percurrere potest; At verò illi Musculi, & Uvula, ut alibi etiam scripsimus, ad illud Orificium coarctandum aprissima sunt Instrumenta. Hæc itaque Opinio nostra est, quòd scilicet eo in actu per  
uim

Vim nobis infcisi influentem contracti Musculi Pharyngostaphylini Uvulam extendant, extensamque versùs indicati Orificii medium adducant; maximè cooperantibus Salpingostaphylinis, qui nempe ad hoc præcipuè facti videntur, ut Uvulam versùs medium indicati Orificii simul trahant. Per hoc verò Uvulæ obstaculum coarctato ad Nares, Tubasque aditu, quemadmodum minor exspirati aeris quantitas versùs eam partem transibit; ità minorem Tubarum Officiis perturbationem asferre valebit; maximè cum eodem tempore, quo illuc transit; per idem Uvulæ obstaculum, quasi per productum quendam aggerem, à Tubarum Orificiis avertatur. Quòd verò hoc ipsum obstaculum, & hæc ipsa Orificii istius Pharyngis coarctatio in causâ etiam sit, ne inspiratus in eo actu subindè aer Tubarum Officia adeò interturbet, quisquis facillè, ut puto, deducet; Nam idem obstaculum hoc quoque facit, ut scilicet aer non ampliùs per Narium viam ità liberè, ut solebat, cum Larynge communicet; adeoque ne ampliùs eâ quantitate, qua solebat, per Nares inspiretur. Nec verò hæ, quas modò descripsimus, illorum Musculorum, atque Uvulæ eo in actu contingentes Functiones, meræ imaginationi innituntur. Primò enim indicata eo in actu animam comprimenti consuetudo, quantum respiratus aer Auditui

*Usus, quem interdum ad exquisitè audiendum videtur præstare Uvula simul cū Musculis Pharyngostaphylinis, & Salpingostaphylinis.*

Descript. Vid.  
Cap. II. Num. XIX.  
& XX.

Delin. Vid.  
Tab. IV. Litt. n. n.  
Tab. V. Fig. I. & II.  
Item Tab. VI.

Q

of-

*Usus Musculorum.  
Salpingostaphylinorū  
affidui.*

*Observationes Gra-  
vitatis Auditus ab  
eorundem Musculo-  
rum erosione.*

officere tunc possit, argumento est; adeoque Natura, ut in similibus solet, aliquā ratione, instrumentoque, homines eā in re coadiuvisse, probabiliter credi potest. Deinde Paris Salpingostaphylini assiduum Munus illud est; ut scilicet Uvulæ Basim suo tonico motu sursum versùs posteriora paulò adductam servando, per integrum illius corpus, quasi per quen- dam aggerem, Tubarum Orificia, aliàs exspi- rato aeri nimis obvia, ex parte saltè defen- dat, adeò si Musculi illius Paris abscinde- rentur; illicò (ut ego probabiliter censeo) Au- ditus hebetior fieret; nam de facto in multis, in quibus tales Uvulæ, & vicinarum Partium corrosiones observavi, ut ad illos Musculos lædendos extenderentur; Gravitationem Auditus in utrâque Aure deprehendi, si uterque Musculus esset læsus; aut in alterutrâ tantùm, si alteruter; Non est igitur adeò à Veritatis fun- damento remotum; si statuo, eosdem Muscu- los, ubi opus est, eandem Uvulam paulò magis versùs posteriora sursum adducere, scilicet versùs medium illius Pharyngis Orificii, quod Nares respicit. Demum eo in actu; in quo scilicet respirationem, ut exquisitiùs audiamus, conamur intermittere; utique ad Fauces qui- dam à descriptis non abludentes motus; dum- modò quis probè attendat, percipiuntur. Et sanè Musculorum istorum motus, præ alio- rum Musculorum motibus, qui inter audien- dum

dum contingunt, quosque superiùs explicavimus, majores esse videntur. Nam Orificii Tubæ dilatatio licet multò magis ad audiendum conferat, quàm istius Pharyngis Orificii restrictio; illa tamen per multò minores motus obtinetur: qui (ne quis diversa fortasse credat) nec magni adeò motus sunt; nec porrò esse debuerunt.

XIII. Nunc quando exposuimus, qua ratione, quave facilitate Tympani Membrana à Sonoris Motibus queat intropelli; edisserendæ etiam essent causæ, quibus eadem per vices ad pristinum locum repellatur. Verum inter has ab aliis jam enumerata est distentæ ejusdem Membranz elasticitas, aeris priùs cedentis recursus, & similia: quorum aliquot etiam à nobis, licet obiter, superiùs memorata; imò superaddita sunt; ita ut talibus hìc immorari supervacuum censeam: præstetque ipsos Sonoros Motus, qui adeò facilè à Membranâ Tympani quatuor Ossiculis communicantur, per eorundem Ossiculorum Mechanicum motum usque ad Fenestram Ovaalem jam deductos, ulteriùs per Labyrinthum consecretari.



*Usus Labyrinthi, sive Interioris Auris  
Cavitatis.*

*CAPUT VI. & ULTIMUM.*



Um talia agiro, ecce inter alterna tonitrua, & fulgura, minacibus, atque obscuris undequaque nubibus involvitur dies, & Musæum, in quo hæc meditor, de Cælo tangitur.

Et si verò fulmen, minimè noxium, Meditantis tergum innocenter allambat, studia tamen, & animura; invitum licet, & contententem; non mediocriter perturbar. Ità in qua potissimùm Disquisitionum istarum parte alacrem, & compositam mentem semper optaveram, & optandam esse, intellexeram; in hac supra, quàm in aliis, turbatam, & inquietam, non minùs molestè, quàm incommodè sentio. Et sanè si quæ Pars in totâ Aure occurrit, in cujus Functiones penetrare tum propter rerum singularum abditissimos recessus, & parvitatem; tum propter omnium ad invicem implicitos respectus, & proportionnes difficillimum sit; eam Labyrinthum esse, extra omnem dubitationem positum est. At tamen cùm illius Partium Hîstoria meis laboribus aucta, atque illustrata, eam difficul-

ta-

tatem non tollere quidem; sed tamen aliquatenus imminuere videatur; imprimis verò cum metam suam in hac Cavitate Sonori Motus attingant; aliarumque Cavitatum Usus, quasi in hujus gratiam exposuerimus; invitâ licet materiâ, atque ingenio; in hujus Arcana pergere utcunque contendam: quorum tutam assécutionem sicuti me fermè desperare, non dissimulo; itâ Meliores me per meas Dubitationes ad eandem excitari; & fortassis aptiores reddi posse, confido.

II. Itaque Motus Sonori per impulsam Stapedis Basim aeri, qui in Vestibulo, & reliquo Labyrintho est, communicati, intrâ hunc Impressionem Sonoram, in aptam quidem Partem, facere debent. Aptâ verò Pars, secundum Anatomien nostram, nulla alia in Labyrintho occurrit, præterquàm Membrana in Vestibulo existens, & quatuor Zonæ; tres scilicet Canaliculi Semicircularium, & una Cochleæ. Porro cum Membranæ Vestibuli multiplex, & frequentissima varietas, atque, ut sic dicam, irregularitas, non multum in ipsâ immorandum esse, indicet; reliquum est, ut potissimum in Zonis Sensorium istud quæramus. Igitur an Zona unica, an plures, an omnes; & si omnes; quo ordine, atque ratione hoc nobili munere fungantur, disquirere oportet. Quod quidem, singulas Labyrinthi Partes juxta Motuum Sonorum ductum percurrento, præstare tentabimus.

III.

Descript. Vid.  
Cap. III, Num. XI.

Harum Viarum, si-  
ve Orificiorum  
Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. V.

III. Cùm Sonoris Motibus perOvalem Fe-  
nestram Vestibulum ingredientibus, sex om-  
ninò Viarum occurrant, per quas ulteriùs excur-  
rere possint, hinc scilicet quinque Canaliculorum  
Semicircularium Orificia, illinc verò Orifi-  
cium illius Cochleæ Canalis, quem Vestibuli  
Scalam nuncupamus; quæri primò debet, an  
illi has vias simul omnes subeant; an verò  
tantummodò aliquot. Si non omnes; rursus  
quæri potest, num sit fortè Orificium Scalæ  
Vestibuli, quod subeant; an verò Orificia Ca-  
naliculorum Semicircularium. Et si Orificia isto-  
rum Canaliculorum; demum an omnia Canaliculorum  
horum subeant Orificia, an aliquot tantum,  
quætere superest. Et mihi quidem Motus  
Sonori probabiliter videntur non illas sanè  
omnes Vias ex æquo ingredi, sed potissimum  
aliquot Orificia Canaliculorum subire, & nomina-  
tim Orificium Commune, necnon Canalis  
Minimi Orificium Angustius. Cur verò mi-  
hi sic videatur; hæc ratio est. Priùs nempe  
animadverto, Motus Sonoros, licet in orbem  
propagentur; propagari tamen multò vivi-  
diùs, atque sensibiliùs ad eas partes, quæ lo-  
co illi, unde proveniunt, ex adverso collocan-  
tur; quàm ad eas, quæ à latere, & præcipuè  
quæ à tergo ejusdem disponuntur; Deinde  
illud considero, Naturam non omnes illas  
Vias ex adverso Fenestræ Ovali constituisse;  
sed hinc Scalæ Vestibuli Orificium, illinc ve-  
rò

Usus Orificii Com-  
munis, necnon Orifi-  
cii Angustioris Cana-  
lis Minimi.  
Descript. Vid.  
Cap. III. Num. IV.  
V. VI.  
Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. V.

rò Canalis Minoris Orificium Proprium, necnon Orificium Latius Canalis Minimi ità à Fenestræ lateribus collocasse, ut parum absit, quin à tergo sint; & tantummodò Orificium Commune, necnon Angustius Canalis Minimi Orificium eidem ex adverso posuisse. Quæ cum ità sint; ex Vijs, quas Motus Sonori, in Vestibulum per eam Fenestram ingressi, subire possunt; duæ tantùm videntur esse, quas præcipuè subeant; nempe duo Orificia novissimè indicata: Adeòque & à nobis primò, quasi ipsà Naturâ præcipiente; duæ potissimùm istæ Viæ considerabuntur. Verùm antequàm id facio; cur duobus hisce Orificiis Orificium Proprium Canalis Majoris; cum & istud ferè ex adverso Fenestram Ovalem spectet; cur, inquam, hoc illis duobus non adnumeraverim; rationem edo. Scilicet margo ille quo Orificium hoc eandem Fenestram respicit, ità in aggerem assurgit; ut non dubiè indicet, Orificium istud minimè ad Motus Sonoros potissimùm excipiendos factum esse; cum potius ad eosdem arcendos indicato aggere à Naturâ instruat-  
tur.

Descript. Vid.  
Cap. III. Num. IV.

IV. Igitur Motus Sonori duo illa Orificia subeuntes, per Orificium quidem Angustius Canalis Minimi, Canalem hunc pervadunt; per Orificium verò Commune, Canales Majorem, & Minorem percurrunt. Quod dum faciunt; Zonas in Canalibus contentas, percellunt: unde,

*Canalium Semicircularium, & contentarum Zonarū Usus.*  
Descript. Vid.  
Cap. III. Num. III.  
IV. V. VI. VII. XII.  
&c.  
Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. V.  
VII. VIII. &c. Tab.  
X. &c.

*Cur iidem Canales,  
& Zona inaequali lon-  
gitudine gaudeant.*

de ; cùm ipsæ quidem nil aliud sint, quàm Mollis Auditorii Nervi expansiones, ut suo loco ostensum est , Auditus Sensatio excitatur. Verùm Aliquis hic loci illud interrogabit : Cur Natura unum tantummodò Canalem, unamque tantummodò Zonam, quæ percellatur, hic non posuerit ; sed tres Canales , & tres Zonas collocaverit ? Cui difficili Interrogationi quodammodò satisfieri videbitur ; si talia subijciantur . Observatum est in pluribus Musicis Instrumentis ; in quibus variae chordæ , ut fieri solet , ad varios tonos disponuntur ; si super illis fistulâ, aut certè ipso ore variis tonis successivè increpemus ; licet cujuscunque toni motibus chordæ omnes semper attingantur , & percellantur utcunque , & minùs sensibilibiter ; certam tamen chordam à certo tono longè majorem impressionem suscipere ( ut superpositorum corpusculorum subsultus testantur ) quàm reliquas : & rursus ad alium tonum aliam chordam magis subsultare ; cùm interim chorda illa , quæ à primo tono adeò commovebatur ; ab hoc pariter commoveri inepta sit , sic ut immobilis appareat . Porro quòd chorda hæc ab hoc tono, non verò ab illo agitari apta sit , alia verò non ab isto ; sed ab alio ; à variis variarum chordarum tum quò ad alia , tum quò ad longitudinem, aut latitudinem, conditionibus dependere ; à quibus nempe varia in ipsis chordis

dis dispositio ad se se tardiùs, aut celeriùs vibrandum, & similia proveniunt; Hæc cùm ità sint; jam Aliquem suspicari posse: cùm tam varii Soni à nobis audiri, & distinctè percipi debuerint, per impressiones quidem ab illis in membranulam demum factas; Ut eorum perceptio vividior esset; curasse Naturam, ut singuli non utcunque membranulam attingerent; sed quam possent majorem impressionem in eandem facerent; At sicuti varii toni non possunt omnes facere majorem impressionem in unicam, aut unius conditionis chordam; sed singuli variæ conditionis chordas exposcunt; ità neque varios Sonorum tonos in unicam, simplicemve membranulam potuisse requisitam majorem impressionem facere; Adeoque non unum Canalem, unamque membranulam, sive Zonam; sed plures Canales, & plures Zonas Naturam posuisse; & istas quidem variæ conditionis, scilicet quò ad longitudinem; Nam major una, minor altera, tertia verò minima est.

V. Dum verò hæc ad illam interrogationem fortasse responderi posse, opinor; ne quis obiciat, in tam multiplici Sonorum varietate triplicem tantummodò Zonarum differentiam nimis esse insufficientem; utque illa opinio, qualis ea cunque est, confirmetur; addo aliam consimilem suspensionem, ex illis pariter, quæ de Musicis chordis modò præmissa sunt, quodam-

R

dam-

*Cur omnes earum-  
dem Zonarum partes  
unam Institutionem  
non obtingerint.*

Earū Descript. Vid.  
Cap. III. Num.  
XII.

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig.  
VIII. aut Tab. X.  
Fig. III.

dammodò derivatam ( siquidem ego neque  
has tanquam absolutissimas paritates affero;  
neque illa , quæ circa consimiles res obscuras  
potissimùm excogitantur, omni obiectione ca-  
rere posse, existimo) Itaque cùm in his Zonis non  
solùm longitudinum varietas occurrat, verùm  
quodammodò etiam latitudinum; nam certè ea  
Zonarum pars, quæ Canalem Communem oc-  
cupat, reliquarum Zonarum partium latissima  
est; idcirco suspicari Aliquis potest, an fortè  
Natura hoc quoq; idè fecerit; ut alicui Sono,  
cujus impressioni suscipiendæ minùs aptæ essent  
aliæ Zonarum partes; hæc ob latitudinis varie-  
tatem aliquo modo aptior esset. Sed mitto  
alias hujuscemodi Dubitationes; nam tantum-  
modò adhuc indicansquam dum explico; simul  
ad reliquarum Labyrinthi Partium Usus ex-  
ponendum procedo.

VI. Videntur Zonæ variam ad se se tardiùs,  
aut celeriùs vibrandum aptitudinem habituræ;  
si in suis vibrationibus, scilicet contractis ex So-  
norum impressione motibus conficiendis, ma-  
gis, aut minùs à circumfuso Labyrinthi aere  
impediantur, secundùm illa, quæ in re non dissi-  
mili de Tympani Membrana respectu aeris in  
Tympano contenti, Superiori Capite censeba-  
mus. Porro, attentà etiam Labyrinthi stru-  
cturà; suspicari possumus, juxta varios Sonos va-  
riè ejusdem Labyrinthi aerem Zonarum mo-  
tibus obistere sic, ut pro Sonorum varietate

modò faciliùs; modò minùs facilè ab eisdem Zonis repelli queat. Primò enim advertendum est, quòd sicuti Canaliùm Semicirculariùm Orificia indicata, Commune scilicet, & Minimi Angustius, magis Fenestram Ovalè spectant; ità alià eorundem Orificia, nominatim duo contigua Proprium Canalis Minoris, & Latius Canalis Minimi, Orificium Scalæ Vestibuli respiciunt, ità ut quæ ex istis dimittuntur, facilè hoc Orificium subire possint. Rursus admonendum, Scalam Vestibuli per tenuem Membranam, sive Zonam à Tympani Scalà ità dividi, ut iam suo loco scriptum est: Scalam verò Tympani ab istius Cavitate per Ovalis Fenestræ Membranulam distingui. Et consequenter colligendum primò est, aerem in Canalibus impulsu posse ex facili, per indicata Orificia elabendo, locum cedere; quia taliter constructà Vestibuli Scalà, eisdem Orificiis ex adverso ità posità, locum in promptu habet, quò contiguu succèssivè aerem expedirè, & absque difficultate propellat. Aer enim Scalæ Vestibuli propulso non obstat; cùm ipse propellere illum possit, qui in Tympani Scalà continetur; non quidem per poros, aut certam aliquam communicationem, ut quidam suspicari visus est; sed per ipsius tenuis Zonæ, qua utraq; Scala distinguitur, compressionem. Nam rursus aer iste, qui in Tympani Scalà continetur, compressæ Zonæ facilè

*Ufus Orificii Proprii Canalis Minoris, & Orificii Latioris Canalis Minimi.*

Descript. Vid.  
Cap. III. Num. V. & VI.

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. V.

*Scala Vestibuli Ufus.*

Descript. Vid.  
Cap. III. Num. VIII.

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. VI.

*Zona Corbæa Ufus.*  
Descript. Vid.  
Cap. III. Nu. VIII.  
Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. VII. &c.



*Ufus Scala Tympani.*

Descript. Vid.

Cap. III. Nu. VIII.

Delin. Vid.

Tab. VIII. Fig. VI.

*Membrana Fenestra Rotunda Usus.*

Descript. Vid.

Cap. II. Nu. XIII.

*Tuba Eustachiana, sive Novi illius Musculi Usus.*

Delin. Vid.

Tab. X. Fig. I. & II.

cedit; non dico, in Tympanum per Fenestram Rotundam prorumpendo, ut idem Auctor, hanc Membranâ claudi, non-advertens, credidit; sed istam eandem Membranam quoad opus est (exigui autem spatii opus est) versûs Tympanum urgendo, atque curvando: Quod quidem ex facili præstare potest; Nam cum omnia, quæ intrâ Aurem occasione Sonorum Motuum accidunt, in momento, & ferè simul fiant; sanè quo tempore aeris propulsio à Canalibus usque ad Tympanum continget; eodem dilatata Tuba Eustachiana aerem, qui in Tympano est, adhuc excipiendo, hujus aeris resistantiam imminuet, juxta illa, quæ circa Usus ab eâdem Tubâ Membranæ Tympani exhibitos, præcedenti Capite proponebamus. Quæ omnia cum partim ità se habeant; partim verò ità se posse habere videantur; elucebit demum, Illud nos posse suspicari; Nempe quòd pro varietate Sonorum variè quoque Zonarum moribus Labyrinthi aer obsistat. Siquidem cum pro impulsuum in Membranam Tympani factorum varietate, Eustachianam Tubam variè moveri, citato loco ostenderimus sic, ut modò magis, modò minùs dilatata, nunc majorem locum, nunc minorem aeri à Membranâ Tympani impulso concedat; adeoque pro Sonorum varietate, variè illius aeris resistantiam imminuat; Iam sanè perspicuum est, quòd pro eâdem Sonorum

rum

rum varietate, Fenestræ Rotundæ Membrana modò magis, modò minùs versùs Tympanum per propulsum à Zonis aerem curvari poterit; Et consequenter modò magis, modò minùs eidem cedendo, secundùm Sonorum varietatem hoc poterit efficere, ut modò faciliùs, modò minùs facilè, secundùm eandem Sonorum varietatem, possint Zonæ commoveri; Adeòque ut Zonæ pro variorum Sonorum impressione suscipiendâ utilem istam variam aptitudinem habeant.

VII. Si verò Aliquis fuerit, cui exposita hucusque suspicio arrideat; huic possumus complura addere, quæ eandem confirment. Nam præter illa, quæ de Tubæ Eustachianæ aperturâ, tantâque istius ad audiendum necessitate antecedenti Capite scripsimus; unde aliquod fortasse argumentum in rem hanc trahi posset; Profectò Fenestræ Rotundæ situs non ex adverso, sed à latere Membranz Tympani, ideò videtur à Naturâ assignatus, ne Tympani aer dum à Membranâ hac retropellitur; in illius Fenestræ Membranam rectâ incurrendo, hujus incurvationi incommodè adeò resistat: Quæ rursus Fenestræ Rotundæ Membrana ob eandem facilè causam, neutiquam ad extremum ejusdem Fenestræ marginem, sed paulò interiùs ita, ut per istum à retropulso aere quasi defendatur; posita est. Imò & hæc fuerit fortasse una ex

iis

*Cur Fenestra Rotunda non ex adverso Tympani Membranam respiciat.*

Descript. Vid.  
Cap. II. Num. XIII.

*Cur ejusdem Fenestræ Membrana non ad extremum illius marginem, sed paulò interiùs collocetur.*

Descript. Vid. ibid.

*Cue Motus Sonori  
per quatuor Officula  
à Mentu Auditorio in  
Labyrinthum trans-  
ferri debuerint, ut  
Capite Superiori ex-  
positum est.*

iis causis, propter quas Motibus Sonoris nequaquam concessum fuit, ut in Tympani Cavitate omninò liberè se diffunderent, videlicèt ne ipsi; dum se se versùs Ovale Fenestram, utcumque deferrent, Officia alterius Fenestræ temerè perturbarent: adeòque ope quatuor Ossiculorum quodammodò in unum collecti, absque istius Fenestræ noxâ, ad Labyrinthum transmittuntur. Ad hæc Tuba Eustachiana cur, quælo, non tota ex immobili ossiculorum constructa esset, & extremitate minimè dilatabili; sed contra admirando Musculorum artificio fuisset instructa? nisi dispositum esset, ut pro variis Sonorum occasionibus variè quoque posset aperiri non solum in commodum Membræ Tympani; verùm quoque, nisi ego fallor, ut Membrana Fenestram Rotundam claudens; atque adeò ipsæ Zonæ, advenientibus diversis Sonis, diversam ad se se movendum aptitudinem haberent; Illud sanè novum non est, aut Naturæ penitus ignotum, quòd pro variâ obiecti conditione, varij in Sensuum Organis, nobis inscijs, motus fiant, per quos potissima Sensorij Pars, sive Sensorium propriè dictum variè disponatur. Itaque quemadmodum pro diversis rerum visibilium distantijs, diversè mota Ligamenta Ciliaria efficiunt, ut Retina à Crytallino variè distet; & pro vario earundem lumine, variè mota Iris facit, ut variam respectuè radiorum quan-

*Tuba Eustachiana  
Usus paritate ab Oculorum internis motibus ducta, confirmatur, illustraturque.*

quantitatem eadem Retina excipere valeat ; sic pro Sonorum diversitate , diversè morâ Tubâ Eustachianâ, atque adeò diversâ inductâ in Labyrinthi aere resistentiâ , etiam diversè ; ut nos suspicamur , Zonæ Sonoræ disponuntur .

VIII. Sed quid quid sit de hac suspitione , in qua recensendâ ideò paulò prolixior fui , quia aliquot Partium Usus utcunque indicare ; ad alios verò earundem Usus indicandos viam sternere simul , & unâ operâ volui ; Illud certum est , me tantum illi non deferre , ut credam in hanc unam rem Cochleæ utramque Scalam cum interpositâ Zonâ , necnon Fenestram Rotundam constructas esse . Easdem enim nobiliorem alium vsum præstare , conicio . Itaque , exceptis Motibus Sonoris ità exilibus , ut vix percipiantur ; quos intrâ Canales , aut ad summum intrâ Vestibulum terminari , probabile est ; Sonori Motus universi postquàm Canales Semicirculares percurrerunt ; ab eisdem exire , & ulteriùs in Scalam Vestibuli progredi videntur per eadem Orificia , & eâdem ratione , qua impulsum in ijs Canalibus aerem in eandem Scalam transire , superiùs opinabamur . Motus enim Sonoros intrâ Canales perire , verisimile non est ; cùm illud ; ut cætera mittam ; notum sit : Sonos , dum percurrunt tubos , quales quidem ij Canales sunt , mirificè conservari . Accedit , quòd ij , Canales qua  
par-

*Usus Orificii Proprij Canalis Minoris, & Orificii Lattioris Canalis Minimi .*

Descript. Vid.  
Cap. III. Num. V.  
& VI.

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. V.

*Cur iidem duo Canales antequàm designant in Orificia indicata, ampliores sensim fiant.*

Descript. Vid. Ibidè  
Delin. Vid. Tab.  
VIII. Fig. III.

parte Motus Sonoros emittere debent; dilatantur; Nam Canalis quidem Minor paulò antequàm in Proprio Orificio desinat; sensim ampliatur; Minimus verò usque à sui gyri dimidio solet paulatim dilatari, quousque in Latiori Orificio suo finitur; Quæ porrò conformatio quantum ad Sonoros, etiam debiles, Motus in unum colligendos, & rectè vividiùs mittendos conducatur, à Tubâ Polyphonicâ potest addisci, ità ut Motus Sonoros non solum in Canalibus non perire, verum ab eisdem in oppositum Scalæ Vestibuli Orificium fatis adhuc vivos dimitti, concedendum videatur. Verum priusquàm Motus Sonoros, iam Scalam Vestibuli subeuntes, ulterius prosequar; videre mihi videor Quotcunque Disquisitiones hæc meas non omninò negligenter percurrent, secum agitantes, quid sit, quòd cum superiùs de impulsu in Canalibus aeris exitu agens; tum modò de Motuum Sonororum ab iisdem egressu verba faciens, Proprium Majoris Canalis Orificium; quod porrò utrobique considerare debebam; ne nominaverim quidem; quasi neque Motus Sonori, neque aer ullus, qui cedere deberet, Majorem Canalem percurrerent. Ego verò Canalem Majorem non solum, quæ cæteri præstant eadem præstare, sed insuper aliquid singularis facillè habere, existimo. Si quidem tum ipsius in Communi Canali apertura

tura

tura Ovale Fenestram, unde Motus Sonori  
 proveniunt, multò magis è directo respicit,  
 quàm Canalis Minoris apertura in eodem  
 Communi Canali, aut Canalis Minimi Orifi-  
 cium Angustius sic, ut in Majorem Canalem  
 multò vividiùs, quàm in reliquos, Motus So-  
 nori pertendere videantur; Tum verò Zona  
 ipsius inter Canaliū Semicircularium Zonas  
 longissima est; Tum denique antequàm in  
 Proprio Orificio ipse terminetur; in peculia-  
 rem quandam Orbicularem Cavitatem expan-  
 ditur. Quamvis autem Canalis hic Major  
 ad Orificium Proprium & ipse dilatetur ità,  
 ut Motus Sonoros ab hoc etiam quodam-  
 modò colligi, quasi ulteriùs dimittendi essent,  
 conijcere possimus; tamen cùm Orificium  
 istud Proprium, Scalæ Vestibuli Orificium non  
 ità, ut requiri videretur, respiciat; cùmque  
 Cavitatis illius Orbicularis satis probabiles Usus  
 adhuc me affecutum esse, non credam; idcir-  
 cò satius esse duxi, pauca; imò nulla, circa  
 idem Orificium proponendo, exacta aliorum  
 Judicia expectare, quàm multa scribendo,  
 immatura omninò cogitata Lectoribus inge-  
 rere. Igitur Motus Sonori eà, quam recensui-  
 mus, ratione, Vestibuli Scalam subeuntes,  
 licet non obstante exposito artificio, debilio-  
 res essent; per hujus tamen Scalæ tortuosita-  
 tem, & de lato in angustius tendentiam vivi-  
 diores fieri possunt, sicut jam ab alijs animad-

S

ver-

*Usus Scalæ Vestibu-  
 li.*

Descript. Vid.  
 Cap. III. Nu. VIII.

Delin. Vid.  
 Tab. VIII. Fig. VI.

*Zona Cochleæ Usus.*

Descript. Vid.  
Cap. III. Nu. VIII.  
& XIV.

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig. VII.  
& IX.  
Item Tab. X. Fi-  
gur. III.

*Cur hæc Zona sit  
Zonarum longissima,  
sensimque minùs la-  
ta.*

*Cur Scala Vestibuli  
superficiæ lævitate,  
necnon dimensionum  
& figuræ regularitate  
gaudere soleat; non  
item verò Scala Tym-  
pani.*

Descript. Vid.  
Cap. III. Nu. VIII.

versum est. Porro dum Motus Sonori, Scalam Vestibuli percurrendo, Cochleæ Zonam percellunt; hinc quoque ad Sensationem excitare faciliè poterunt; non quòd ego censeam, impressionem ab aliquâ Canalium Semicircularium Zonâ satis jam susceptam, hinc quoque esse repetendam; sed quia aliquibus Sonoris Motibus, quibus ritè suscipiendis nulla illarum satis idonea fuit, hæc Zonâ, non quidem ob variam contigui aeris resistentiam, huic nempe cum illis communem; sed ob maximam sui longitudinem, sive mavis ob variam, sensimque decreascentem latitudinem; quantum ego suspicor; aprissima est. Suspicio autem hæc mea partim illis, quæ de Canalium Semicircularium Zonis respectu variæ longitudinis, & latitudinis earundem, superiùs proposita sunt; partim verò alteri animadversioni innititur. Nam cur Scala Vestibuli latitudinem, altitudinemque suam; curvè lævem superficiem, necnon Ellypticam cavitatem ità constanter servaret? quare potiùs ad instar Scalæ Tympani illas dimensiones, & superficiæ asperitatem, aut lævitatem variè, & inconstanter non sortiretur, figuramve irregularem non obtineret; si Motus Sonoros adhuc utiles ad sensationem excitandam perducere non deberet; sed potissimùm ad eos demum, non ampliùs utiles, extrorsum amandandos, quemadmodùm Scala Tympani, inserviret?

Ego

Ego enim & ex ijs, quæ hîc illic de Scalâ Tympani habita sunt, & ex eisdem, quas modò proferebam, rationibus, Scalam Tympani illum præcipuè usum Sonoris Motibus præstare, existimo; ut ipsos scilicet jam munere defunctos suo, ad Tympani Cavitatem, Tubamque Eustachianam transmittat. Qua quidem ex re nulla Officiorum Membranæ Tympani perturbatio timenda est, tum ob Partium posituram; tum ob eorundem Motuum & à longo itinere, & à Scalæ Tympani irregulari figurâ, & superficie, & ab obstante Fenestræ Rotundæ Membranâ debilitationem. Aliam adhuc eorundem debilitationis causam ego aliquandò excogitaveram; scilicet cùm primò vidi substantiam illam minùs resistentem, atque friabilem, qua Canalis Cochleæ superficies insternitur; hanc fortassis ad Motus Sonoros infringendos in hac postremâ Labyrinthi parte disponi, suspicabar. Quam tamen substantiam ubi etiam ipsi Scalæ Vestibuli communem esse, animadverti; suspicionem illam deposui, ratus, alium omninò esse illius substantiæ Usus; licet qualis hic demum esse probabiliter possit, non satîs adhuc perspectum habeam.

IX. Igitur ex illis, quæ de Usibus Labyrinthi hucusque edisseruimus, colligitur, tres nostras Canaliculæ Semicircularium Zonas, necnon Zonam Cochleæ Proprium Auditus videri

*Ufus Scala Tympani.*

Descript. Vid.  
Cap. III. Num.  
VIII.

Delin. Vid.  
Tab. VIII. Fig.  
VI.



Sensorium; hac quidem, ut suspicamur, ratione, ut non omnes ab omnibus Sonis impressionem suscipere æquè valeant; sed variis variæ aptiores sint secundum longitudinum, & latitudinum, & quæ sunt similia, diversitatem. Porro cum rem ità se habere, suspicemur; secundum hoc, quicumque ex facili intelligit, quæ causæ Naturam moverint, ut Labyrinthum, ejusque Partes non minori magnitudine in Infante poneret, quàm in Adulto. Si enim Zonarum dimensiones non eedem in utrâque ætate fuissent; certè homo alios Sonos audiret, cum infans est; alios autem, cum adultus; adeoque malè primò assuesceret illis Ideis concipiendis, quas mox dediscere deberet; at pro assuetudine, absque confusione, non posset. Indè verò etiam fuit, quòd Tympani Officula equalem obtineant magnitudinem in Infante, atque in Adulto; nam ut de uno tantummodò loquamur; Basim Stapedis, oportuit magnitudini Ovalis Fenestræ respondere; eandemque perpetuò ab eisdem Sonis impressionem, in Labyrinthum traducere. Quòd si tantam curam Natura adhibuit; ne homo diversas ejusdem Soni Ideas diversis etiam temporibus conciperet; multò adhuc majorem, ut par est, adhibet; ne uno, eodemque tempore diversas, & inter se pugnantes concipiat. Hinc enim est, quòd dextri, & sinistri Labyrinthi, & Partium utriusque, necnon utriusque Tympani

Ol-

*Cur Labyrinthus, ejusque Partes non minori magnitudine in Infante gaudeant, quàm in Adulto.*

De hoc Vid.

Cap. III. Num. XVI.

*Cur pariter Tympani Officula eandem magnitudinem in Infante obtineant, atque in Adulto.*

De hoc Vid.

Cap. II. Num. XII.

*Cur undus Auris, ejusque Partium dimensiones, & figura in compari Aure ità*

Officulorum eadem magnitudines sint, & figuræ; adeòt si quid in unâ Aure aliquod illorum ab ortu peccet, & in compari Aure similiter peccare, inveniamus; quasi Natura Idearum discordiam plùs timeat, quàm pravitatem. Quantâ verò Eadem diligentia usa est, ne in eodem homine variæ essent Sonorum Ideæ; tantâ fermè dixerim, sæpenuerò usâ esse videtur, ut in variis hominibus variæ essent. Quòd enim nihil frequentius sit, quàm reperire homines, quorum uni unus Conventus supra omnes placeat; alteri verò nonidem; sed alius: item quorum unus sagacissimâ, ut sic loquar, Aure vel minimam unius vocis dissonantiam inter quàmplurimas statim cognoscat; alter verò Aure infelicissimâ, quid sit consonantia, & quid dissonantia, ne intelligere quidem valeat: & cætera de genere hoc, quæ apud Musicos, Musicorumque auditores quotidie observantur; Quòd, inquam, hæc adeò frequenter occurrant, pendere videtur à varietate, quam inter Labyrinthos unius hominis, & Labyrinthos alterius modò majorem, modò minorem solet Natura collocare. Ut enim mittamus, Cavitatem illam Orbicularem, ad Majoris Canalis Orificium Proprium observatam, aliquandò desiderari; Orificium verò Canalis Minimi Angustius, interdum non ità angustum reperiri; necnon latitudinem quandoque in illo, quando-

*exallè servantur; ut si quid vitii in unâ Aure ab ortu contrallum sit; & in alterâ inveniat.*

De hoc Vid.  
Cap. III. Num. VII.

*Cur frequentissimè tanta sit inter Auditum unius hominis, & Auditum alterius diversitas.*

Vid. Cap. III. Num. III.

Vid. Cap. III. Num.  
VII. item. Tab. IX.

doque in hoc Canali majorem esse, & similia, quæ suis quæque locis notata sunt; sanè longitudinum Canaliū irregularis in diversis Subiectis diversitas adeò frequens, adeò ex Naturæ consuetudine est; ut nunquam duos homines repererim, in quibus earundem proportionum omninò convenirent; ut alibi quoque enarratum fuit. Quas figurarum, & præcipuè dimensionum varietates etsi frequentissimas istius Audituum diversitatis causas esse, censeamus; illa tamen, ut suspicamur, pendere aliquandò etiam potest à tensione Zonarum; quæ nempe, ut in consimilibus Nerveis Partibus accidere videtur, in variis hominibus varia sit: quæ quidem suspicio nonnullis aliis, quas superiùs à Chordarum, Musicarum observatione circa Usū Zonarum deduximus, ob affinitatem adungi poterit.

X. Iam verò de Aure, ejusque Partibus, & singularum Usu satis fusè à nobis scriptum est: utinam & satis clarè quantum ad Historiam, & satis verisimiliter quantum ad Usus; Ego sanè utrumque conatus sum. Sed quantum ad Usus; multò quidem labor difficilior est Nostrium quocunque Usus Auris tractamus; quàm illorum, qui de Oculi agunt Usibus. Omitto majorem Partium Auris numerum, exiguitatem, implicationem. Hoc solum dico: Quòd tot, tantique Mathematici

co-

corum Labores circa Visionis, & Luminis proprietates, prægressi, multum illis operæ, multum sollicitudinis demunt. Quòd si cum Soni, Auditusque proprietatibus equali observandi diligentia, perspeculandi assiduitate, methodicè scribendi instituto à tot Mathematicis actum esset; plura ego superius, & vero magis proxima, minori cum labore proposuisssem. Quare ut melius sit illis, qui posthac de eisdem Auris Usibus scribere aggredientur; oro, quæloque de Re Philolophicâ adeò benemeritos Mathematicos, ut provinciam illam parum adhuc, respectu Opticæ, & Facultatum cæterarum, quæ circa Visionis, & Luminis proprietates versantur, parum, inquam, adhuc excultam, suscipiant, & suâ illâ inconcussâ methodo adaugeant. Nos interim, ut opus hoc minùsdifficile redderemus; Auris Historiam, quantum res concessit, dilucidè exposuimus; saltèm, sicuti modò indicabamus, dilucidè exponere conati sumus. Et quoniam verba minùs sufficere, intelleximus; ad Delineationes, & Figuras confugimus. Quòd si neque per istas, quæsitam perspicuitatem undequaue obrinuerimus; aliam adhuc videmus rationem, qua obtineamus, Artificialem scilicet Auris Anatomem, per quam præcipuas, quæ in Aure sunt, Partes sub omnium oculos ponamus, iisdem, quas obtinent, figuris, posituris, & con-

xio-

xionibus, & si placet, iisdem etiam magnitudinibus; quanquàm nos Aures naturali majorem multò utiliore futura esse, existimamus. Quæ quidem Artificialis Auris Anatome, tametsi quantum Artificialem Oculi Anatomen ob naturalis arduam, raritatemque, utilitate, & commode vincit; tantum operis difficultate excedat; attamen dummodo otii, peritque Artificis copia nobis sit; nostram Naturalem Anatomen in exemplar proponentes, omnique sedulitate, attentione consilio juvantes, ut in Studioforum usum, cæterorumque se cognoscere cupientium, elaboretur, fortasse olim operam dabimus.

**F I N I S.**



**Figura-**

# Figurarum Explicatio.




**I**Abulas nostras Inspecturo utile erit priùs novisse nonnulla, quæ ad ejus commodum, in illarum delineatione præstitimus. Primò itaque & nos curavimus, ut in quibus Tabulis una tantummodò Auris, aut aliqua unius Auris Pars exhibetur; ea Auris perpetuò Dextra sit, & illæ Partes semper ad eandem Dextram Aures pertineant; ne scilicet Res exhibitæ, si modò ad Dextram; modò verò ad Sinistram Aures spectarent; confusionem inducerent. Deinde ubicunque Cavitatem aliquam, utpura Meatum Auditorium, Canalem Cochleæ, &c. exprimere debuimus; obrulimus delineandam Pictori illam Cavitatem, non utcunque apertam, aut semidetectam; sed à circumpositis omnibus partibus sive ossibus, sive alius generis ita liberatam, ut nihil aliud reliquum esset, quàm ultima ejusdem superficies. Quam Cavitatum hujuscemodi delineandam rationem idè servavimus, quia sublato toto illo osse, quod circa ipsas utplurimum solent relinquere; & quod aut rarè, aut nunquam ad aliquid inservit; toto, inquam, illo osse sublato, veræ illarum Cavitatum figuræ, & dimensiones multò clariùs ostenduntur. Porro in ejusdem perspicuitatis gratiam ubicunque rerum, parvitas in causâ esse poterat, ne satis distinctè, atque absolutè eadem Res possent intelligi; Figuras dedimus, quæ naturalem ipsarum magnitudinem superent: quæ tamen singulæ quæ sint, suo loco indicabitur; ne quis fortè exinde fallatur; additâ insuper aliâ Delineatione ad naturalem magnitudinem. Imò passim in eundem perspicuitatis finem ex illis Subiectis, in quibus magis conspicuæ, atque majores Auris Partes occurrerent, ex illis, inquam, Tabulas nostras delineari, curavimus. Aliàs enim pleræque hæ Partes adeò exiguæ sunt, & implicitæ, ut fortasse hisce omnibus præcautionibus non obstantibus, Aliquibus, & præsertim Tironibus non satis clarè per nostras Figuras expressæ judicari possint; rejectâ in nos illâ culpâ, quæ Partium ipsarum est. Quod tamen non ita dico, quasi ego credam, nihil nos in his Tabulis conficiendis erravisse.

T

vissè.

viffe. Si enim vel Magni Nominis Pictores sæpè in illis delineandis lapsi sunt, quæ quotidie sub oculis, imò sub penicillo habebant, & rebus quidem magnitudinis justæ, utputa cùm alii distortum pedem, alii alimetricum brachium pinxere; cur Pictores meos singulari hoc munere donatos existimem; ut tot res nunquam antea ab ipsis visas, nedum delineatas; & tantæ exiguitatis, quantæ istæ sunt, omnes absque ullo mendo delineare valuerint; maxime cùm sæpè sæpiùs extra Artis suæ præcepta easdem delineare, me jubente, coacti sint. Nam istud quoque scire juvabit; quòd nempe ego, cùm multorum Figuris nimiam Artis Pictoriæ curam nocuisse, cognoverim (incredibile enim est, quantum Perspectivæ leges religiosius servatæ, quantum sola umbrarum certis in locis augendarum præcepta, rerum speciem, & lineamenta illorum præcipuè oculis, qui Artem non calleant, immutare multis in casibus possint) illud in Figurarum mearum delineatione præcipuum habui, ut Pictoria Anatomia; non verò Anatomia Pictoriæ inserviret; opportunè scilicet à strictioribus Pictorum regulis tantùm deflectendo, quantum ad perspicuum Figurarum mearum intellectum sufficere, credidi: Adeò falsum est, quod Aliqui opinantur, nihil aliud ad Anatomicas Figuras rectè conficiendas, quàm excellentem Pictorem requiri, ignorantes, quantum laboris, quantumque diligentia ab Anatomico exoptuletur in præscribendo Pictori, quatenus ab Artis suæ præceptis hic illic recedere debeat; sic tamen, ut hic recessus nullo modo Veritati officiat; sed potius conferat. Nec minoris studij, & patientia est illum & omnium, & singularum Partium reperire, prospectum, secundum quem potius à Pictore delincentur; talem, nempe, ut quæ debent omnia, per unam, vel ad summum duas Figuras in conspectum veniant. Sed de his satis. Ad Figuras ipsas jam descendamus.

TAB. I.







# TABULA I.

## Figura I.

**R**xponit Auriculam cum Glandulâ Novâ Tragi . Quibus additæ sunt Glandula Parotis cum suo Ductu, & Glandula Lymphatica, in istâ multoties à me observata; cùm secunda delineata nondum fuerit (loquor semper in nomine) & primæ, scilicet Parotidis, cum suo Ductu verus circa Auriculam litus à multis non delineetur.

A. A. A. *Helix.*

B. B. B. *Antihelix.*

C. *Antitragus.*

D. *Tragus.*

E. *Lobus Auriculæ.*

F. F. *Cavitas Innominata.*

G. *Scapha.*

H. H. *Concha, quasi in duas, ut videre est, Cavitates distincta, Superiorem nimirum, & Inferiorem.*

I. I. *Parotis Glandula.*

K. *Glandula Tragi.*

L. *Glandula Lymphatica, in Parotide multoties à me observata.*

M. M. *Parotidis Ductus.*

N. *Ductus Orificium hians in Cavitate Oris, cum hujus tunica parte.*

## Figura II.

Demonstrat Auriculæ, atque Meatus Auditorii Cartilagineum cum Incisuris: quæ licet cum suâ Cartilagine ad Meatum Auditorium spectent; attamen, ne harum seorsim ostensarum Figura minùs perspicua esset; item ne frustra fieret Figurarum multiplicatio; hæc simul delineatæ sunt: quibus de causis etiam in sequentibus

Tabulis non pauca, quæ in Descriptione disiuncta sunt, in Delineatione unire debuimus.

- A. A. A. *Cartilago Auriculæ.*
- B. B. *Cartilago Meatus Auditorii.*
- C. C. *Incisura.*
- D. *Acutus Processus Cartilaginis Auriculæ.*
- E. *Portio illa eiusdem Cartilaginis, quæ ad Helicis extremum à reliquâ Auriculæ Cartilagine disiungitur.*

## Figura III.

Demonstrat Musculos Externos Auriculæ tum ab aliis descriptos, tum à nobis additos.

- A. *Musculus Superior.*
- B. B. *Helix anteriora versùs depressa, ut distinctius Musculi Posteriores, & Fibra Transversa conspiciantur.*
- C. C. C. *Musculi Posteriores.*
- D. D. *Fibra Carneæ Transversa à nobis descripta.*
- E. *Musculus Anterior noster.*

## Figura IV.

Exprimit Musculos Internos à nobis inventos.

- A. A. *Cutis secta, ut appareat Musculus subiectus.*
- B. *Musculus Tragi.*
- C. C. *Cutis secta, ut manifestetur Musculus Antitragni; ad quem ex toto ostendendum insuper ipse Antitragnus versùs Concham, Meatumque Auditorium depressus est.*
- D. *Musculus Antitragni.*

TAB. II.





# TABULA II.

**E**xprimit hæc Tabula Auriculam, tali pacto dispositam, ut Nervorum, Arteriarum, & ex parte etiam Venarum ad ipsam spectantium excursus in conspectum simul veniat.

**\*\* Auricula Helice, & Anabellæ versùs Concham aliquantulum depressa.**

**A. Nervus inter primam, & secundam Colli Vertebra exiens, & primò descendens.**

**B. Ejusdem Nervi, sursum postea reflexi, Ramus versùs Auriculam incedens.**

**C. Ramus ad Mandibulam Inferiorem.**

**D. Ramus ad Musculos, qui in Collo sunt, prope originem amputatus.**

**E. Rami C. alter Ramulus ad Parotidem.**

**F. Rami B. alter Ramulus ad eandem Parotidem.**

**G. Rami ejusdem B. Ramus ille, qui per posteriorem Auriculam ascendit.**

**H. Locus, ubi Ramus iste G. cujus usio à quibusdam Practicis ad tollendam Odontalgiam proponitur, certius uretur.**

**I. Ramus B. post Auriculam versùs Capitis superiora procedens.**

**K. Auditorii Nervorum Partis Portio Dura, ibi resecta, ubi à Falloppii Aquaductu egreditur.**

**L. Ejusdem Portionis Ramus subdivisus in Ramulos**

**M. M. M. qui per Faciem sparguntur.**

**N. Alter ejusdem Portionis Ramus, à quo multe Propagines ad Mandibulam Inferiorem mittuntur.**

**o. o. o. Ex eadem Portione Ramulus, qui versùs Capitis superiora tendendo, Meatus Auditorio, necnon Auricula prospicit; per cujus quidem anteriorem partem, licet Figura sita ex parte id regat; excurret. Nec mihi adhuc licuit ullum sensibilem Ramum ex Durâ Portione à tergo Auriculæ excurrentem videre, ut neque Rami illius, qui per Faciem diffunditur, vulgatam illam in formam Anserini Pedis, expansionem. Quod Veritatis amore inculco; & ne quis fortè Tabulam banc oscitanter delineatam suspiceretur.**

**P. Truncus Venæ Iugularis Externa, in quem Auricula remittit sanguinem per duos Ramos Venosos p. p.**

Q. Ra-

- Q. Ramus Arteria Carotidis Externus, qui Ramulo r. line amputato, ad Parotides misso, Ramulum s. pariter ad evitandam confusionem resectum, per Auriculæ posteriora diffundit; Ramulos verò t. t. per ejusdem anteriora; deinde ulterius procedens, insignem Ramum u. ad Capitis superiora mittit.

## TABULA III.

### Figura I.

**E**xhibet Auriculam, simul cum Meatu Auditorio, à parte posteriori; utrumque tamen versùs Faciem aliquantùm inclinatum; ut tota ejusdem Meatus à nobis descripta Tortuositas in conspectum veniat.

A. A. *Auricula.*

B. B. *Meatus Auditorius.*

E. *Auditorii Meatus Extremum.*


### Figura II.

Exprimit Glandulas Meatus Auditorii cum suo Corpore Reticulari ab eodem Meatu separatas, & extensas: quas quidem intrà Areas naturalibus ampliores, consultò (ut nempe distinctiores essent) delineavimus.


### Figura III.

Demonstrat cum Auriculâ, Meatu Auditorio, hujusque Glandulis, Membranam Tympani, & Chordam, Incudem, & Malleum, Tubamque Eustachianam, omnia ità simul unita; ut vera singulorum cum aliis connexio, item positura exactè percipiatur. Quæ omnia conspiciuntur à parte posteriori, & quidem versùs eandem

TAB. III.



Fig<sup>a</sup> II.




Fig<sup>a</sup> IV.



Fig<sup>a</sup> VIII



Fig<sup>a</sup> VIII.



Fig<sup>a</sup> VI.



Fig<sup>a</sup> VII.



Fig<sup>a</sup> X.




Fig<sup>a</sup> XI.



Fig<sup>a</sup> XII.



Fig<sup>a</sup> XIII.







dem partem aliquantum inclinata; ut nempe duo indicata Officula melius sub oculos cadant.

Quenam in hac Figurâ sit Auricula, & quinam Meatus Auditorius, præmissâ Figurâ I. Explicatio sat docet in tantum, ut videri possemus Lectorum patientiâ abuti; si Litteras hîc, & Explicationem in idem adderemus. Quam ob causam in sequentium quoque Tabularum Figuris ut plurimum illa Characteribus designare mittemus, quæ per præcedentium Figurarum Litteras, & Explicationem satis nota esse, existimabimus: inaximè ubi res minimæ fuerint; quæ nempe per additos Characteres confunduntur, aut obteguntur potius; quàm indicentur.

- A. *Glandula Meatus Auditorii cum Corpore suo Reticulari, quas Figurâ II. extra sicut ostenderamus, in naturali sua delineata.*
- B. *Incus.*
- C. *Malleus.*
- D. *Portio Ossea ex pariete Sinuositatis Mastoidea; illa nempe, cui alligatur Processus Brevior Incudis; idè relicta, ut quæ de ejusdem Incudis Hypomochlio Cap. II. & V. habuimus; eò facilius intelligantur.*
- E. *Chorda Tympani.*
- F. *Membrana Tympani, à Malleo introrsum elevata.*
- G. *Tuba Eustachiana, sive potius ejus Cavitas.*
- H. *Tubæ Principium.*
- I. *Ejusdem Finis.*

## Figura IV.

Demonstrat Malleum, ejusque Processus, naturali magnitudine majores.

- A. *Caput Mallei secundum illam partem, per quam cum Incude articulatur.*
- B. *Manubrium.*
- C. *Caput Mallei secundum partem oppositam.*
- D. *Processus Minor.*
- E. *Processus Minimus.*
- F. *Processus Major: ex quibus Processibus constituitur Manubrium.*

Fi.

## Figura V.

Repræsentat Malleum, ejusque Múculos, omnes naturali magnitudine majores.

G. *Malleus.*

H. *Musculus Processus Minoris.*

I. *Musculus Processus Minimi.*

K. *Musculus Processus Majoris.*

## Figura VI.

Incudem, & Os Orbiculare dictum repræsentat, naturali magnitudine majora.

L. *Corporis Incudis ea pars, qua articulatur cum Mallo.*

M. *Processus Longior Incudis.*

N. *Os Orbiculare, quod unitur extremitati ejusdem Longioris Processus.*

O. *Processus Brevior Incudis.*

## Figura VII.

Exhibet Malleum, Incudem, & Os Orbiculare, omnia simul, ut naturaliter sunt, connexa; sed naturalibus majora.

P. *Incus.*

Q. *Malleus.*

R. *Os Orbiculare.*

## Figura VIII.

Demonstrat Stapedem, & Os Orbiculare, item ejusdem Stapedis Basim,

Basim, visam secundum faciem internam, & externam, omnia naturalibus majora.

S. *Stapes.*

T. *Stapedis Capitulum, cujus parva cavitati Os Orbiculare superpositum est.*

V. *Basis Stapedis secundum faciem internam, sive Vestibulum respicientem, quæ gibba est.*

X. *Eadem Basis secundum faciem externam, sive Stapedis Crura spectantem, quæ concava est. Illud verò advertatur, velim: me scilicet in hac Basi delineandâ consultò à vulgatis ejusdem Delineationibus recessisse; cum ipsa reverà non sit exactè elliptica, ut delineari solet; sed tantum ad ellipticam figuram accedat; atque insuper ex unâ parte ejus margo leviter deficiat.*

## Figura VIII.

Exprimit Stapedem, & Membranam, per quam ejus Basis circumalligatur Fenestræ Ovali; naturalem magnitudinem pariter excedentes.

## Figura X.

Exhibet Stapedem cum Osse Orbiculari, in suo situ collocatos item ipsius Stapedis Musculum, omnia naturalem magnitudinem superantia.

A. *Stapes cum Osse Orbiculari, in suo situ collocato.*

B. *Musculus Stapedis.*

## Figura XI.

Repræsentat omnia Officula ad invicem, ut naturaliter sunt, unita; naturalibus tamen majora. Curavimus autem tum in hac; tum in præcedentibus, quæ ad ista Officula pertinent, septem Figuris,

V

ut

ut naturalis magnitudo excederetur ad hoc, ut distinctiora essent omnia. Cæterum qui Ossiculorum omnium naturalem magnitudinem, & naturalem respectu totius Auris situm videre cupit; is Tabulam X. adeat.

C. *Incus.*

D. *Malleus.*

F. *Stapes; inter quem, & Incudem Os Orbiculare conspicitur.*

## Figura XII.

Repræsentat Novum Musculum Tubæ Eustachianæ:

H. *Pars Carneæ Musculi.*

I. I. *Pars Tendineæ ejusdem.*

## Figura XIII.

Exponit Cartilaginem Tubæ Eustachianæ, inversam.

L. I. *Pars Cartilaginis, quæ latus Tuba anterioris pro minori tantum parte componit.*

K. K. *Pars Cartilaginis, quæ latus Tuba posterioris pro majori parte componit.*

## Figura XIV.

Repræsentat Tubam Eustachianam, à parte posteriori visam, unâ cum omnibus ejus Partibus in situ, atque Canali Osseo, per quem Musculus Processus Majoris Mallei excurrit.

A. *Principium Tuba.*

B. *Canalis Osseus Musculi Processus Majoris Mallei, apertus.*

C. *Pars Ossea Tuba.*

D. D. *Pars Cartilaginea.*

E. c.





- E. e. *Pars Membranacea.*  
 F. F. *Musculus Tubæ Novus.*  
 G. *Finis Tubæ.*

## TABULA IV.

**E**xprimit hæc Tabula faciem anteriorem Basis Calvariæ, parte anteriori elevatæ ad hoc, ut Tubæ Eustachianæ, & Novi eandem Musculi, necnon Musculi Salpingostaphylini, item Meatum Auditoriorum Incisuræ, horumque omnium situs magis in conspectum veniant. Idcirco enim hanc Tabulam concinnavi, ut nempe hæc omnia in eo, quem respectu Calvariæ Partium obtinent, situ conspicerentur; tum ut Nova pro Venis Occipitalibus Foramina indicarentur. Curavi tamen, ut cætera omnia, quæ in hac Tabula conspiciuntur, in specie Foraminum omniū sitis, clarissimè, & exactissimè delinearentur; maxime cum vulgatas istiusmodi Calvariæ Basis Figuras alias confusas; alias mancas; alias etiam ex parte falsas animadverterim.

- A. A. *Os Occipitis.*  
 B. B. *Sutura Lambdoides.*  
 C. C. *Processus Mamillares.*  
 c. c. c. *Sutura Offium Temporum cum Osse Occipitis.*  
 D. *Foramen Maximum Occipitis, per quod Spinalis Medulla, & Vertebrales Arteriæ transeunt.*  
 d. d. *Nova Foramina, pro ingressu nostrarum Venarum Occipitalium intrâ Cranium: quæ quidem non minùs, ac nonnulla alia Foramina, quæ in hac Tabulâ ostenduntur, aliàs majora; aliàs etiam minora observantur.*  
 E. E. *Offis Occipitis Processus duo, per quos illius articulatio cum primâ Vertebra Colli obtinetur.*  
 e. e. *Foramina, quæ permittunt egressum Venis Vertebralibus è Jugularium Diverticulo.*  
 F. F. *Auriculæ.*  
 f. f. f. *Auditoriorum Meatum Cartilagine cum suis Incisuris.*  
 G. G. *Processus Spiliformes.*  
 g. g. *Foramina extremum Aquaductum Fallopii constituentia, per*



Portio Dura Auditorii Nervorum Paris utrinque egreditur.

H. H. Foramina, per quæ à suis Specubus exeunt Iugulares Vena.

b. b. Foramina pro egressu Nervorum Nonæ Coniugationis.

I. I. Foramina pro ingressu Arteriarum Carotidum.

i. i. Membrana interiora Narium vestiens, inde versus Pharyngem producta, in suo situ relicta.

K. K. K. K. Tuba Eustachiana, quarum duæ K. K. versus Processus Styloides, indicant earundem Partem Osseam; duæ verò alia K. K. reliquam earundem partem designant.

L. L. Extrema Tubarum Orificia, sive Fines, quorum dextrum à Musculo Salpingosaphylino, eidem Orificio naturaliter subiecto; est bîc ratione situs delineatæ Calvaria superposito; non minùs, quàm ipsa Tuba, & Musculus Tuba Novus, ex parte obvelatur.

l. l. Processuum Pterygoidum Ala Interna, per quarum inferiorem partem suos tendines transmittunt Novi Tubarum Musculi.

M. M. Processuum Pterygoidum Ala Externa.

m. m. Novi Tubarum Musculi; quorum tendines excurrunt per partem inferiorem Alarum l. l. & deinde, rursus explicati, circa inferiorem marginem Internorum Nasi Foraminum, in istorum Membranam desinunt.

n. n. Musculi Salpingosaphylini, quorum dexter in situ naturali relictus; sinister verò à socio amputatus, & à situ diductus est; ut distinctius subiectæ Tubæ progressus, & Finis, item Musculi Tuba Novi in eandem insertio ex toto manifestetur.

O. Situs, in quo indicatus sinister Musculus fuit à socio resectus.

o. o. Foramina pro ingressu Arteriarum Dura Matris.

P. P. Foramina, per quæ Nervorum Quinti Paris Majores Ramus egrediuntur.

p. p. p. p. Sutura Ossium Temporum cum Osse Sphenoidæ.

Q. Q. Foramina Nasi Interna.

q. q. Sutura Processuum Ossium Temporalium cum Primo Pari Ossium Mandibula Superioris: ex quibus duobus ita per Sutam unitis Os Iugale constituitur.

r. r. Sutura Primi Paris Ossium Mandibula Superioris cum Tertio Pari Ossium ejusdem Mandibula.



s. s. Foramina pro excursu Vasorum Sanguineorum ad Palatum.

t. Tertium Par Ossium Mandibula Superioris.

Tertium Par Ossium Mandibula Superioris fornicem Palati cum præterente confluentis,

n. n.

TAB.V.





u. u. u. u. u. u. u. u. u. u. Dentes Molares.

✕. ✕. Dentes Canini.

3. 3. 3. 3. Dentes Incisores.

2. Foramen pro transitu humoris, qui à Narium Cavitatibus ad Palatum per duos parvos Ductus transmittitur.

## TABULA V.

### Figura I.

**E**xprimit Uvulam, secundum partem anteriorem, cum suis Musculis, juxta Novam Descriptionem nostram delineatis. Quæ omnia non ideò absque reliquo Pharynge in hac Figurâ exhibemus, quia reverà Uvulam à Pharynge separandam esse, credamus, sed ne res sinè ullâ necessitate multiplicentur; cum nempe eadem, quæ in hac Figurâ omittuntur, debeant in sequenti delineari.

A. Uvula.

B. B. Musculi Salpingostaphylini.

C. C. Musculi Glossostaphylini.

D. D. Musculi Pharyngostaphylini.

e. e. Tonsillæ: quas porro adiunximus tum ut rerum cæterarum situs ed facilius, & exactius intelligeretur; tum quia reverà Tonsillæ possunt accipi pro partibus, aut saltem pro appendicibus ipsius Pharyngis.

### Figura II.

Exprimit Pharyngem, secundum partem anteriorem, cum suis omnibus juxta Descriptionem nostram, Orificiis, & Musculis; exceptis Musculis Glossostaphylinis, in superiori Figurâ ad Litt. C. C. sufficienter delineatis; in hac verò omisissis, ne progressum Pharyngostaphylinorum obvelarent.

- F. F. Musculi Salpingostaphylini.  
 G. Uvula suâ Membranâ, necnon parte glandulosâ denudata, ut appareant fibra musculares in eandem se inferentes. Eandem verò Uvulam sursum aliquantum traximus, ut Orificium Pharyngis ad Nares aliquatenus in conspectum veniret.  
 H. H. Musculi Pharyngostaphylini, sive majoris Staphylopharyngæi: à quorum dextro Membrana investiens sublata est, ut fibrarum ejus \*\* integer progressus manifestetur.  
 I. I. Musculi Glossopharyngæi: quorum progressus ut ex toto appareret; partem superiorem Membrana Pharyngis abjulimus.  
 K. K. Orificium Pharyngis ad Nares.  
 L. L. Musculi Stylopharyngæi.  
 M. M. M. M. Musculi Hyopharyngæi.  
 N. N. N. N. n. n. Musculi Thyropharyngæi.  
 O. O. Musculus Cricopharyngæus.  
 P. Oesophagi principium.  
 Q. Q. Orificium Pharyngis ad Os: quod tametsi Orificiorum Pharyngis maximum est; multum tamen hic majus apparet, quam reverâ sit; & hoc propter ablatum Laryngem; qui nempe à Musculo Cricopharyngæo usque ad Musculum Hyopharyngæum extenditur.  
 r. r. r. r. r. r. Glandula, hic illic in Pharyngis Cavitate conspicua.  
 S. Orificium Pharyngis ad Oesophagum.


## TABULA VI.

**E**xponit Pharyngem, & omnes ejusdem Musculos secundum partem posteriorem, omnia juxta Novam Descriptionem notitram delineata.

- A. A. Musculi Salpingostaphylini.  
 B. B. Musculi Glossopharyngæi.  
 C. C. Musculi Glossostaphylini.  
 \* Uvula suâ Membranâ, necnon parte glandulosâ denudata; eademque sursum aliquantum retracta, ut Orificium ad Nares conspiciatur.  
 D. Orificium Pharyngis ad Nares.  
 Musculi Pharyngostaphylini.

E. E.

TAB. VI.





TAB. VII.

FIG. II.




FIG. I.




FIG. V.




FIG. III.





FIG. IV.







- E. E. *Stylopharyngæi*.  
 F. F. F. F. *Hyopharyngæi*.  
 G. G. G. G. g. *Thyropharyngæi*.  
 H. H. *Cricopharyngæus*.  
 3. 3. *Linea tendinosa, quam concurrentes Musculi Glossopharyngæi, Hyopharyngæi, Thyropharyngæi componunt.*  
 I. *Oesophagus*.

## TABULA VII.

### Figura I.

- A. A. **A** *rtērie Carotidis illa portio, quæ per Canalem Ossium ad Cerebrum scandit.*  
 B. *Ramus, qui ab eadem Arteriâ prope Osse Canalis principium discedit, & Tympano prospicit.*

### Figura II.

Demonstrat portionem inferiorem Sinus Lateralis dextri Duræ Mæris, à parte posteriore inspecti, necnon illud, ut Villisius vocat, Diverticulum, quod inter Sinus finem, & Venæ Iugularis principium interponitur, unâ cum Venâ Occipitali, Venâque Tympani: quarum duarum in Sinum, & Diverticulum ingressus ut quò loci fiat distinctiùs percipiatur; tum ne Figura manca sit; alia Vasa magis nota in Sinum, & Diverticulum pariter ingreditia addita sunt.

- A. A. *Portio inferior indicati Sinus.*  
 B. *Locus, ubi portio hac inferior à superiori resecta est. Cavitas Sinus istius, quæ per sectionem conspicitur, figuram (ne quis miretur diversam à figurâ vulgatâ exhibemus; quia reverà Cavitas huius non undequaque equaliter curva est; sed qua parte Cerebrum ressi compressa, & quasi complanata; licet soleat tanquam exactè cili*

lineari. Eadem de causâ etiam Cavitatem duorum sequentium Sinuum simili figurâ delineamus: imò figuram quoque indicati Diverticuli non parum à communioribus ejusdem Figuris discrepantem; ac cum Naturâ magis congruentem exhibemus.

- C. Sinus Sella Equina Adiacens Superior.
- D. Sinus Sella Equina Adiacens Inferior.
- E. Vena Periebralis.
- F. Vena Occipitalis à nobis descripta: cujus Rami f. f. à posterioribus Auricula proveniunt; ceteri verd, scilicet
- G. G. Rami sunt, qui ad eandem mittuntur à partibus Occipitis.
- H. Diverticulum illud indicatum; quod nempe inter Sinus Lateralis finem, & Iugularis principium interponitur.
- I. Principium Vena Iugularis.
- K. Vena Tympani.

## Figura III.

Exhibet totum progressum Duræ Portionis Auditorii Nervorum. Paris, dum intrâ Canalem Communem, & Particularem excurret cum Surculis, quos eadem, intrâ Cranii, necnon intrâ Tympani Cavitatem distribuit, item Chordæ Tympani, sive potius Ramuli, qui ipsam constituit, progressum, & parvum Surculum.

- a. Portio Dura intrâ Canalem Communem contenta.
- b. b. b. Eadem Portio à Canali Communi in Canalis Particularis alteram Partem, & ab hac in Cranii Cavitatem perveniens, intrâ quam per Duram Meningeum, necnon per Quinti Paris Truncum Surculos spargit.
- c. Ramulus, qui Tympani Chordam constituit.
- 2. Ejus Propago in Minimi Processus Mallei Musculum. sive tractus, qui comprehenditur inter duas lineas, à quibus (in d. includitur) Ejusdem Ramuli illa pars, quæ Chordæ Tympani est.
- 3. E totus reliquus tractus) Ejusdem Ramuli illa pars, quæ per eam Canaliculum ad Duram Portionem transit, cuius qua uni-

f. Al-

- f. *Alter Nervus Ramulus, qui à Quinto Pari transmittitur, ut loquuntur, ad Dura Portionem, cum qua eodem loco, ac precedens Ramulus, unitur.*  
 g. *Portio Dura intra Canalis Particularis alteram Partem inclusa.*  
 h. *Dura ejusdem Surculi ad Sinuositatem Mollisideam.*  
 i. *Surculus alius ad Musculum Stapedis.*  
 k. *Portio Dura ad finem Particularis Canalis reflecta. Porro totum id, quod reflectum est, jam in Tabulâ II. exhibuimus.*

## Figura IV.

Exponit Canales Offeos, per quos Nervi Auditorii excurrunt.

- A. *Canalis Communis.*  
 B. *Dux ex Sinuositatibus, qua ad ejus finem occurrunt.*  
 C. *Canalis Particularis.*  
 D. *Foramen, per quod una istius Canalis Pars in Cranii Cavitate aperitur.*  
 E. *Foramen, per quod altera istius Canalis Pars biat inter Mamillarem, & Styliformem Processum: quod Tabulâ IV. designatur per Literam g.*

## Figura V.

Exponit eosdem Canales Nervorum Auditoriorum simul cum pluribus Auris Partibus, præcipuè verò cum Tuba Eustachianâ, &c. ad hoc, ut eorundem situs respectu earum Partium in Aure appareat, necnon ut cuicumque constare possit, aliud esse Aquæductum Fallopii, aliud Tubam Eustachianam; cum aliàs à multis, saltè nomine, hæc duo confundantur.

- A. *Aquæductus Fallopii, sive Canalis Particularis.*  
 B. *Canalis Communis.*  
 C. *Tuba Eustachiana.*

## TABULA VIII.

## Figura I.

**E**xhibet Canales Semicirculares qua parte Cerebrum spectant. Quos quidem majoris perspicuitatis gratiâ itâ delineavimus, ut naturalem magnitudinem aliquoties excedant. Quod idem servavimus etiam in omnibus; si III. & XI. excipias; hujusce Tabulæ Figuris; cum ad rerum naturalem magnitudinem concipiendam aliâs sufficienter inservire possit Tabula X.

- a. *Canalis Maior.*
- b. *Canalis Minor.*
- c. *Canalis Communis.*
- d. *Canalis Minimus.*
- 1. *Orificium Proprium Canalis Majoris.*
- 2. *Orificium Proprium Canalis Minoris.*
- 3. *Orificium Commune.*
- 4. *Orificium Angustius Canalis Minimi.*
- 5. *Orificium ejusdem Latius.*

## Figura II.

Exprimit integram Labyrinthi Cavitatem qua parte Cerebrum spectat.

- e. *Canales Semicirculares: qui cum sint in hac Figurâ in iisdem sitibus, ac in precedenti; singuli absque repetitis hic Litteris, per Litteras in eâdem precedenti Figurâ appositas distinguere dignosci poterunt.*
- f. *Vestibulum.*
- g. *Foramina in fornice Vestibuli pro ingressu Nervorum, non tria; ut ab aliis dicitur; sed quinque.*
- h. *Canalis, cujus apex videri debet descendere, sive retrocedere: id enim*

TAB. VIII.

FIG. I.



FIG. II.



FIG. III.



FIG. IV.



FIG. V.



FIG. VI.



FIG. VII.



FIG. VIII.




FIG. IX.



FIG. X.



FIG. XI.



1117

1117

1117

enim per Operarum errorem, sive potius propter operis difficultatem non satis expressum est.

## Figura III.

Exhibet Canales Semicirculares, non in suum naturalem semicirculum curvatos; sed in longum evolutos. Hanc enim Figuram excogitavi, tum ut singulorum Orificiorum figuræ distinctius percipi, tum ut singulorum Canaliū naturales magnitudines exactius concipi queant. Ne verò Aliquis cum in Tabulâ X. Canales ad naturalem magnitudinem pariter expressos, sed minores apparentes inspexerit; illicò fidem aut istius Figuræ, aut illius Tabulæ in dubium trahat; cogitet, velim, aliam speciem esse ejusdem rei curvaturæ, aliam evolutæ: item Canales figuræ Ellipticæ; quales quidem Canales Semicirculares sunt: ab unâ parte inspectos, unam latitudinem; ab aliâ verò, aliam ostendere, animadvertat.

- i. Orificium Proprium Canalis Minoris.
- k. Orificium Proprium Canalis Majoris: in quod antequàm desinat ipse Canalis, in Orbicularem Cavitatem laxatur.
- l. Orificium Commune.
- m. Orificium Latus Canalis Minimi.
- n. Orificium ejusdem Angustius.

## Figura IV.

Demonstrat torum Labyrinthum pariter, ac in Figurâ II. ostensus est; inversum tamen; ut secundum alteram partem, qua nempe Tympani Cavitatem spectat, conspiciatur; adeòque Fenestra Ovalis, & Rotunda possint videri.

- 1. Canalis Major.
- 2. Canalis Minor.
- 3. Canalis Minimus.



- q. *Canalis Cochleæ; cujus apex videri debet assurgere, sive extare (Vid. Tab. X. Fig. I.)*  
 o. *Fenestra Ovalis.*  
 p. *Fenestra Rotunda.*

## Figura V.

Demonstrat Labyrinthum quæ Cerebrum spectat, pariter, ac in Figurâ II. ostensus est; ita tamen præparatum per ablationem partis superioris Vestibuli; ut ipsius Vestibuli Cavitas, & in hac Orificia Canaliū, Fenestræ Ovalis, necnon Scalæ Vestibuli, omnia in proprio situ manifestentur.

*Orificia Canaliū non indico, cum hæc sufficienter dignosci, & distingui possint ex Figurâ I.*

- q. *Fenestra Ovalis, quæ in Fundo Vestibuli aperta observatur.*  
 r. *Orificium Scalæ Vestibuli.*

## Figura VI.

Duas Cochleæ Scalas cum ipsarum progressu, atque Orificijs demonstrat. Deberent autem & Sclarum istarum apices non in eodem cum principiis Sclarum plano videri; similiter nempe, ac de integro Cochleæ Canali notatum est paulò supra in Explicationibus Figuræ II. & IV. Quale quid (ne hoc amplius repetamus) in Figurâ VII. & aliquâ parte Figurarum VIII. & IX. hujus Tabulæ; item Figuræ III. Tabulæ X. desiderari potest.

- s. *Orificium Scalæ Tympani, sive ipsa Fenestra Rotunda.*  
 t. *Orificium Scalæ Vestibuli.*  
 u. *Scala Tympani.*  
 v. *Scala Vestibuli.*

## Figura VII.

Demonstrat Septum Cochleæ, & duas illius Substantias.

- a. Substantia Solidior, sive Lamina Spiralis.
- b. Substantia Mollior, sive Zona Cochleæ.

## Figura VIII.

Exhibet Nervorum Auditoriorum Portionem Mollem cum utrâq; ejus Parte, necnon omnibus Zonis Sonoris, in eodem situ ostensis, in quo conspicerentur; si totâ illâ superficîe, quam in Figurâ II. exhibemus, sublatâ, Labyrinthus aperiretur.

- c. Portio Mollis.
- d. Ejus Pars, quæ in quinque Surculos divisa, Vestibulum subit, & in Membranâ Vestibuli expanditur: quam Membranâ distinctè per appositam Litteram indicare negleximus; cum ejus Figura, & dimensiones aded in diversis diversæ sint.
- e. Mollis Portionis altera Pars, quæ nempe Cochleam ingreditur.
- f. Tres Zona, quæ à Membranâ Vestibuli protenduntur in Canales Semicirculares: quarum singulis ided Litteras non apponimus, quod per Explicationem Canalium in Figurâ I. & II. ostensorum; quibus nempe situ respondent; distinctè singula dignosci queant.
- g. Zona Cochleæ (eadem, quam in præcedenti Figurâ sub Litterâ b. ostendimus) quæ probabiliter expansio est illius Partis Portionis Mollis, quam modò per Litteram c. indicavimus.
- h. Ejusdem Zona illa pars, quæ Sclarum Cochleæ Orificiis interponitur: quæque an Membranâ Vestibuli continuetur, adhuc sufficiens detegere non potuimus.

## Figura IX.

Eadem, quæ præcedens, ostendit; sed Zonas in opposito demonstrat situ; in illo videlicet, in quo conspicerentur; si totâ illâ superficie, quam in Figurâ IV. exhibuimus, sublatâ, Labyrinthum aperiremus.

Si opus est; inspicere potest Explicatio ejusdem Figuræ IV. simul cum Explicatione præcedentis.

## Figura X.

Ostendit Mollem Nervorum Auditoriorum Portionem, & Vasa Sanguinea, simul cum ipsâ à Cerebro in Labyrinthum descendit; item ejusdem expansionem in Membranam Vestibuli, & indè in Canaliculum Semicircularium Zonas. Porro hæc ostendimus in eodem situ, in quo conspiciuntur in superiori Figurâ VIII. ad cujus Figuræ majorem perspicuitatem; nempe ut pateret, quâ ratione Zonæ Sonoræ Canales Semicirculares ingrediantur, eosdem Canales in hac Figurâ reliquimus.

Vide Explicationem ejusdem Figuræ VIII. item Explicationem Figuræ I. sive mavis II.

## Figura XI.

Demonstrat eandem Portionem Mollem simul cum Portione Durâ, ambas ad naturalem magnitudinem expressas.

k. *Portio Mollis.*

l. *Quinque Nervi Surculi, in quos divisa ejusdem Portionis una Pars Vestibulum ingreditur: altera verò ejusdem Pars, quæ videlicet Cochleam*

*in hac Figurâ sub oculos cadere non potest.*

*Portio.*  
*Canali Communi in Particularem deflectens.*

TA.

TAB. IX.



<b>A</b>			<b>H</b>		
I		7	I		7
II		5. $\frac{1}{2}$	II		6. $\frac{1}{2}$ <i>et ultra</i>
III		5	III		4. $\frac{1}{2}$
<b>B</b>			<b>I</b>		
I		6. $\frac{1}{2}$ <i>et ultra</i>	I		6. $\frac{1}{2}$
II		5. $\frac{1}{2}$ <i>et ultra</i>	II		6
III		4 <i>et ultra</i>	III		4. $\frac{1}{2}$
<b>C</b>			<b>K</b>		
I		6	I		7
II		5. $\frac{1}{2}$ <i>et ultra</i>	II		6. $\frac{1}{2}$ <i>et ultra</i>
III		4. $\frac{1}{2}$	III		4 <i>et ultra</i>
<b>D</b>			<b>L</b>		
I		6. $\frac{1}{2}$	I		5. $\frac{1}{2}$
II		5. $\frac{1}{2}$	II		5
III		4. $\frac{1}{2}$	III		3. $\frac{1}{2}$
<b>E</b>			<b>M</b>		
I		7. $\frac{1}{2}$	I		6
II		6 <i>et ultra</i>	II		5. $\frac{1}{2}$
III		3. $\frac{1}{2}$ <i>et ultra</i>	III		3. $\frac{1}{2}$
<b>F</b>			<b>N</b>		
I		8	I		7 <i>et ultra</i>
II		7 <i>et ultra</i>	II		6. $\frac{1}{2}$
III		5. $\frac{1}{2}$	III		4. $\frac{1}{2}$
<b>G</b>			<b>O</b>		
I		6	I		6. $\frac{1}{2}$
II		5. $\frac{1}{2}$ <i>et ultra</i>	II		5. $\frac{1}{2}$ <i>et -</i>
III		3. $\frac{1}{2}$	III		3. $\frac{1}{2}$



TAB. X.

FIG. I.





FIG. II.

FIG. III.





## TABULA IX.

**E**xibemus in hac Tabulâ primò \* Unciam Bononiensem in duodecim partes, sive lineas divisam; ut nempe juxta, ac polliciti sumus in Præfatione, scire omnes possint, quam Mensuram innuamus; cum lineam dicimus.

Deinde verò ex tot, quas è diversis Subiectis collegimus, Canalium Semicircularium Mensuris, paucas aliquot, quæ modò ad manum sunt, exhibemus; ad hoc ut possit quisque per se deducere tum duo illa, quæ nos ex eisdem eruimus, nempe quòd longitudinum eorundem Canalium generalior quidem proportio; quòd scilicet unus major, alter minor, tertius verò minimus sit, stabilis est; At quòd magis præcisa proportio, incerta, & varia in variis existit sic, ut determinari (à nobis quidem) non possit; tum alia, quæ meliora, & exercitatoria Doctorem Virorum Ingeniâ ex eisdem colligere fortasse poterunt.

*Itaque ut hæc Mensura perspicuè possint intelligi; quatuordecim Litteræ A. B. C. &c. totidem diversa Subiecta sunt, ex quorum singulorum alterâ tantummodò Aure (nam eadem in utràque Aure dimensiones) singulorum Canalium Semicircularium Mensura collecta sunt. Numeri verò Imperiales I. II. III. singuli singulos Canales connotant, hac ratione, ut I. Majorem, II. Minorem, III. verò Minimum connotet. Tres autem lineæ Numeris Imperialibus appositæ singula Mensura sunt ejus Canalis, cujus Numero apponuntur. Divisiones verò in singulis notatæ sunt totidem lineæ juxta Mensuram sub \* propositam. Demum Numeri Arithmetici summa sunt harum linearum. Secundùm hæc quisque poterit sibi omnia explicare.*

## TABULA X.

**T**Abulam hanc in illum potissimum finem concinnavi. ut scilicet, atque Philosophi clariùs, faciliùs, & c. tuitu totam penè Auditorii Organi structuram



re. Illæ itaque Auris Partes, quæ ad Auditum præcipuè faciunt; omnes simul junctæ, necnon proprio situ, & magnitudine expressæ, prout exhibentur à Naturali Aure, à me non sinè diuturno labore per circumpositi ossis abrasionem præparatæ; omnes, inquam, quæ quidem potuerunt; in hac Tabulâ repræsentantur. Porro cum hæ Figuræ, si quæ aliæ, ab additis Characteribus obscurari possent; ne perspicuitati, cui totus, in hac præcipuè Tabulâ, studeo, res illa officeret; Characteres omisi; maxime cum sibi quisque supplere illos possit ex præcedentibus Tabulis, earumque Explicationibus. Illistamen Partibus, quæ ex eisdem minùs promptè intelligi possunt, Litteras addidi, aliisque etiam, quæ id pati sinè obscuritate potuerunt.

## Figura I.

Exprimit Aures ab anteriori parte, sive qua Faciem spectat, ostensam, aliquantum tamen versùs Occiput inclinatam; ut nempe distinctius quatuor Officula in conspectum veniant. Quæ porro Officula simul cum Chordâ, & Membranâ Tympani, item Meatu Auditorio, & Auriculâ, ex Tabulâ III. eiusque Explicatione satis dignosci, atque intelligi, supponimus; adeoque ex illis sunt Partibus, quas per Litteras indicare super sedemus.

- a. *Extremitas Aquæductus Falloppiani, à qua Auditorii Nervorum Pars Portio Dura, jam Tabulâ II. Litterâ K. ostensa, erumpit.*
- b. *Portio Ossea ex pariete Sinuositatis Mastoidea, illa nempe, cui alligatur Processus Brevior Incudis; idè reliqua, ut melius ea intelligantur, quæ de ejusdem Incudis Hypomochlio Cap. II. & V. habuimus.*
- c. *Musculus Minimæ Processus Mallei. Musculus verò Processus Minoris huic oppositus observari non potest; quia totus sub Incude, & Meatu Auditorio reconditur.*
- d. *Musculus Processus Majoris, qui per totam Tubam Eustachianam longitudinem extenditur, à Canali suo Osseo liberatus.*  
*Utriusque Tubæ Eustachianæ antèrius latus, in quod præcedentis Musculi carne inferuntur.*  
*Utriusque Tubæ Eustachianæ.*

g. Mus-

g. *Musculus Stapedis, liberatus à Canali suo Osseo.*

1. *Canalis Semicircularis Major.*

2. *Canalis Semicircularis Minor.*

3. *Canalis Semicircularis Minimus.*

4. *Vestibulum, in cujus, secundum hanc partem inspecti, fornice duo tantummodò Foramina occurrunt ex quinque illis, quæ Nerveos Surculos in ejusdem Cavitate transmittunt. Tria, quæ super sunt, Foramina in sequenti Figurâ sub oculos cadunt.*

5. *Canalis Cochleæ.*

6. *Nervorum Auditoriorum Portio Mollis unam sui Partem versus Cochleam demittens; alteram verò, quæ in Surculos quinque dividitur, in Vestibulum protendens: ex quibus Surculis duos abscidimus; ne duo illa, per quæ ipsi ingrediebantur, modò indicata Foramina obtegerent.*

## Figura II.

Aurem exprimit, visam à parte posteriori, sive qua Occiput spectat, edusque tamen versus anteriora inclinatam, ut Fenestra Rotunda, Membrana Tympani, & ex parte etiam quatuor Officula in conspectum veniant.

a. *Aqueductus Falloppianus.*

b. *Tubæ Eustachianæ Principium.*

c. *Cartilaginis ejusdem Tubæ posterius latus.*

d. *Tubæ Finis.*

1. *Canalis Semicircularis Major.*

2. *Canalis Semicircularis Minor.*

3. *Canalis Semicircularis Minimus.*

4. *Vestibulum, in cuius ab hac parte inspecti, fornice primò exigua tria Foramina in conspectum veniunt ex quinque illis, quæ Nerveos Surculos in Vestibulum intromittunt. Deinde sub ijs Foraminibus aliud Majus Foramen occurrit: Et hoc est Fenestra Rotunda.*

5. *Cochleæ Canalis, intra cujus gyros relicta est Sinuositas illa Minimis Foraminibus pertusa, ex qua ea Pars Portionis Mollis, quæ Cochleæ spicit, eandem Cochleam per indicata Foramina ingreditur: quæ joris perspicuitatis gratiâ, paulò majuscula, quàm naturalis*

*duntur. Cetera ex præcedentis Figura Explicatione perspicua sunt.*

Aliquis fortasse in duobus modò explicatis Iconismi s Cavitatis Tympani Figuram desideraverit. Ego tamen ipsam non dedi, quia alia ostendenda abscondisset; tum quia facillimè cuique obvia est & in ipsâ naturali Aure, & in ejusdem jam vulgatis Iconismis, quibus sanè quantum ad hoc nihil habebam, quod adderem; maximè verò quia ejus Cavitatis configuratio ad Auditus Phænomena intelligenda non multum facere videtur. Quibus de causis factum est, ut in superioribus etiam Tabulis eandem delineare omiserimus.

## Figura III.

Exponit Membranam Vestibuli; item Cochleæ, & Canaliculi Semicircularium Zonas, Molli Nervorum Auditoriorum Portiones annexas, magnitudine naturali, & in eodem situ, in quo conspicerentur; si totâ istâ Labyrinthi superficie, quæ in præcedenti II. Figurâ exhibetur, sublarâ, ipsum Labyrinthum aperiremus.

Huic Figuræ ulteriorem Explicationem non addimus; hæc enim vix differret ab Explicatione Figuræ VIII. Tab. VIII. quam proinde repetere, si vis, potes.

## Explicationis Figurarum

## F I N I S.

## I N D E X,

## Sive mavis SUMMARIUM

Eorum tantummodò, quæ ob Raritatem, imò ut plurimum  
ob Novitatem Memorabiliora, in Libello hoc  
scripta, aut delineata, continentur.

## A

**A** Poplecticos Affectus, in quibus sinistra Corporis medietas resoluta  
est, eos causam habere in dextro Cerebri Hemisphærio; in quibus ve-  
rò dextera resoluta est, eos causam habere in sinistro, per plurimum, & plu-  
rium Observationum in hoc consensum ostenditur Capite V. Numero  
VIII. Paginâ 109. 110.

In talibus Affectibus juxta easdem Observationes Decubitus ratio, Loca-  
litum, & Pblebotomiæ locus multò aptius præscribi poterunt. Cap. V.  
Num. VIII. pag. 111. 112.

In talibus Affectibus, si medietas Corporis dextra resoluta sit; juxta eas-  
dem Observationes, & Novorum Tympani Foraminum dispositionem,  
Odoramenta aptius adhibebuntur sinistra Nari, quàm dextra; & econ-  
tra. Cap. V. Num. VIII. p. 112. 113.

In talibus Affectibus instituta Pena sectio ex latere Corporis non resoluti,  
serè illicò profuit. Ibidem. p. 112.

Aquaductus Falloppiani cum ipsius in Cranii Cavitate aperturâ sum extra  
situm, tum in situ Delineatio Tabulâ VII. Figurâ V. & IV.

Arteria Tympani. Vide Tympani &c.

Arteria, quæ per anteriorem Auriculæ partem ad Tempora ascendit, in-  
venitur frequenter sinè sociâ Venâ, scilicet quæ ejus duclum sequatur.  
Cap. I. Num. XIV. p.

Auditorius Meatus. Vid. Meatus.

Auditorii Nervus. Vid. Nervus.

Auditus unius hominis idèò frequentissimè differt ab Auditu

- frequentissima occurrunt diversitates inter Partes Labyrinthi unius hominis, & Partes Labyrinthi alterius; præcipue quod attinet ad Longitudinum Canaliculorum Semicircularium proportionem. Cap. VI. Num. IX. pag. 141. 142.*
- Circa causam Gravitatis Auditus Observatio Cap. V. N. V. p. 101. 102.*
- Item Vid. Officula. Vid. Uvula &c.*
- Sensorium Auditus propriè dictum sunt quatuor Zona Sonora, tres scilicet Canaliculorum Semicircularium, & una Cochleæ. Cap. VI. N. II. p. 125.*
- Ratio, cur hoc Sensorium non in unicâ; sed in pluribus Zonis à Naturâ constitutum esse, coniiciatur. Cap. VI. N. IV. V. &c. p. 128. &c.*
- Auditus. Vid. Tuba Eustachiana &c.*
- Auricula, & in hac*
- Antitragi Musculus Cap. I. N. VII. p. 8.*
- Huius Musculi Delineatio Tab. I. Fig. IV.*
- In Concha gibbo Fibræ Carneæ Transversæ Cap. I. N. VII. p. 8.*
- Harum Delineatio Tab. I. F. III.*
- Glandula Sebacea Cap. I. N. III. p. 3.*
- Ligamentum in parte anticâ Cap. I. N. VIII. p. 9.*
- Musculus Anterior Cap. I. N. VI. p. 7.*
- Huius Delineatio Tab. I. F. III.*
- Musculi Posteriores distinctius descripti Cap. I. N. VI. p. 6. 7.*
- Omnium Auriculæ Musculorum Usus est assiduo suo motu tonico Concham ita formare, ut Motus Sonori inde viridiùs reflectantur. Cap. IV. Num. III. p. 84. 85.*
- Tragi Glandula Cap. I. N. V. p. 5.*
- Harum Delineatio Tab. I. F. I.*
- Tragi Musculus Cap. I. N. VII. p. 8.*
- Huius Delineatio Tab. I. F. IV.*
- Auris Divisio in tres Cavitates, scilicet in Exteriorem, Mediam, & Internam. Cap. I. N. I. p. 1.*
- Perè omnium præcipuarum ipsius Partium Mensura. Vid. passim per totam Primam Tractatus Partem.*
- Siquando in aliquâ unius Auris Parte occurrit vitium aliquod à nativitate contractum; idem prorsus in correspondente alterius Auris Parte obtulit. Cap. III. N. VII. p. 65.*
- Uterum post instillati Balsami Peruviani usum, absque ullâ remedia auditus noxâ, Curationes. Cap. II. Num. II. pag. 21. Basis*

## B

## B

*Asis Stapedis. Vid. Stapedis &c.*

## C

## C

*Canales Semicirculares in eâ quidem generaliâ longitudinum proportionem esse, ut unus major, alter minor, tertius verd minimus sit, determinatur; sed in qua præcisâ proportionem sint, stabiliri non potest eo, quod hæc in diversis diversa sit. Cap. III. N. VII. p. 63. 64.*

*In eodem Subiecto singuli unius Auris Canales singulis alterius Auris correspondentibus Canalibus æquales sunt. Cap. III. N. VII. p. 64.*

*Mensura eorundem Canalium ex diversis Subiectis collecta Tab. IX.*

*Orbicularis Cavitas in Canali Majore, antequam iste in Proprium Orificium definat. Cap. III. N. IV. p. 61.*

*Hujus Cavitatis Delineatio Tab. VIII. Fig. III. &c.*

*Capitis partem capillatam obtinere Glandulas ejusdem naturæ cum Auricula Sebaceis, ex illius partis unctuositate, & furfuribus conjicitur. Cap. I. N. III. p. 3. 4.*

*Cephalopharyngæ Musculi. Vid. Pharyngis &c.*

*Cerebri structuram esse posse gravissimè labefactatam; tamen si nulla sensibilis læsio in eodem conspici queat; novo adducto exemplo probatur. Cap. V. N. VIII. p. 110. 111.*

*Cbondroglossus Musculus (licet à Neopetico quodam ex æquo inter cæteros Lingua Musculos describatur) solam aliquandò invenitur. Cap. II. N. XX. p. 52.*

*Cocleæ Canalis superficies ex aliâ substantiâ componitur, ac superficies Canaliculorum Semicircularium. Cap. III. N. VIII. p. 66.*

*Scala Tympani (tamen si ab aliis Inferior vocetur) Superior est; Scala autem Vestibuli Inferior. Cap. III. N. VIII. p. 68.*

*Hæ quoque differentie inter Scalam Vestibuli, & Scalam Tympani emendatæ; quod nempe hæc capacitate variet, irregulæ donetur, necnon frequenter superficiem inæqualem obstruat contra. Cap. III. N. VIII.*

- Ex quibus differentiis conijcitur, Scalam Tympani inservire potissimum ad Motus Sonoros jam munere suo defunctos amandandos; Scalam econtrā Vestibuli ad eosdem adhuc utiles ad omnes Zona Cochleæ partes aliquandò saltē perducendos. Cap. VI. N. VIII. p. 138. 139.*
- Concha. Vid. Auricula.*
- Cordis Nervi. Vid. Nervi.*
- Cranii Basis duobus Foraminibus pro Venis Occipitalibus pertunditur. Cap. I. N. XIV. p. 14.*
- Horum Foraminum Delineatio Tab. IV. Litt. d.d.*
- Aliorum Foraminum ejusdem Basis non minùs vera, quàm clara Delineatio Tab. IV.*
- Cricopharyngeus Musculus. Vid. Pharyngis &c.*
- Cystici Tumores. Vid. Glandula Sebacea. Vid. Palpebrarum &c.*

## D

- D** *Eglutitio quomodò fiat. Vid. Pharyngis &c.*
- Observatio, & Curatio Deglutitionis Impedita à Luxatione Appendicis Cartilaginearum Ossis Hyoidis Cap. II. N. XX. p. 50.*
- Diverticuli inter Iugularem Venam, & Sinum Lateralem interpositi verior Delineatio Tab. VII. F. II.*
- Ductus Seminiferi. Vid. Testium &c.*
- Dura Matris structuram, illum, quo ipsa madet, humorem suppeditare, indicatur Cap. II. N. XV. p. 39. 40.*
- Dura Mater. Vid. Nervus. Vid. Sinuum &c. Vid. Tympani &c.*

## F

- R** *Atio, cur Fenestra Rotunda talis situs obtigerit, ut Membranam Tympani ex adverso non respiciat; talis verò obtigerit Membranula ejusdem Fenestra, ut non in extremo hujus margine, sed paulò interiorius collocetur. Cap. VI. N. VII. p. 133.*
- Basis Cranij. Vid. Cranij &c.*
- Membrana Tympani. Vid. Tympani &c.*
- Membrana Tympani, qua Tympani Cavitas cum Cranij Cavitate communicat. &c. Gland.*

## G

- G**landula Lymphatica in Parotide. *Vid. Parotis*;  
*Parotis. Vid. Parotis.*  
 Meatus Auditorii Glandula. *Vid. Meatus Auditorii &c.*  
 Sebacea. *Vid. Auricula. Vid. Capitis &c. Vid. Palpebrarum &c. Vid.*  
*Scapularum &c.*  
 Glandulas Sebaceas esse toti ambitui Corporis, aut saltem pluribus ejus-  
 dem locis communes, conijcitur Cap. I. N. III. p. 3. 4.  
 Tales Glandulas originem præbere Tumoribus quibusdam Cysticis, & præ-  
 cipue Steatomati, conijcitur Cap. IV. N. IV. p. 86.  
 Vesicularis Glandularum Substantia (quidquid alii scripserint) demon-  
 strari potest. Cap. II. N. VII. p. 27.  
 Glossostaphylini Musculi. *Vid. Uvula &c.*  
 Gravitas Auditus. *Vid. Auditus.*

## H

- H**oidis Ossis Cartilaginearum Appendicum Luxatio. *Vid. Degluti-*  
*tio.*  
 Hyopharyngei Musculi. *Vid. Pharyngis &c.*

## I

- I**ncisura Meatus Auditorii. *Vid. Meatus Auditorii &c.*  
 Infantes recens nati, cum Auditorium Meatum non solum valde ætulum;  
 verum etiam, simul cum Membranâ Tympani, crassâ quadam sub-  
 stantiâ obductum habeant; nihil, aut minimum audient. Cap. IV.  
 N. VII. p. 90.

## L

- L**abyrinthus, & contenta in ipso Partes Humore quo-  
 dent. Cap. III. N. XVII.



*Integri Labyrinthi distincta Figura Tab. VIII.*

*Labyrinthus. Vid. Canales Semicirculares. Vid. Cochlea &c.*

*Lienis in Cane defectus Observatio Cap. II. N. XIV.*

p. 36.

*Ligamentum Auriculæ. Vid. Auricula.*

*Lingua. Vid. Chondroglossus.*

*Lymphatica in Nervo Optico, & Retinâ. Vid. Retina.*

## M

**M**allei Majoris Processus Musculus inserit suas fibras in Partem Cartilagineam Tuba Eustachiana. Cap. II. N. V.

p. 24.

*Hujus insertionis Delineatio Tab. X. F. I.*

*Hoc Musculo abscisso, Tympani Membrana relaxatur. Cap. II. N. V. p. 24.*

*Hic Musculus quo tempore audimus, relaxatus, non parum confert, quatenus hac suâ relaxatione Tuba Eustachiana, eodem tempore dilatanda, alterum latus magis mobile reddit. Cap. V. N. XI. p. 117. 118.*

*Minoris Processus Musculi detegendi modus Cap. II. N. VI. p. 25.*

*Hunc, & Musculum Processus Minimi, Aliqui idè fortè non admittunt; quia illos in minis idoneis Cadaveribus perquisiverunt. Cap. II. N. VII.*

p. 26.

*Meatus Auditorii Cutis accuratius descripta Cap. I. N. XI.*

p. 11.

*Glandularum Corpus Reticulare Cap. I. N. XII.*

p. 12.

*Huius Delineatio Tab. III. F. I. & III.*

*Inejus Meatus Auditorii accuratior Descriptio Cap. I. N. IX. p. 9.*

*Hujus Delineatio Tab. III. Fig. I.*

*Ejusdem observandi modus Cap. I. N. IX. p. 9. 10.*

*Incisuræ accuratius descriptæ Cap. I. N. X. p. 10. 11.*

*Incisuras conducere ad Motuum Sonorum vim augendam, comicitur Cap. IV. N. V. p. 87. 88.*

*Meatus Auditorius. Vid. Infantes.*

*Membrana Fenestræ Rotunda. Vid. Fenestræ &c.*

*Per quam Bassis Stapedis Fenestræ Ovali anneclitur. Vid. Stapedis &c.*

*Stapedis intermedium spatium obducens. Vid. Stapedis &c.*

*Tympani. Vid. Tympani &c.*

*Canalium Semicircularium. Vid. Canales.*

*Partium Auris. Vid. Auris.*

Mo-

- Motus Sonori. Vid. Sonori.*  
*Musculus Antitragi. Vid. Antitragi &c.*  
*Auricula Anterior. Vid. Auricula.*  
*Posteriores. Vid. Auricula.*  
*Cephalopharyngeus. Vid. Pharyngis &c.*  
*Chondroglossus. Vid. Chondroglossus.*  
*Cricopharyngeus. Vid. Pharyngis &c.*  
*Glossostaphylinus. Vid. Uvula &c.*  
*Hypopharyngeus. Vid. Pharyngis &c.*  
*Processus Majoris Mallei. Vid. Mallei &c.*  
*Minimi. Vid. Mallei &c.*  
*Minoris. Vid. Mallei &c.*  
*Salpingostaphylinus. Vid. Uvula &c.*  
*Sphenopharyngeus. Vid. Pharyngis &c.*  
*Thyropharyngeus. Vid. Pharyngis &c.*  
*Tuba Eustachianæ. Vid. Tuba Eustachianæ &c.*

## N

- N**ervorum Auditoriorum Dura Portionis Ramulus ab Aquæductu Falloppiano intra Cranii Cavitatem regressus, super Duram Matrem, & Truncum Nervorum Quinti Paris Surculos diffundit. Cap. III. N. X. p. 71.  
 Hanc Portionem ullum sensibilem Ramum per Auriculæ posteriora mittente; item quem Ramum per Faciem diffundit, in formam Asserini Pedis expandere, Anatomice perquisitioni non respondet. Cap. I. N. XV. p. 15.  
 Et Explication. Tab. II. p. 149.  
 Eiusdem Portionis ab Aquæductu Falloppiano egressæ verior Delineatio. Tab. II.  
 Portio Dura. Vid. Tympani &c.  
 Portio Mollis. Vid. Zong.  
 Nervi Cordis, si filo tantummodò constringantur in Cane, deinde statim solvantur; eodem modo intra aliquos dies Canis moritur, ac si Nervi illi amputati essent; licet bi rursus inspecti, in se nullum sensationis vestigium ostendant. Cap. V. N. VIII.  
 Nervi Optici Lymphatica. Vid. Retina.

## Z

*Ad Nervum Vertebralem post Auriculam in Odontagliâ comburendum certior locus, aliisque indicantur Cap. I. N. XV. p. 15. 16. Et Tab. II. Lit. H.*

*Plures Nervi Ramuli, qui inter unius Coniugationis Truncum, & Truncum alterius ducuntur, velut ipsa Cborda Timpani, cur potius alterutri Coniugationi tribuantur, nulla ratio est. Cap. II. N. XXII. p. 56.*

## O

**O**ccipitalis Vena Cap. I. N. XIV. p. 14.

*Huius Delineatio Tab. VII. F. II.*

*Foramen pro hac in Cranii Basi. Vid. Cranii &c.*

*Odontalgia tollenda causâ, ubi Nervus comburendus sit. Vid. Nervum.*

*Cristica Pharyngis. Vid. Pharyngis &c.*

*Orificiorum omnium, quæ in Vestibuli Cavitate occurrunt, in propriis sitibus non minus clara, quàm vera Delineatio Tab. VIII. Fig. V.*

*Officula quatuor Tympani nihil aliud sunt, quàm duo Væctes, per quorum motum à Meatu Auditorio in Labyrinthum Sonori Motus transferuntur. Cap. V. N. II. p. 94. 95. & seq.*

*Hoc confirmatur etiam per Observationem Gravitatis Auditus ex ablatione talis Officulorum dispositionis in Væctes. Cap. V. N. V. p. 102.*

*Officulum Orbiculare dictum, non est Orbiculare; sed Ovale. Cap. II. N. IX. p. 28.*

*Offis Hyoidis Appendicum Cartilaginearum Luxatio. Vid. Deglutitio.*

*Illa Opinio, quòd scilicet Vasa Sanguinea extimam Ossium superficiem perreptare nequeant; nisi membranis fulsantur, experientia non respondet. Cap. III. N. XV. p. 78. 79.*

## P

**P**alpebrarum Glandula ejusdem naturæ sunt cum Auriculæ Sebaceis. Cap. I. N. III. p. 3.

*Tumores Cyfici certius, & felicius excutantur, sectionem instituendo ab internâ Palpebrarum parte. Cap. IV. N. IV. p. 86.*

*Parotidis, ejusque Ductus verus circa Auriculam situs Tab. I. F. I.*

*vide Glandula Lymphatica Cap. I. N. XVI. p. 16.*

*Tab. I. F. I.*

*epibalo-pharyngæ communiter vocati, non ab imo Capitis;*

- tis; sed ab Uvula incipiunt. Cap. II. N. XX. p. 48.
- Horum [sub nomine magis congruo, Staphylopharyngaeorum videlicet] verior Delineatio Tab. V. & VI.
- Hyopharyngaei Cap. II. N. XX. p. 49.
- Horum Delineatio Tab. V. F. II. & Tab. VI. Lit. F. F. F. F.
- Oesophagus communiter vocatus [magis congruè Thyropharyngaei Musculi] non est unus Musculus, ut vulgò à majori parte censetur; sed reverà, ut Casserius docuit, geminus est. Cap. II. N. XX. p. 50. 51.
- Hujus, sive potius horum accuratior Delineatio Tab. VI.
- Sphenopharyngaei communiter appellati, non à Processibus Ossis Sphenoidis; sed à lateribus Linguae in parte bujuss inferiori erumpunt. Cap. II. N. XX. p. 49.
- Horum [sub nomine magis congruo, Glossopharyngaeorum videlicet] verior Delineatio Tab. V. F. II.
- Musculi Pharyngis non solum in Deglutione agunt (quae quidem aëlio distinctè, & clarè juxta veram ipsorum Anatomiam explicatur) verum cum possint facere, ut Uvula plus, minusve supra Laryngis aperturam propendeat, utque plus, minus Pharyngis Orificia ad Os, & ad Nares restringantur; possunt etiam ad variam Vocis modulationem conducere. Cap. II. N. XXI. p. 53. 54.
- In Pharynge tria Orificia attendenda sunt; unum ad Os, alterum ad Nares, tertium ad Oesophagum. Cap. II. N. XX. p. 47. 48.
- Horum Delineatio Tab. V. F. II. &c.
- Tonsillae accipi reverà possunt pro Partibus, aut saltem pro Appendicibus ipsius Pharyngis. Explicatio. Tab. V. F. I. p. 157.
- Uvula Pharyngis Pars est. Cap. II. N. XX. p. 47.

## R

- R**enis Sinistri in homine deficientis Observatio Cap. II. N. XIV. p. 36.
- Resina Bovis Lymphatica non exilia elegantissime ludentia exhibet; quae exinde in truncos collecta, Nervum Opticum subeunt. Cap. III. N. XV. p. 77

## S

- S**Alpingoaphyllini Musculi. Vid. Uvula &c.
- Scala Tympani, & Vestibuli. Vid. Cochlea &c.

- Scapularum Cutim* obtinere *Glandulas ejusdem naturæ cum Auricula Sebaceis*, conijcitur ex illâ unctuositate, qua in plurimorum indusis circa easdem *Scapulas* observatur. Cap. I. N. III. p. 4.
- Sensorium Auditus*. Vid. *Auditus*.
- Sinuositas Mastoidea*. Vid. *Tympani &c.*
- Sinuum Dura Matris Lateralium, & Sella Equine Adiacentium Cavitas* non est cylindrica; sed quæ parte *Cerebrum* respicit, quasi complanata est. Explication. Tab. VII. F. II. p. 159. 160.
- Istiusmodi Cavitatis Delineatio* Tab. VII. F. II.
- Sonori Motus*, si non ope mechanici motus quatuor *Officulorum*; sed per se ipsos transferre se à *Meatu Auditorio* in *Labyrinthum* debuissent; *Fenestra Rotunda* Officia turbassent. Cap. VI. N. VII. p. 134.
- Sententias Pulgatas circa rationem*, qua *Sonori Motus* per *Tympanum* ad *Labyrinthum* transeunt, minimis verisimiles esse, in univ. sum innuitur; si *Tympani Anatomen* spectemus: nominatim verò una, qua plurimis placuit, adductis ex ead. Anatome rationibus, verisimilem non esse, evincitur Cap. V. N. I. p. 93. 94.
- Sonoros Motus Vestibulum ingressos*, non omnia qua in ipso occurrunt, *Orificia* simul pervadere; sed possissimum *Proprium Canalis Minimi*, necnon *Coniune Orificium* subire, conijcitur Cap. VI. N. III. p. 126. 127.
- Sonori Motus*. Vid. *Auricula*. *Officula*. *Meatus Auditorii*. *Tuba Eustachiana*. &c.
- Sphenobaryngæi Musculi*. Vid. *Pharyngis &c.*
- Stapedis Basis* non est, ut communiter traditur, exactè elliptica; sed tantum ad ellipticam figuram accedit; atque insuper ejus margo ex unâ parte leviter deficit. Explication. Tab. III. F. VIII. p. 153.
- Ejusdem vera Delineatio* Tab. III. F. VIII.
- Eadem Basis* (quidquid alii scripserint) non est minimis foraminibus pervia. Cap. II. N. X. p. 29.
- Membranam*, per quam eadem *Basis Fenestræ Ovali* annectitur; illam sic annectere, ut tamen sursum, deorsumque moveri possit, probatur per *Observationem Surditatis* ab ossificatione, adedque omnimodâ immobilitate ejusdem *Membrana*. Cap. II. N. X. p. 30. 31.
- Eadem Membrana* ex una determinatâ parte firmior est, atque robustior: quia ex ead. parte majus periculum est, ne eadem *Membrana* Cap. II. N. X. p. 31. Et Cap. V. N. III. p. 98.
- gravitas non à cavernulis, sive porulis, quibus nempe (quid-

(quidquid alii scripserint) caret; sed ab offis tenuitate deducenda est.

Cap. II. N. XII.

p. 33.

*Intermedium Stapedis Spatium* [quidquid Aliqui doceant] nullâ plerumque Membranâ clauditur. Cap. II. N. X.

p. 29. 30.

*Steatoma.* Vid. *Glandula Sebacea.*

*Surditatis à nativitate certa species induci potest à materiâ quadam, quæ ab Infantis Matru Autotio, veluti deberet, non excidat. Quæ Surditatis à nativitate species omnino incurabilis non erit.* Cap. I. N. XIII.

p. 13.

*Certa Speciei Surditatis à duodecim annis affligentis Chirurgica Curatio* Cap. I. N. XII.

p. 13.

*Circa Surditatis causam Observatio* Cap. V. N. V.

p. 101.

*Item* Vid. *Stapedis &c. Tubæ Eustachiana &c.*

## T

**T**estium Ductus Seminiferi; qui nempe à Testibus in Epididymides juxta Graafii Anatomen semen transferunt; reverà (quidquid alii scripserint) demonstrari possunt. Cap. V. N. VII.

p. 27.

*Thyropharyngæ Musculi.* Vid. *Pharyngis &c.*

*Tonsillæ.* Vid. *Pharyngis &c.*

*Tragus.* Vid. *Auricula.*

*Tubæ Eustachianæ, ejus scilicet figuræ, ejusque Partium Delineatio* Tab. III. F. III. XII. XIII. XIV. item Tab. IV. & X.

*Ejusdem Musculus* Cap. II. N. XVIII.

p. 43. 44.

*Huius Delineatio* Tab. III. F. XII. & XIV. T. IV. Litt. m. m. & Tab. X. F. I.

*Ejusdem Musculi Usus est, ut quo tempore est audiendum, Tubam aper- tam, ut par est, servet.* Cap. V. N. XI.

p. 117. 118.

*Si enim Tubæ claudantur; illud Auditum amitti, Observatione adductâ probatur.* Cap. V. N. X.

p. 116.

*Ratio, cur Tubæ Orificium ita constitutum fuerit; ut antè sui labrum Processui Pterygoidi contiguum sit; posterius verò: quod nulli simili parti contiguum est; ex crassescenâ Cartilagine construatur.* Cap. V. N. XII.

p. 119.

*Cætera ad Tubam attinentia* Vid. Cap. VI. N. VI.

pag. —

*Et* N. VII.

p. —

*Tubarum Polybonicarum Artificibus monitum datur, certis stratorum interstitiis conficiant; quando hæc*

- rà ad Soni augmentum coaducant. Cap. IV. N. V. p. 88.*  
*Tumores Cystici. Vid. Glandula Sebacea. Vid. Palpebrarum &c.*  
*Cujusdam Speciei Tumorum à sanguine extravasato productorum Signa.*  
*Cap. IV. N. V. II. p. 91. 92.*  
*Talium Tumorum Observationes duæ. Ibidem.*  
*Tympani Arteria Ramulus est Arterię Carotidis, qui ab istâ, per osseum Canalem ad Cerebrum scandente, perforato Canali, recedit. Cap. II. N. XXII. p. 55.*  
*Hujus Delineatio Tab. VIII. F. I.*  
*Cavitatis Tympani partem esse Sinuositatem Mastoideam, probatur Cap. II. N. III. p. 22.*  
*Tympani Cborda ita inter Malleum, & Incudem disponitur, ut ipsis motis, moveri statim debeat. Cap. II. N. XXII. p. 56.*  
*Tympani Cborda. Vid. Nervi.*  
*Tympani Foramina, per quæ ipsius Cavitas cum Cranii Cavitate communicat; adedque per quæ sanguis, ichor &c. in quibusdam casibus ab istâ in illam Cavitatem, & deinde per Meatum Auditorium, aut per Tubam Eustachianam; inde per Nares, aut Os foras eliminantur. Fêrè enim (quidquid Aliquis contra censuerit) talia à Cavitate Cranii promanant. Cap. II. N. XIV. p. 34. & seq.*  
*Et Cap. V. N. VIII. p. 106. 107.*  
*In hoc ipsum duæ Observationes Cap. II. N. XIV. p. 38. 39.*  
*Serum quoddam, per cuius à Naribus excretionem Dolores Capitis sublatisunt, à Cranii Cavitate per ea Foramina expulsum esse, coniectur Cap. V. N. VII. p. 107.*  
*Ab his quoque Foraminibus illud habetur, quod nempe in Pulneribus Capitis penetrantibus, dum clausis Naribus, & Ore aer vi intro comprimitur; sanies per vulnus prorumpat. Cap. V. N. VIII. p. 108.*  
*Per hæc Foramina aer externus inmediate potest agere in Duram Matrem. Cap. V. N. VIII. p. 107.*  
*Humor, quo Tympanum bumeclatur, derivari etiam potest à Cranii Cavitate; per ea nempe Foramina, de quibus modò &c. Cap. II. N. XV. p. 40.*  
*Tympani Membrana componitur ex duplici expansione membraceâ; Duâ scilicet, & Cutis Meatus Auditorii. Cap. II. N. I. p. 18.*  
*patet in Humano Fetu. Ibid.*  
*branâ Foramen adesse, per quod Fluida à Tympano in Mea-*

*Matum Auditorium perveniant, licet nondum pro certo habeatur; plures tamen ad lucuntur Observationes, ex quibus ipsum adesse, conijci queat. Cap. II. N. II.* p. 18. & 19.

*In Experimento Villij de Cane post rupturam huius Membranae ad tres adhuc menses audiente, nonnulla, & quidem notabilia, desiderantur. Cap. V. N. V.* p. 100.

*In Experimento hoc conficiendo aliqua deceptio subesse potest; nisi Canem eneces, & inspicias. Cap. V. N. V.* p. 103. 104.

*Caes, quibus Tympani Membrana perrupta fuerat, non solum ad tres menses, verum ad annum; imò usquedum vixerint, audivisse, indicatur Cap. V. N. V.* p. 104.

*In Canibus, quibus similiter Tympani Membrana perrupta fuerat, eadem in pristinam integritatem restituta comperta est. Cap. V. N. V.* p. 103.

*Membrana hac maximâ ex parte corrosione absumpta, à Naturâ restituta est. Cap. V. N. V.* p. 102.

*Tympani Membrana. Vid. Mallei &c.*

*Nervorum Sirculorum, qui tum ab eo Ramulo, qui Cbordam Tympani constituit, tum à Durâ Auditoriorum Nervorum Portione Tympano conceduntur, Delineatio Tab. VII. F. III.*

*Vena Tympani, Iugularis Drverticulum ingredientis, Delineatio Tab. VII. F. II.*

*Ad Tympani Ulcera detergenda facile, necnon utile remedium est; si ager clausis Naribus, & Ore, aerem vi intus comprimat. Cap. V. N. VIII.* p. 108.

## V

*Vena Sanguinea. Vid. Ossium &c.*

*Vena Occipitalis. Vid. Occipitalis.*

*Temporalis. Vid. Arteria.*

*Ulcera Auris. Vid. Auris.*

*Observatio Ulceris, ad Mamillarem Processum existentis, in quod iniecta, statim in Oris Cavitate, licet undequaque illasam, transmutabantur. Cap. V. N. IX.* p. 114

*Ulcera ad Musculos SalpingoTaphylinos. Vid. Uvula &c.*

*Tympani. Vid. Tympani &c.*

*Uvula Basis illud perpetuò praeat, ut notabilis aeris quæ Tubarum Orificiis avertatur; qui aliàs ipsarum N*



& illud, quatenus perpetuò adducitur versus medium illius *Pharyngis* Orificii, quod ad *Nares* patet, per motum tonicum *Musculorum Salpingostaphylinorum*: quos proinde: si ambo erodantur; *Gravitatē Auditiū* inducere in utraq̃ *Aure*, observatur; si verò alteruter; in alterutrá. *Cap. I. N. XII.* p. 122.

*Uvula* Corpus per suos *Musculos Pharyngostaphylinos* extendi potest in quandam veluti *Salvulam*; & sic in *Deglutitione*, necnon in quibusdam audiendi casibus apta est Orificium *Pharyngis* ad *Nares* restringere; maximè cum versus ejusdem Orificii medium tunc peculiariter adducatur à *Musculis suis Salpingostaphylinis* se contrahentibus. *Cap. II. N. XXI.* p. 53.

Et *Cap. I. N. XII.*

p. 120. 121.

*Uvulae Musculi Glossostaphylini* *Cap. II. N. XIX.*

p. 45.

*Horum Delineatio Tab. V. F. I.*

*Pharyngostaphylini.* *Vid. Pharyngis Musculi Cephalopharyngæi communiter vocati.*

*Salpingostaphylini*, non à *Processu Pterygoide*, ut creditur (nam vocantur passim *Pterygostaphylini Interni*) sed à *Parte Officâ Tuba Eustachiana* exoriuntur. *Cap. II. N. XIX.* p. 45.

*Horum Delineatio Tab. V. VI. & IV.*

*Uvula. Vid. Pharyngis &c.*

## Z

**Z** *Ona Sonora Canalium Semicircularium* *Cap. III. N. XII.* p. 72. 73.

*Horum Delineatio Tab. VIII. F. VIII. IX. X. & Tab. X. F. III.*

*Earundem inveniendarum ratio &c. Cap. III. N. XIII.*

p. 75.

*Cætera ad easdem attinensia* *Vid. Cap. VI. N. IV. V. VI. VII. VIII.* p. 127.

& seq.

## FINIS.







